

UC-NRLF



B 3 863 565


BERKELEY

LIBRARY

UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

LOGY LIBR.





Paul Levet Rijk.

CATALOGUE
SYSTÉMATIQUE

DU

CABINET

D'ORNITHOLOGIE

ET DE

QUADRUMANES,

DE


C. J. TEMMINCK.

à

AMSTERDAM.

Oswald Weigel

Antiquariat & Auct.-Inst.



CATALOGUE
SYSTÉMATIQUE
DU
CABINET
D'ORNITHOLOGIE
ET DE LA
COLLECTION
DE
QUADRUMANES
DE
CRD. JB. TEMMINCK.
AVEC UNE COURTE DESCRIPTION
DES OISEAUX NON-DÉCRITS
SUIVI:
D'UNE NOTE D'OISEAUX DOUBLES ET DE
QUELQUES AUTRES OBJETS D'HISTOIRE
NATURELLE OFFERTS EN ÉCHANGE.



à AMSTERDAM,
Chez C. SEPP JANSZ.
MDCCCVII.

BIOLOGY LIBR.

QL 677
T 4
Biology
Library

P R E F A C E.

Le but principal que je me suis proposé en faisant imprimer le Catalogue Systématique de mon Cabinet d'Ornithologie, et de ma collection de Quadrumanes, est de faire connoître aux Amateurs et Possesseurs de collections d'Histoire Naturelle et aux Directeurs des divers Muséum qui se trouvent repandus en Europe.

1^{er} Le nombre des individus dressés, qui sont exposés dans mon Cabinet.

Je tache de satisfaire par-là aux sollicitations reiterées qui m'ont été faites pour m'engager à publier la Note des Oiseaux déposés dans cette collection. J'y soucris avec d'autant plus de Zèle, espérant être assez heureux de

* 2

pou-

pouvoir contribuer en quelque sorte à l'avancement d'une branche de l'Histoire Naturelle à la quelle je me suis particulièrement voué, en offrant aux Auteurs qui s'occupent à publier l'Histoire des Oiseaux, les renseignemens qu'ils pourroient desirer, par rapport aux espèces non décrites que cette collection renferme, je les invite d'en faire usage, en les persuadant du Zèle que je mettrai à leur rendre service.

Je fais connoître 2.^m les Oiseaux et autres objets dressés, ou rembourés que je possède en doubles.

Mon dessein étant de destiner les doubles à l'échange contre d'autres objets d'Ornithologie que je ne possède pas dans mon Cabinet, et qui ne sont pas portés sur le Catalogue; je les offre aux Possesseurs de Cabinets, et aux Directeurs de Muséum, qui seroient dans le même cas, les invitant à entrer en correspondance sur les échanges. Par-là je me propose le double avantage, celui d'être utile, et celui d'augmenter considé-

ra-

rablement ma Collection. Je prévient cependant les Amateurs, que les Oiseaux ou Singes qu'ils proposent en troc, doivent être purs, et intacts, garantissant de mon côté la bonne conservation des objets que je leur offre.

Les Marchands d'Histoire Naturelle répandus dans les pays étrangers, peuvent aussi, par là se mettre au fait des Oiseaux que j'ai, et juger de ceux d'ont l'acquisition me seroit agréable.

J'ai principalement suivi pour la classification de ce Catalogue le Système de LATHAM, étant le moins défectueux de tous les compilateurs, et j'ai cité la 13^{me} Edition de LINNE lorsqu'elle s'accordoit avec le système de l'Auteur Anglois.

Voici les Auteurs d'ont j'ai fait usage pour la Synonymie.

LATHAM Index Ornithologicus. — LINNE Edition de Gmelin. — AUDEBERT Histoire Naturelle des Singes et Makis. — LATHAM General Synopsis of birds, and

Supplement. — SONNINI Edition de Buffon. — BUFFON Oiseaux Edition in Folio. — LE VAILLANT Histoire Naturelle des Oiseaux d'Afrique — des Perroquets — Oiseaux de Paradis etc. in Folio. — EDWARDS Edition in Quarto. — AUDEBERT Oiseaux dorés in Folio. — VIEILLOT Oiseaux Chanteurs. — FRISCH Vögel Deutschlands. *J'ai cité aussi à l'article des Gallinacés mon ouvrage dont presque tous les dessins sont achevés, et qui va paroître incessamment, par cahiers de six planches avec leur description, il aura pour titre Histoire générale et complete des Gallinacés. — Ouvrage in folio en deux volumes orné de plus de deux cent planches, ou les Amateurs trouveront représentés environ quatre-vingt individus nouveaux, de la plus-part desquels aucun Auteur n'a fait mention; les Oiseaux de moyenne taille sont figurés de grandeur naturelle.*

Cette ouvrage fournira une monographie complete de tous les Oiseau qui ont rapport à la famille des Gallinacés; je n'ai épargné depuis
plus

plus de trois ans, ni travail, ni moyens pour compléter ce genre, en visitant les principaux Cabinets, et en rassemblant dans ma Collection plusieurs espèces primitives, qui rependront de nouvelles lumières sur ce Genre intéressant. — Les Cabinets qui se trouvent à Londres, ceux de Paris, d'Amsterdam etc. m'ont fourni une abondante recolte, d'objets rares et non décrits.

Afin de faciliter aux curieux l'inspection de mon Cabinet. Je prévient, que les Numeros placés sur le Catalogue, à côté de chaque individu, ont rapport au même Numero, que porte l'Oiseau déposé dans le Cabinet; le Male et la Femelle de chaque espèce sont placés sous le même Numero.

Les marques () derrière les Numeros des Oiseaux, qui n'ont point été décrits jusqu'à ces jours, servent de renvoy au même Numero, porté sur les Nôtes Explicatives des Caractères Physiques que j'ai cru devoir ajouter à ce Catalogue. — La collection renferme plusieurs espèces de Perroquets et Cacatoes, qui n'ont pas été*

VIII P R E F A C E.

été décrites , il m'a cependant semblé inutile d'en donner ici la description , ces Oiseaux allant paroître bientôt dans le supplément par le quel l'Estimable Auteur qui à décrit ce Genre se propose de compléter son interesfante monographie ; il en est de même des Promerops et des Guépriers, dont Mr. LE VAILLANT donnera l'Histoire à la suite des Oiseaux de Paradis ; Toucans et Barbus ; les Calaos nouveaux et non décrits , paroîtront aussi dans peu , par les soins du même Auteur.

Amsterdam,

1807.

C. J. TEMMINCK.



FAUTES ESSENTIELLES

à CORRIGER AVANT LA LECTURE.

<i>Préface</i>	<i>page</i>	1.	<i>ligne</i>	13.	<i>soucris</i> , lisez <i>souscris</i> .
<i>dito</i>	<i>p.</i>	6.	<i>l.</i>	21.	<i>Oiseau</i> , lisez <i>Oiseaux</i> .
<i>Catalogue</i>	<i>p.</i>	2.	<i>l.</i>	16.	PRAEMINANT, lisez PROÉMINANT.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	11.			Tout l'article du FALCO CYANEUS doit être ajouté à celui du FALCO PYGARGUS <i>page</i> 13, le premier étant le <i>Male</i> et le second la <i>Femelle</i> SOUBUSE.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	12.	<i>l.</i>	24.	Gmel. Syst. I. p. 245, lisez p. 254.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	16.	<i>l.</i>	5.	GONOLEK, lisez GONELEK.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	16.	<i>l.</i>	8.	GOFFROY, lisez GEOFFROY.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	19.	<i>l.</i>	6.	OHWL, lisez OWL.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	26.	<i>l.</i>	3.	GELLOW, lisez JELLOWL.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	30.	<i>l.</i>	28.	SCORLET, lisez SCARLET.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	31.	<i>l.</i>	25.	TAVONA, lisez TAVOUA.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	45.	<i>l.</i>	16.	Vaill. roll. pl. 35., lisez pl. 56.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	62.	<i>l.</i>	21.	L'EPECHE, lisez L'EPEICHE.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	67.	<i>l.</i>	17.	CAPENCIS, lisez CAPENSIS.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	69.	<i>l.</i>	2.	FÉCHEUR, lisez PÉCHEUR.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	73.	<i>l.</i>	28.	ERYTHORYNCHOS, lisez ERYTHORHYNCHOS.
<i>dito</i>	<i>p.</i>	77.			Se trouve à trois reprises CAYANEA, lisez CYANEA.

Cu-

<i>Catalogue</i>	p. 90.	l. 23.	CAYANEUS, lisez CYANEUS.
<i>dito</i>	p. 93.	l. 6.	CAYANURUS, lisez CAYANURUS.
<i>dito</i>	p. 94.	l. 11.	AMPELUS, lisez AMPELIS.
<i>dito</i>	p. 99.	l. 24.	COCCOTHTRAUSTUS, lisez COCCOTHTRAUSTES.
<i>dito</i>	p. 103,	l. 6.	CAYANEA, lisez CYANEA.
<i>dito</i>	p. 105.	l. 4.	FOUONDE, lisez FOU OU DE.
<i>dito</i>	p. 112.		FRINGILLA MONTIUM Gmel., lisez FRINGILLA MINUTA <i>Mihi</i> .
<i>dito</i>	p. 120.		ALAUDA NEMOROSA Gmel. lisez ALAUDA CRISTATELLA <i>Lath. Ind. v. 2. p. 499.</i>
<i>dito</i>	p. 128.	l. 11.	PETIT VERD, lisez PIPIT VERD.
<i>dito</i>	p. 133.	l. 6.	CAYANEUS, lisez CYANEUS.
<i>dito</i>	p. 141.	l. 14.	CAYANOCEPHALA, lisez CYANOCEPHALA.
<i>dito</i>	p. 165.	l. 6.	CARONCULATA, lisez CARONCULATA.
<i>dito</i>	p. 165.	l. 17.	CIONIA, lisez CICONIA.
<i>dito</i>	p. 166.	l. 11.	GRAZETTA, lisez GARZETTA.
<i>dito</i>	p. 168.	l. 4.	BULARAGAN, lisez BULARAGNAN.
<i>dito</i>	p. 189.		Tout l'article du MERGUS MINUTUS, doit être rajé, cet Oiseau étant une <i>Jeune Femelle</i> , du MERGUS ALBELLUS.
<i>dito</i>	p. 192.	l. 7.	GLARICULATA, lisez GALERICULATA.

Partout ou il y a décrit, lisez décrit.

SIMIA.

SINGE.

SIMIA MOLOCH. *Audebert* — LE MOLOCH *Audebert famille 1^{re} Section 2^{de} pl. 2.* — *Schreber Säugthiere Supplement pl. 3. B.* — des Moluques.

SIMIA SILENUS. (Femina) *Gmelin Sijst. 1. pag. 31. Species 10.* — L'OUANDEROU (Femelle) *Buffon Hist. Nat. Tab. 14.* — *Audebert fam. 2. Sect. 1^{re} pl. 3.* — *Schreber pl. 11.* — LION-TAILED APE *Pennant Quad.* — de Ceylan.

SIMIA PATAS. *Mihi* — LE PATAS à QUEUE COURTE *Buffon Suppl.* — *Audebert fam. 2^{de} Sect. 1^{re} pl. 4.* — des Indes Orientales.

SIMIA MAIMON. (Mas) *Gmelin pag. 29. Sp. 7.* — LE MANDRILL (Male) *Buff. Tab. 16 17.* — *Aud. fam. 2^{de} Sect. 2^{de} pl. 1.* — RIBBED-NOSE APE *Penn. pag. 103. pl. 69.* — *Schreber pl. 7.* — de la Côte de Guiné.

- SIMIA SPHINX. (Mas) *Gmelin pag. 29. Sp. 6.* —
 LE PAPION (Male) *Buffon Tab. 13 et 14.*
 — *Aud. fam. 3. Sect. 1. pl. 1.* —
Schreb. pl. 6. — d'Afrique.
- SIMIA SPHINX. (varietas) — LE PAPION VA-
 RIÉTÉ C. d'Afrique.
- SIMIA HAMADRYAS. (Mas) *Gmelin pag. 30. Sp.*
8. — L'HAMADRYAS (Male) — LE
 BABOUIN A MUSEAU DE CHIEN, ET
 LE SINGE DE MOCO *Buff. Suppl.* —
 DOG-FACED APE *Penn. Tab. 14. fig. 1.*
 — *Schreb. pl. 10.* — d'Afrique.
- SIMIA NICTITANS. (Femina) — *Gmelin pag.*
33. Sp. 23. — LE HOCHEUR *Aud. fam.*
4. Sect. 1^{re} pl. 2. — LA GUENON à
 NEZ BLANC PRAEMINANT *Buff. Suppl.*
 — De la Côte de Guinée.
- SIMIA SABÆA. (Mas) *Gmel. pag. 32. Sp. 18.*
 — LE CALLITRICHE *Buff. Tab. 37.*
 — *Aud. fam. 4. Sect. 2^{de} pl. 4.* —
 GREEN APE *Penn. Tab. 76.* — *Schreb.*
pl. 18. — Du Sénégal.
- SIMIA SABÆA. (var. Mas) LE CALLITRICHE
varieté (Male) *Aud. pl. 5.* — Du Sénégal
- SIMIA DIANA. (Mas) *Gmel. pag. 32. Sp. 17.* — LA
 DIANE (Male) *Aud. fam. 4. Sect. 2. pl. 6.*
 — SPOTED APE *Penn. pag. 112. N^o. 75.*
 — *Schreb. pl. 14.* — De la Côte de Guinée.
- SIMIA MONA. (Mas) *Gmel. pag. 34. Sp. 41.* —
 LA MONE (Male) *Buff. Tab. 36.* — *Aud.*
fam.

- fam. 4. Sect. 2. pl. 7. — VARIED APE Penn. p. 118. N°. 84. — Schreb. Tab. 15. — de l'Asie.*
- SIMIA ATYS.** (Mas) *Aud.* — **L'ATYS** (Male) *Aud. fam. 4. Sect. 2. pl. 8. — GRAND SINGE BLANC A. Seba Thes. — Des Indes Orientales.*
- SIMIA SINICA.** (Mas) *Gmelin pag. 34. Sp. 39. — LE BONNET CHINOIS (Male) Buff. Tab. 30. — Aud. fam. 4. Sect. 2. pl. 11. — CHINESE APE Penn. 117. N°. 83. — Schreb. Tab. 23. — Du Bengale.*
- SIMIA PETAURISTA.** (Mas) *Gmel. pag. 35. Sp. 44. — LE BLANC-NEZ (Male) Buff. Tab. 39. — Aud. fam. 4. Sect. 2. pl. 14. — Schreb. Tab. 19. B. — De la Côte de Guinée.*
- SIMIA AUDEBERTA.** (Femina) *Mihi — L'AUDEBERT (Femelle) fam. 4. Sect. 2^{de}. — Des Isles de l'Océan Indien.*
- SIMIA LATIBARBA.** (Mas) *Mihi — LE BARBIQUE (Male) fam. 4. Sect. 2^{de}. — LA GUENON à FACE POURPRE Buff. Suppl. — De Ceylan.*
- SIMIA RUBRA.** (Mas) *Gmel. pag. 34. Sp. 42. — LE PATAS (Male) fam. 4. Sect. 2. — LE PATAS à BANDEAU NOIR Buff. Tab. 25. — RED APE Penn. pag. 116. N°. 8. — Schreb. pl. 16. — Du Sénégal.*
- SIMIA SENICULUS.** (Mas et Femina) *Gmel. pag. 36. Sp. 13. — L'ALOUATE (Male et Femelle) Aud. fam. 5. Sect. 1. pl. 1. (la*
- A 2
- Fem-

- Femelle) — *Buff. Suppl.* — *Schreb. pl.*
25. — De l'Amerique Meridionale.
- SIMIA SENICULUS. (Pullus) — L'ALOUATE
dans son jeune age (Male)
- SIMIA APPELLA. (Mas) *Gmel. pag. 37. Sp. 29.* —
LE SAJOU (Male) *Buff. Tab. 4.* — *Aud.*
fam. 5. Sect. 2. pl. 2. — *Schreb. Tab. 28.*
— De l'Amerique Meridionale.
- SIMIA FATUELLUS. *Gmel. pag. 37. Sp. 28.* —
LE SAJOU CORNU *Buff. Suppl.* — *Aud.*
fam. 5. Sect. 2. fig. 1. — De l'Amerique
Meridionale.
- SIMIA CAPUCINA. (Mas) *Gmel. pag. 37. Sp.*
30. — LE SAI (Male) *Buff. Tab. 8.* —
Aud. fam. 5. Sect. 2. pl. 4. — WEEPER
APE *Penn. pag. 127. N^o. 94.* — *Schreb.*
Tab. 29. — De l'Amerique Meridionale.
- SIMIA CAPUCINA. (var. Mas) LE SAI varieté B.
Aud. pl. 6. — De l'Amerique Merid.
- SIMIA SCIUREA. (Mas) *Gmel. pag. 38. Sp. 31.* —
LE SAÏMIRI (Male) *Buff. Tab. 51.* —
Aud. fam. 5. Sect. 2. pl. 7. — ORANGE
APE *Penn. pag. 128. N^o. 95.* — *Schreb.*
Tab. 30. — De la Guyane.
- SIMIA PITHECIA. (Mas) *Gmel. pag. 39. Sp. 22.* —
LE SAKI (Male) *Buff. Tab. 12.* — *Aud.*
fam. 6. Sect. 1^{re}. pl. 1. — FOX TAILED
APE *Penn. pag. 130. N^o. 98.* — *Schreb.*
pl. 32. — De l'Amerique Meridionale.
- SIMIA LEUCOCEPHALA. *Aud.* — LE SAKI
YAR-

- YARQUÉ *Aud. fam. 6. Sect. 1. pl. 2.* —
De Surinam.
- SIMIA ROSALIA. *Gmel. p. 40. Sp. 26.* — LE
MARİKINA *Buff. Tab. 16.* — *Aud. fam.*
6. Sect. 2. pl. 3. — SILKY MONKEY
Penn. Tab. 15. — *Schreb. Tab. 35.* —
de l'Amérique Meridionale.
- SIMIA JACCHUS. *Gmel. pag. 39. Sp. 24.* —
L'OUISTITI *Buff. Tab. 14.* — *Aud.*
fam. 6. Sect. 2. pl. 4. — STRIATED
APE *Penn. pag. 132. N^o. 100.* — *Schreb.*
pl. 33. — De l'Amérique Meridionale.
- SIMIA MIDAS. *Gmel. p. 41. Sp. 27.* — LE
TAMARIN *Buff. Tab. 13.* — *Aud. fam.*
6. Sect. 2. pl. 5. — *Schreb. pl. 37.* —
De la Guijane.
- SIMIA PANISCUS. *Gmel. p. 36. Sp. 14.* —
LE COAÏTA *Buff. Tab. 15.* — *Aud.*
fam. 5. Sect. 1. pl. 2. — *Schreb. pl. 26.* —
De la Guijane.

LEMUR.

MAKI.

- LEMUR MONGOZ. *Gmelin Syst. 1. pag. N^o. 2.*
— LE MONGOUS *Buff. Suppl.* —
Audebert Hist. Nat. de Makis pl. 1. —
WOOLY MAUCAUCO *Pennant* — De
Madagascar.
- LEMUR RUFUS. *Audebert* — LE MAKIROUX
Audeb. pl. 2. — De Madagascar.
- LEMUR CATTÀ. *Gmelin pag. 43. N^o 4.* — LE

- MOCOCO *Buffon Suppl.* — *Audeb. pl. 4.*
 — RING-TAILED MAUCAUCO *Penn.*
Schreber pl. 39. B. — De Madagascar.
- LORIS GRACILIS. *Geoffroij* — LE LORIS
 GRÈLE *Buff.* — *Audeb. pl. 2.* — TAIL-
 LESS MAUCAUCO *Penn.* — *Schreb.*
pl. 37. — De Ceylan.
- TARSIUS DAUBENTONII. *Goffroij* — LE
 TARSIER *Buff.* — *Audeb. pl. 1.* —
 De Macasar.
- TARSIUS PUSILLUS. *Mihi.* — LE TARSIER
 NAIN. — Des Iles de l'Océan Indien.
- LEMUR VOLANS. *Gmelin pag. 44. N^o. 5.* —
 FELIS VOLANS TERNATANA *Seba* —
 GALEOPITHECUS RUFUS *Audebert* —
 LE GALEOPITHEQUE ROUX *Audebert*
Hist. Nat. des Sing. et Mak. pl. 1. —
 FLYING MAUCAUCO *Penn.* — *Schre-*
ber pl. 43. — De Ternate.

AVES.

OISEAUX.

GENUS VULTUR.

GENRE VAUTOUR.

- VULTUR LEUCOCEPHALUS. *Lath. Ind. v. 1. p. 2.* — LE VAUTOUR BLANC, OU
 (2) VAUTOUR OURIGOURAP d'Afrique *Vail-*
lant Oiseaux d'Afrique vol. 1. pl. 14. —
 VAUTOUR DE NORVEGE *Buff. pl. en-*
luminée 449.
- VULTUR PERCNOPTERUS. *Lath. Ind. v. 1. p.*
 (943) 2. — LE VAUTOUR PERCNOPTÈRE
 d'Eu-

d'Europe *Buff. pl.* 426. — ALPINE
VULTUR *Lath. Syn. v. 1. p.* 12.

VULTUR FULVUS. *Lath. Ind. v. 1. p.* 6. —
Gmel. 249. — LE VAUTOUR FAUVE,
(944) OU LE GRIFFON d'Europe *Buff. de Sonnini v. 2. p.* 102. — FULVOUS VULTURE *Lath. Syn. v. 1. p.* 17.

VULTUR PAPA. (Femina) *Lath. Ind. v. 1. p.* 4.
Gmel. p. 246. — LE ROI DES VAU-
(441) TOURS d'Amérique *Buff. pl.* 428. —
Vaill. Ois. d'af. v. 1. pl. 13. — THE
KING OF THE VULTURES *Lath. syn. v.*
1. p. 7.

VULTUR PAPA. (Junior avis) — LE ROI DES
(1034) VAUTOURS *Jeun age* d'Amérique.

————— LE PETIT VAUTOUR NOIR
(818*) à CALESON BLANC d'Amérique — *Es-
pèce non decrite.*

GENUS GYPAËTOS. GENRE GYPAËTE.

GYPAËTOS ALPINUS. *Daudin Ornith. v. 2. p.* 25.
— VULTUR BARBATUS *Lath. Ind. p.* 3.
— FALCO BARBATUS *Gmel. p.* 252. — LE
(976) GYPAËTE BARBU des Alpes *Sonnini v.*
2. p. 214. *pl.* 12. *f.* 2. — VULTURINE
EAGLE *Alb. v. 11. pl.* 3.

GENUS FALCO.

GENRE FAUCON.

- FALCO OSSIFRAGUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p. 255.* — LE GRAND AIGLE (678) DE MER, OU L'ORFRAIE (Male et Femelle) d'Europe *Buff. pl. 415 et 112.* — SEA EAGLE *Lath. Syn. v. p. 30.*
- FALCO ALBESCENS. (Femina) *Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p. IV.* — L'AIGLE BLANCHARD d'Afrique (Femelle) *Vaill. Ois. d'Af. v. I. pl. 3.* — NOISY EAGLE *Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 21. N^o. 10.*
- FALCO ECAUDATUS. *Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p. IV.* — L'AIGLE BATELEUR d'Afrique (13) *Vaill. Ois. d'Af. v. I. pl. 7.* — SHORT-TAILED EAGLE *Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 21.*
- FALCO PONDICERIANUS. *Gmel. Syst. I. p. 265.* — L'AIGLE BRUN DE PONDICHERI (12) *Buff. pl. 416.* — PONDICHARY EAGLE *Lath. Syn. v. I. p. 41.*
- FALCO HALIÆTOS. *Gmel. Syst. I. p. 263.* — LE PETIT AIGLE DE MER, OU LE (579) BALBUSARD d'Europe *Buff. pl. 414.* — OSPREY EAGLE *Lath. Syn. v. I. p. 45.*
- FALCO LEUCOGASTER. *Gmel. Syst. I. p. 257.* — L'AIGLE VENTRE BLANC à AILES (569) GRISES des îles de la mer pacifique *Sonnini Edit. de Buff. v. 2. p. 87.* — WHITE-BELLIED EAGLE *Lath. Syn. v. I. p. 33.*

FAL

- FALCO APIVORUS. *Gmel. Syst. 1. p. 267.* —
 LA BONDRÉE Male d'Europe *Buff. pl.*
 (685) 420. — HONEY BUZZARD *Lath. Syn.*
v. 1. p. 52.
- FALCO FURCATUS. *Gmel. Syst. 1. p. 262.* —
 LE MILAN à QUEUE FOURCHUE de la
 (507) Caroline *Buff. p. 158. v. 1. Edit. folio* —
 SWALLOW-TAILED FALCON *Lath. Syn.*
v. 1. p. 60.
- FALCO PARASITICUS. (Mas et Femina) *Lath. Ind.*
Orn. Supp. v. 2. p. 5. — LE MILAN
 (581) PARASITE d'Afrique *Vaill. Ois. d'Af. v.*
1. pl. 22. — PARASITE FALCON *Lath.*
Supp. to Syn. v. 2. p. 30.
- FALCO PALUMBARIUS. (Femina) *Gmel. Syst. 1.*
p. 269. — L'AUTOUR d'Europe (Femelle)
 (644) *Buff. pl. 418.* — GOSHAWK *Lath.*
Syn. v. 1. p. 58. N^o. 39.
- FALCO MELANOPTERUS. *Lath. Ind. Orn. Sup. v.*
2. p. VI. N^o. 16. — LE BLAC d'Afri-
 (583) que *Vaill. Ois. d'Af. v. 1. pl. 36.* —
 BLACK-WINGED FALCON *Lath. Syn.*
Supp. v. 2. p. 28. N^o. 23.
- FALCO MAGNIROSTRIS. *Gmel. Syst. 1. p. 282.*
 — L'ÉPERVIER à GROS BEC de Caij-
 (584) enne *Buff. pl. 464.* — GREAT-BIL-
 LED FALCON *Lath. Syn. v. 1. p. 103.*
- FALCO NISUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p.*
280. — L'ÉPERVIER (Male et Femelle)
 (686) d'Europe *Buff. pl. 412.* — SPARROW

- HAWK *Lath. Syn. v. 1. p. 99. N^o. 85. —*
Frisch T. 90.
- FALCO ÆRUGINOSUS. *Gmel. Syst. 1. p. 267. —*
 LE BUSARD DE MARAIS d'Europe *Buff.*
 (585) *pl. 424. — MOOR-BUZZARD Lath. Syn.*
v. 1. p. 53. — Frisch T. 77.
- FALCO AURANTIUS. *Gmel. Syst. 1. p. 283. —*
 LE HOBREAU NOIR à COU ROUX de
 (617) Caienne — ORANGE BREASTED HO-
 BY *Lath. Syn. v. 1. p. 105.*
- FALCO NÆVIUS. *Gmel. Syst. 1. p. 258. N^o. 49.*
 — LE PETIT AIGLE (Femelle) d'Eu-
 (774) rope *Buff. pag. 72. Edit. folio. — ROUG-*
FOOTED EAGLE Lath. Syn. v. 1. p. 37.
N^o. 14. — Frisch T. 71.
- FALCO TINNUNCULUS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 278. — LA CRESSERELLE
 (664) (Male et Femelle) d'Europe *Buff. pl. 401. et*
471. — KESTRIL FALCON Lath. Syn.
v. 1. p. 94. — Frisch T. 84 et 85.
- FALCO ÆSALON. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1.*
p. 284. N^o. 113. — L'ESMERILLON
 (817) (Male et Femelle) d'Europe *Buff. pl. 468. —*
FALCONERS-MERLIN Lath. Syn. v. 1.
p. 109. — Frisch T. 89.
- FALCO LITHOFALCO. *Gmel. Syst. 1. p. 278. —*
 LE ROCHIER (Male) d'Europe *Buff. pl.*
 (741) 447. — STONE FALCON *Lath. Syn.*
v. 1. p. 93. — Frisch T. 86.
- FALCO ALBICILLA. *Gmel. Syst. 1. p. 253. —*

LE

- LE GRAND PYGARGUE OU L'AIGLE À
 QUEUE BLANCHE d'Europe *Buff. v. 1.*
 (5) *p. 78.* — CINEROUS EAGLE *Lath.*
Syn. v. 1. p. 33.
- FALCO RUFUS. *Gmel. Syst. 1. p. 266.* — LE
 BUSARD HARPAYE d'Europe *Buff. pl.*
 (582) *460.* — HARPY FALCON *Lath. Syn.*
v. 1. p. 51. — *Frisch T. 78.*
- FALCO LANARIUS. *Gmel. Syst. 1. p. 276.* —
 LE LANIER d'Europe *Buff. v. 1. p.*
 (883) *192. Edit. folio* — THE LANNER *Lath.*
Syn. v. 1. p. 86.
- FALCO CAYANEUS. *Gmel. Syst. 1. p. 276.* (Mas
 et Femina) — L'OISEAU ST. MARTIN
 (882) d'Europe (Mâle et Femelle) *Buff. pl. 459.*
 (le Male) — HEN HARRIER *Lath. Syn.*
v. 1. p. 88. — *Frisch T. 79 et 80.*
- FALCO BUTEO. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 265. N^o.*
15. — LA BUSE d'Europe (Male) *Buff.*
 (851) *pl. 419.* — COMMON BUZZARD *Lath.*
Syn. v. 1. p. 48.
- FALCO COMMUNIS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 270.*
 — LE FAUCON (Male) d'Europe — *Buff.*
 (885) *Ois. v. 1. pl. 421.* — YEARLING FALCON
Lath. Syn. v. 1. p. 65. — *Frisch T. 74.*
- FALCO VARIEGATUS. *Gmel. Syst. 1. p. 267. N^o. 78.* } LA
 FALCO ALBIDUS. *Gmel. Syst. 1. p. 267. N^o. 79.* }
 (850) BUSE TACHETÉE OU LE BUSARDET
 d'Europe — SPECKLED BUZZARD
Lath. Syn. v. 1. p. 57. — BUZZARDET
Arct.

*Arct. Zool. v. 2. N^o. 109. — Borkhaufe
Deutsche Ornith. pl. enl.*

FALCO SUBBUTEO. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 283. — LE HOBÉREAU d'Europe
(886) (Male et Femelle) *Buff. pl. 431 et 432. —*
HOBBY *Lath. Syn. v. 1. p. 103. —*
Frisch T. 87.

FALCO PLUMIPES. *Daudin Orn. v. 2. p. 163.* } LA
FALCO LAGOPUS. *Gmel. Syst. 1. p. 260.* } BUSE
BUSE GANTÉE d'Europe et d'Afrique
(687) *Vaill. Oif. d'Af. v. 1. pl. 18. — Bork-
haufe Deutsche Ornith. — ROUGH-LEG-
GED FALCON Lath. Syn. v. 1. p. 75.*

FALCO CHICQUERA. *Lath. Sup. Ind. Orn. v.*
2. p. V. — LE CHICQUERA de Ben-
(887) gale *Vaill. Oif. d'Af. v. 1. pl. 20. —*
*Sonnini v. 3. p. 157. — CHICQUERA
FALCON Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 27.*

FALCO CHRYSÆTOS. (Mas) *Gmel. Syst. p. 256. —*
LE GRAND AIGLE, OU L'AIGLE ROY-
(970) AL *Buff. pl. 410. — GOLDEN EAGLE
Lath. Syn. v. 1. p. 31.*

FALCO MELANÆTUS. (Femina) *Gmel. Syst. 1.*
p. 245. — L'AIGLE NOIR d'Europe *Buff.*
(971) v. 1. p. 69. *Edit. folio — Frisch T. 69. —*
BLACK EAGLE *Lath. Syn. v. 1. p. 28.*

FALCO MILVUS. *Gmel. Syst. 1. p. 261. — LE*
(972) MILAN ROYAL d'Europe *Buff. pl. 422. —*
KITE FALCON *Lath. Syn. v. 1. p. 61.*

FALCO ALBUS. *White's Journal — LE FAU-
CON*

- CON BLANC de la nouvelle galle meridionale — WHITE HAWK *White's Journal p. 250. avec pl.*
- (958) FALCO PYGARGUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p. 277.* — LA SOUBUSE d'Europe (884) (Male et Femelle) *Buff. pl. 443.* — RING-TAIL FALCON *Lath. Syn. v. I. p. 89.*
- FALCO COMMUNIS. *Hornotinus. Gmel. Syst. I. p. 270.* — LE FAUCON SORS d'Europe (1016) *Buff. pl. 470.* — YEARLING FALCON *Lath. Syn. v. I. p. 65. A.*
- FALCO FULVUS. *Gmel. Syst. I. p. 256.* — L'AIGLE COMMUN *Buff. pl. 409.* — (1015) C'est le jeun age du grand Aigle, ou Aigle royal. — RING-TAIL EAGLE *Lath. Syn. v. I. p. 32.*
- FALCO BUTEO. *Albus* (Femina) — LA BUSE (946) BLANCHATRE d'Europe (Femelle) *Variété très rare.*
- LE FAUCON GRIS RAYÉ de (8*) la Guijane — *non décrit.*
- FALCO ATER. (Mas) *Lath. Ind. v. I. p. 21.* — *Gmel. p. 262.* — LE MILAN NOIR d'Europe (917) (Male) *Buff. pl. 472.* — BLACK KITE *Lath. Syn. v. I. p. 62.*
- FALCO PONDICERIANUS. *Hornotinus* — LE PETIT AIGLE BRUN DE PONDICHERY (816) *dans son premier age.*

GENUS LANIUS.

GENRE PIE-GRIËCHE.

- LANIUS COLLURIO. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
 1. p. 300. — LA PIE-GRIËCHE ECOR-
 (888) CHEUR (Male et Femelle) d'Europe *Buff.*
pl. 31. f. 1 et 2. — RED-BACKED
 SHRIKE *Lath. Syn. v. 1. p. 167. N^o. 25.*
- LANIUS RUTILUS. (Mas) *Lath. Ind. Orn.* }
 v. 1. p. 70. } LA
- LANIUS RUFUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 301.* }
 PIE-GRIËCHE ROUSSE d'Europe (Male)
 (889) *Buff. pl. 9. f. 2.* — WOODCHAT *Lath.*
Syn. v. 1. p. 169. — *Frisch T. 61.*
- LANIUS CAYANUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 304.*
 — LA BECARDE, OU PIE GRIËCHE
 (10) GRISE de Caijenne (Male) *Buff. pl. 304.* —
 CAIJENNE SHRIKE *Lath. Syn. v. 1. p.*
189.
- LANIUS SENEGALUS. *Gmel. Syst. 1. p. 304.* —
 LA PIE-GRIËCHE GRISE, OU LE
 (14) TCHAGRA du Sénégal *Vaill. Ois. d'Af. v.*
2. pl. 70. — *Buff. pl. 479.* — SENEGAL
 SHRIKE *Lath. Syn. v. 1. p. 162.*
- LANIUS EXCUBITOR. *Gmel. Syst. 1. p. 300.* —
 LA PIE-GRIËCHE GRISE d'Europe *Buff.*
 (13) *pl. 445.* — GREAT CINEROUS SHRI-
 KE *Lath. Syn. v. 1. p. 160. N^o. 4.* —
Frisch T. 60.
- LANIUS COLLARIS. *Gmel. Syst. p. 299.* —
 LA

- LA PIE-GRIËCHE GRISÈ, OU LE FISCAL d'Afrique, Cap de bonne Esperance
 (9) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 61. — Buff. pl. 477. — COLLARED SHRIKE — Lath. Syn. v. 1. p. 163.*
-
- LA PIE-GRIËCHE OLIVE du Cap de B. E. pays Auteniquoi (Male et Femelle) —
 (16) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 75 et 76.*
- LANIUS ITALICUS. *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 71.*
 LANIUS MINOR. *Gmel. Syst. 1. p. 308. —*
 LA PIE-GRIËCHE D'ITALIE *Buff. pl. (742) 32. f. 1. — LESSER GREY SHRIKE Lath. Syn. Supp. 1. p. 54.*
- LANIUS BRUBRU. (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p. XX. N. 15. —*
 (15) LA PIE-GRIËCHE BRUBRU d'Afrique (Male et Femelle) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 71. — CAPE SHRIKE Lath. Supp. Syn. v. 2. p. 78. N^o. 21.*
- LANIUS ÆTHIOPICUS. (Mas et Femina.) — *Mihi —*
 TURDUS ÆTHIOPICUS *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 357. —*
 (17) LA PIE-GRIËCHE BOUBOU d'Afrique, pays des Caffres (Male et Femelle) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 68. — ETHIOPIAM THRUSH. Lath. Syn. v. 1. p. 78.*
- LANIUS ANTIGUANUS. *Gmel. Syst. 1. p. 301. —*
 A PIE-GRIËCHE à DOS ROUX d'Antigüe — *Sonnerat voy. p. 114. pl. 70. — Sonn.*

- Sonn. v. 3. p. 314.* — ANTIGUAN SHRIKE *Lath. Syn. v. 1. p. 171.*
- LANIUS BARBARUS. *Gmel. Syst. 1. p. 304. N. 18.*
 — LA PIE-GRIËCHE ROUGE, OU LE GONOLEK du Sénégal *Buff. pl. 56.*
 (362) — *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 69.* — BARBARY SHRIKE *Lath. Syn. v. 1. p. 173. N. 23.*
-
- (27) LE GOFFROY OU PIE-GRIËCHE HUPPÉE du Sénégal *Vaill. Ois. d'Afr. pl. 80.*
- LANIUS BICOLOR. *Gmel. Syst. 1. p. 305. N^o. 27.* — PIE-GRIËCHE BLEUE de Madagascar (Male) *Buff. pl. 298.* — *Vaill. (521) Ois. d'Af. v. 2. pl. 73.* — *Lath. Syn. v. 1. p. 178. N^o. 29.*
- LANIUS ZEYLONUS. *Mihi* — TURDUS ZEYLONUS *Gmel. Syst. 1. p. 837.* — PIE-GRIËCHE BACBAKIRI d'Afrique (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 67.* — *Buff. pl. 272.* (Merle) — CEYLAN THRUSH *Lath. Syn. v. 2 p. 62. N^o. 72.*
- LANIUS DOLIATUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 309. N^o. 16.* — LA PIE-GRIËCHE (18) RAYÉE de Caienne (Male et Femelle) *Buff. pl. 297.* — PIED SHRIKE *Lath. Syn. v. 1. p. 190.*
- LANIUS CUBLA. (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p. XX. N^o. 16.* — LA PIE-GRIËCHE CUBLA d'Afrique (Male et Femelle) (19)

melle) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 72.* —
 HOTTNICUA SHRIKE *Lath. Syn. Supp.*
v. 2. p. 79. N. 22.

GENUS STRIX.

GENRE CHOUETTE.

- STRIX BUBO. (Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 286. N^o.*
 I. — LE GRAND-DUC, OU HIBOU
 (312) d'Europe (Femelle) *Buff. pl. 435.* — GREAT
 EARED OWL *Lath. Syn. v. 1. p. 116.*
N^o. 1. — *Frisch. T. 93.*
- STRIX OTUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p.*
 288. *N^o. 4.* — LE MOYEN DUC, OU
 (688) LE HIBOU d'Europe *Buff. pl. 29.* —
 LONG EARED OWL *Lath. Syn. v. 1. p.*
 121. *N^o. 5.* — *Frisch T. 99.*
- STRIX ASIO. *Gmel. Syst. 1. p. 289.* — LE PE-
 TIT DUC de la Caroline *Brisf. Orn. v. 1.*
 (618) *p. 497.* — RED EARED OWL *Lath.*
Syn. v. 1. p. 123. N^o 8.
- STRIX GRISEATA. (Mas et Femina) *Lath. Ind.*
Orn. Supp. v. 2. p. XV. N^o. 7. — LA CHOU-
 (316) ETTE à AIGRETTES BLANCHES de
 la Guiane (Male et Femelle) *Vaill. Ois.*
d'Af. v. 1. pl. 43. (le Male) — SUPER-
 CILIOUS OWL *Lath. Supp. to Syn. v. 2. p.*
 63. *N^o. 12.* — *La Femelle n'est pas de-*
crité.
- STRIX NYCTEA. *Gmel. Syst. 1. p. 201. N^o. 6.* —
 LE HARFANG des terres Septentrionales *Buff.*
 B pl.

- (314) *pl.* 458. — SNOWY OWL *Lath. Syn.*
v. I. p. 132. *Nº.* 17. — *Edw. T.* 61.
- STRIX NISUELLA. *Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2.*
p. XIV. *Nº.* 5. — LA CHOUETTE
 CHOUCOUHOU d'Afrique grand namaquois
- (315) *Vaill. Ois. d'Af. v. I. pl.* 39. — VA-
 RIEGATED OWL *Lath. Syn. Supp. v. 2.*
p. 62.
- STRIX ULULA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p.*
 294. — LA CHOUETTE OU GRANDE
- (689) CHÈVECHÉ (Male et Femelle) d'Europe *Buff.*
pl. 438. — BROWN OWL *Lath. Syn. v.*
I. p. 140. — *Frisch T.* 98.
- STRIX PASSERINA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 296. — LA CHÈVECHÉ, OU
- (690) PETITE CHOUETTE (Male et Femelle)
 d'Europe *Buff. pl.* 439. — LITTLE OWL
Lath. Syn. v. I. p. 150. — *Frisch T.* 100.
- STRIX ALUCO. *Gmel. Syst. I. p.* 292. — LA
 HULOTTE d'Europe *Buff. pl.* 441. —
- (892) BROWN OWL *Lath. Syn. v. I. p.* 134.
Nº. 20.
- STRIX ALUCO. *Junior* (Mas) *Mihi* — Strix
 Stridula *Gmel. Syst. I. p.* 294. — LA
- (693) HULOTTE JEUNAGE (Male) — le
 Chat-Huant *Buff. pl.* 437. — TAWNY
 OWL *Lath. Syn. v. I. p.* 139. *Nº.* 27.
- STRIX FLAMMEA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.* 293.
 — L'EFFRAIE OU LA FRESAIE d'Eu-

- (694) rope (Male) *Buff. pl.* 440. — WHITE OWL *Lath. Syn. v. 1. p.* 138. *N^o.* 26.
- STRIX BRACHIOTOS. *Gmel. Syst. 1. p.* 289. — LE DUC à COURTE CORNES, OU LE
- (891) BRACHIOTE d'Europe — SHORT-EARED OWL *Lath. Syn. v. 1. p.* 124. *N^o.* 9.
- STRIX NEBULOSA. *Gmel. Syst. 1. p.* 291. — LA CHOUETTE NEBULEUSE, OU GRAN-
- (775) DE CHOUETTE RAYÉE DE BLANC d'Amérique *Sonnini Edit. de Buffon v. 4. p.* 202. — BARRED OWL *Lath. Syn. v. p.* 133.
- STRIX SCOPS. *Gmel. Syst. 1. p.* 290. — LE PETIT DUC, OU LE SCOPS d'Europe
- (743) *Buff. pl.* 436. — SCOPSEARED OWL *Lath. Syn. v. 1. p.* 129. *N^o.* 15.
- STRIX DASYPUS. (Femina) *Bechstein Orn. Taschen. v. 1. p.* 57. *N^o.* 12. — LA CHÈVÉ-
- (893) CHÉ PERLÉE d'Europe (Femelle) — CHOUETTE PATTUE *Meyer Deut. Orn. pl. enlu.*
- STRIX SCOPS. *Africanus* (Femina) *Mihi* — LE PETIT DUC, OU LE SCOPS d'Afrique Cap
- (720) de Bonne Espérance *Vaill. Ois. d'As. v. 1.*
- STRIX SCOPS. *Americanus* (Mas) *Mihi* — Strix Brasiliiana *Lath. Ind. v. 1. p.* 55.
- (607) — LE PETIT DUC, OU LE SCOPS d'Amérique (Male) — le Scops roux, ou le Caboure d'Amérique *Buff. v. 2. p.* 503.

Edit. folio — BRASILIAN EARED
 OWL *Lath. Syn. v. 1. p. 125. N^o. 10.*

GENUS PSITTACUS. GENRE PERROQUET.
 DIVISION CACATOË.

PSITTACUS ROSACÆUS. *Gmel. Syst. 1. p. 331.*

— LE CACATOË à HUPPE ROUGE
 (550) des Indes Orientales *Buff. pl. 498* —
 GREAT RED CRESTED COCKATOO
Lath. Syn. v. 1. p. 257. N^o. 62. —
Edw. T. 160. — *Vaill. perroq. Supp. v. 3.*

PSITTACUS SULPHUREUS. *Gmel. Syst. 1. p.*
 330. — LE PETIT CACATOË à HUP-

(464) PE JAUNE des Moluques (Male) *Buff. pl.*
 14. (le Grand) *Lath. Syn. v. 1. p. 259.*

PSITTACUS BANKSII. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v.*
 1. p. 107. N^o. 76. — LA CACATOË

(535) BANKS (Male) de la nouvelle Galle du Sud.
 — BANKIAN COCKATOO *Lath. Supp.*
Syn. v. 1. p. 63. pl. 109.

PSITTACUS BANKSII. (Hornotinus) — LE CA-
 CATOË BANKS DANS SON JEUN AGE

(1007) (Femelle) *Vaill. perroq. Supp. v. 3.*

PSITTACUS FUNEREUS. *Lath. Ind. Orn. Supp.*
 v. 2. p. XXII. N^o. 10. — LE CACATOË

(542) à OREILLES JAUNES, OU LE KAR-
 RAT de la nouvelle Hollande — FUNE-
 RAL COCKATOO *Nat. Misc. pl. 186.*

PSITTACUS GALEATUS. (Mas et Femina) *Lath.*
Supp.

- Supp. to Ind. Orn. v. 2. p. XXIII. N^o. 13.*
 (543) — LE CACATOË à TÊTE CRAMOISI
 de la nouvelle Hollande (Male et Femelle) —
 RED CROWNED PARROT. *Lath. Supp.*
to Syn. v. 2. p. 369. pl. 140. — Grant.
discy. n. s. w. p. 135. pl. enluminée.
- PSITTACUS CRISTATUS. *Gmel. Syst. 1. p. 331.*
 — LE CACATOË à HUPPE BLANCHE
 (848) des Moluques *Buff. pl. 263. — Vaill.*
Supp. — GREAT WHITE COCKATOO
Lath. Syn. v. 1. p. 256.
- PSITTACUS ACCIPITRINUS. (Mas) *Gmel. Syst.*
1. p. 345. — LE PORREQUET CACA-
 (463) *TOË MAILLÉ* de la Guiane (Male) *Buff. pl.*
526. — Vaill. Supp. perroq. — Mailed
Parrot Lath. Syn. v. 1. p. 267.
- PSITTACUS LATHAMI. (Mas) *Mihi — PSIT-*
TACUS BANKSII (varietas y) — LE CA-
 (544) *CATOË LATHAM, OU CACATOË NOIR*
à QUEUE CRAMOISI (Male) de la Baïe
 Botanique — *BANKIAN CACKATOO*
Phyll. Bot. Bay. T. p. 166. — Lath. var. B.

DIVISION ARA,

- PSITTACUS MACAO. *Gmel. Syst. 1. p. 312. N^o.*
1. — l'Ara rouge Buff. pl. 12. —
 (548) *L'ARA MACAO* de la Jamaïque *Vaillant*
H. N. des perroquets v. 1. pl. 1. — RED

- AND BLEUE MACKAW *Edw. pl.* 158.
 — *Lath. Syn. v. 1. p.* 199. N^o. 1.
- PSITTACUS ARACANGA. *Gmel. Syst. 1. p.*
 313. N^o. 52. — Le petit Ara rouge
 (488) *Buff. pl.* 641. — L'ARA CANGA de la
 Guiane *Vaill. perroq. v. 1. pl.* 2. — RED
 AND YELLOW MACKAW *Lath. Syn. v.*
1. p. 201.
- PSITTACUS ARARAUNA. *Gmel. Syst. 1. p.*
 313. — l'Ara bleu *Buff. pl.* 36. —
 (508) L'ARA RAUNA du Bresil (Male) *Vaill. per-*
roq. v. 1. pl. 3. — BLEU AN YELLOW
 MACKAW *Lath. Syn. v. 1. p.* 204. N^o.
 4. — *Edw. pl.* 159.
- PSITTACUS MILITARIS. *Gmel. Syst. 1. p.* 313.
 N^o. 2. — L'ARA MILITAIRE du Bre-
 (853) fil *Vaill. perroq. v. 1. pl.* 4. — GREAT
 GREEN MACKAW *Edw. pl.* 313. — MI-
 LITARY MACKAW *Lath. Syn. v. 1. p.*
 202.
- PSITTACUS MAKAVOUANNA. *Gmel. Syst. 1.*
p. 314. — Periche Ara *Buff. pl.* 864.
 (533) — L'ARA MACAVOUANNE de la Gui-
 ane (Male) *Vaill. perroq. v. 1. pl.* 7. —
 PARROT MACKAW *Lath. Syn. v. 1. p.*
 205. N^o. 5.
- PSITTACUS SEVERUS. *Gmel. Syst. 1. p.* 315.
 — l'Ara vert *Buff. pl.* 383. — L'ARA
 (534) MARACANA (Male) du Bresil *Vaill. perroq.*
v.

v. I. pl. 8. — BRASILIAN GREEN
MACKAW *Edw. pl.* 229. — *Lath. Syn.*
v. I. p. 208.

- PSITTACUS ATERRIMUS. *Gmel. Syst.* I. p.
330. — Le Kaketoës noir *Buff. v.* 7.
(373) p. 79. *Edit. folio* — L'ARA NOIR à
TROMPE de Java *Vaill. perroq. v. I.*
pl. 12. — Black Cockatoo *Lath. Syn.*
v. I. p. 260. N^o. 66.

DIVISION PERRUCHE.

- PSITTACUS GUJANENSIS. *Gmel. Syst.* I. p.
324. N^o. 70. — La Perruche pavouane
(551) *Buff. pl.* 167. — PERRUCHE ARA PA-
VOUANE (Male) de la Guiane *Vaill. perroq.*
v. I. pl. 14. — PAVOUANE PARROT
Lath. Syn. p. 232.
PSITTACUS VERSICOLOR. *Gmel. Syst.* I. p. 327.
N^o. 78. — LA PERRUCHE ARA à
(177) GORGE VARIÉE de Surinam *Vaill. per-*
roq. v. I. pl. 16. — *Buff. pl.* 144. —
WAVED-BREASTED PARROT *Lath.*
Syn. v. I. p. 245. N^o. 44.
PSITTACUS GUAROUBA. *Gmel. Syst.* I. p. 320.
— La Perruche Jaune *Buff. pl.* 525.
(512) — LA PERRUCHE ARA GUAROUBA de Caienne (Male) *Vaill. perroq. v. I.*
pl. 18. — BRASILIAN YELLOW PAR-
ROT *Lath. Syn. v. I. p.* 225. N^o. 28.

PSITTACUS TORQUATUS. *Gmel. Syst.* I. p.

321. — LA PERRUCHE à COLLIER
 (399) ROSE (Male) des Indes *Buff. pl.* 551. —
Vaill. perr. v. I. pl. 22. — ROSE RING-
 ED PARRAKEET *Lath. Syn. v. I. p.*
 235.

PSITTACUS TORQUATUS. (Pullus) — LA PER-
 RUCHE à COLLIER ROSE JEUN AGE
 (395) *Vaill. perr. v. I. pl.* 23.

- PSITTACUS CAROLINENSIS. *Gmel. Syst. I. p.*
 320. *pl.* 13. — LA PERRUCHE à TÊTE
 (477) JAUNÈ de la Caroline *Buff. pl.* 499. —
Vaill. perr. v. I. pl. 33. — CAROLINE
 PARROT *Lath. Syn. v. I. p.* 227.

- PSITTACUS ALEXANDRI. *Gmel. Syst. I. p.*
 321. — LA GRANDE PERRUCHE à
 (527) COLLIER des îles Maldives *Buff. pl.* 642. —
Vaill. perroq. v. I. pl. 30. — ALEXAN-
 DRINE PARRAKEET *Lath. Syn. v. I. p.*
 234.

- PSITTACUS MOLUCCANUS. *Gmel. Syst. I. p.*
 316. — LA PERRUCHE à TÊTE
 (461) BLEUE des Moluques *Buff. pl.* 743. —
Vaill. perr. v. I. pl. 24. — RED BREAS-
 TED PARROT *Lath. Syn. v. I. p.* 212.
 N^o. 14.

LA PERRUCHE
 OMNICOLORE des îles de la mer du Sud
 (330) *Vaill. perroq. v. I. pl.* 28.

- PSITTACUS PONDICERIANUS. *Gmel. Syst. I.*
p. 325. — LA PERRUCHE à MOUS-
 TA-

(404) TACHES *Buff. pl.* 517. — LA PERRU-
CHE à POITRINE ROSE du Bengale
Vaill. perroq. v. I. pl. 31. — MUSTACHO
PARRAKEET *Lath. Syn. v. I. p.* 238.
N^o. 38.

PSITTACUS PERTINAX. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.*
322. N^o. 15. — LA PERRUCHE à
(552) FRONT JAUNE, OU L'APUTE JUBA
d'Amérique (Male) *Buff. pl.* 528. — *Vaill.*
perroq. v. I. pl. 34. — ILLINOIS PER-
ROT *Lath. Syn. v. I. p.* 228. N^o. 30.

PSITTACUS NOVAE GUINEÆ. *Gmel. Syst.*
I. p. 319. — LE LORY NOIR de la
(168) nouvelle Guinée *Sommerat Voy. p.* 175. —
Vaill. perroq. v. I. pl. 49. — BLACK LO-
RY *Lath. Syn. v. I. p.* 221. N^o. 13.

PSITTACUS ORNATUS. *Gmel. Syst. I. p.* 324.
— LA PERRUCHE LORI des Indes *Buff.*
(174) *pl.* 552. — *Vaill. perroq. v. I. pl.* 52. —
LORY PARRAKEET *Lath. Syn. v. I. p.*
221. N^o. 24.

PSITTACUS TABUENSIS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 317. — LA GRANDE PER-
(538) RUCHE à COLLIER ET CROUPION
BLEUE de Tongataboo (Male et Femelle)
Vaill. perroq. v. I. pl. 55 et 56. — TA-
BUAN PARROT *Lath. Syn. v. I. p.* 214.
N^o. 16, et *Supp. to Syn. v. 2. p.* 81. N^o.
2. — *Phill. voy. p.* 255.

PSITTACUS VIRESCENS. *Gmel. Syst. I. p.*

326. — LA PERRUCHE AUX AILES
 (547) VARIÉES de Caienne *Buff. pl.* 359. —
Vaill. perroq. v. 1. pl. 57. — GELLOW-
 WINGED PARRAKEET *Lath. Syn. v. 1.*
p. 244. N^o. 43.

- LA PERRUCHE à TA-
 CHES SOUCI de Caienne (Male) *Vaill.*
 (532) *perroq. v. 1. pl.* 58.

PSITTACUS AUSTRALIS. *Lath. Ind. Orn. v. 1.*
p. 104. N^o. 66. — LA PERRUCHE à

- (142) BANDEAU ROUGE de la nouvelle Galle du
 Sud *Vaill. perroq. v. 1. pl.* 48. — CRIM-
 SON FRONTED PARRAKEET *Lath. Supp.*
to Syn. v. 2. p. 87. N^o. 12.

PSITTACUS TAITIANUS. *Gmel. Syst. 1. p.* 329.

- LA PERRUCHE ARIMANON de
 (398) l'isle de Taiti *Buff. pl.* 455. *fig.* 2. — *Vaill.*
perroq. v. 1. pl. 65. — OTHAEITAN
 BLUE PARRAKEET *Lath. Syn. v. 1.*
p. 255.

- LA PERRUCHE ED-
 WARDS des iles de la mer du Sud *Vaill.*
 (524) *perroq. v. 1. pl.* 68.

PSITTACUS MELANOPTERUS. *Gmel. Syst. 1.*
p. 350. — LA PERRUCHE JAVANE

- (179) *Vaill. perroq. v. 1. pl.* 69. — PETITE
 PERRUCHE de Batavia *Buff. pl.* 791. *fig.*
 1. — BLACK-WINGED PARRAKEET
Lath. Syn. v. 1. p. 316.

PSITTACUS TABUENSIS (Junior) — LA
 GRAN-

GRANDE PERRUCHE à COLLIER ET
(545) CROUPION BLEUE de Tongataboo *Jeun-*
age.

PSITTACUS GUAROUBA. (Varietas) — LA
PERRUCHE ARA GUAROUBA *Variété*
(522) *toute verte* (Male)

PSITTACUS MALACCENSIS. *Gmel. Syst. I. p.*
325. — GRANDE PERRUCHE à LONG-
(540) BRINS de Malac *Buff. pl. 887.* — LA
PERRUCHE à NUQUE ET JOUES
ROUGES *Vaill. perroq. v. 2. pl. 72.* —
MALACCA PARAKEET *Lath. Syn. v.*
I. p. 241.

PSITTACUS BENGALENSIS. *Gmel. Syst. I. p.*
325. — Petite Perruche couleur de Rose
(190) à long-brins, ou la Perruche de Mahé *Buff.*
pl. 888. — LA PERRUCHE FRIDY-
TUTAH du Bengale *Vaill. perroq. v. 2. pl.*
74. — ROSE-HEADED RING PARRA-
KEET *Lath. Syn. v. I. p. 239.* — *Edw.*
pl. 233.

PSITTACUS PAPUENSIS. *Gmel. Syst. I. p. 317.*
— LA PERRUCHE LORI PAPOU de la
(546) terre des Papou *Vaill. perroq. v. 2. pl. 77.* —
Sonnerat p. 175. pl. 3. — PAPUAN LO-
RY *Lath. Syn. v. I. p. 215. N^o. 17.*

PSITTACUS PENNANTII. (Mas) *Lath. Ind. Orn.*
v. I. p. 90. — LA PERRUCHE à LARGE
(498) QUEUE BLEUE de la nouvelle Galle du
Sud (Male) *Vaill. perr. p. 78.* — PEN-
NAN-

NANTIAN PARROT *Lath. Syn. Supp. v. 1. p. 61.* — *White's Journ. pl.*

PSITTACUS PENNANTII. (Pullus) — LA PERRUCHE à LARGE QUEUE BLEUE, de la (752) nouvelle Galle du Sud *Jeun age* (Male)

PSITTACUS FORMOSUS. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 103.* — LA PERRUCHE INGAMBE, OU LE GOOLING NANG du Cap de Dicmen (Male) *Vaill. perroq. v. 1. pl. 32.* — BLACK SPOTTED PARRAKET *Voy. d'Entercastaux atlas pl. 10.* — GROUND PARROT *Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 86. N^o. 10.*

PSITTACUS DISCOLOR. (Femina) *Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p. 21.* — LA PERRUCHE (810) LATHAM (Femelle) des îles de l'Océan Austral *Vaill. perroq. v. 1. pl. 62.* — RED SHOULDERED PARRAKEET *White's Journ. p. 263.* — *Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 90.*

PSITTACUS PUSILLUS. *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 106.* — LA PERRUCHE à FACE ROUGE des îles de l'Océan Austral *Vaill. perroq. v. 1. pl. 63.* — SMALL PARRAKEET *Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 88. N^o. 13.* — *White's Journ. p. 262.*

PSITTACUS BISETIS. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 102.* } LA
 PSITTACUS CORNUTUS. *Gmel. Syst. 1. p. 327.* }
 — PERRUCHE à CORNES, OU LE
 KE-

(180) KERÉ de la nouvelle Calédonie (Male) *Vaill. perroq. Supp.* — HORNED PARROT
Lath. Syn. v. 1. p. 248. pl. 8. — *Cook's Voy. v. 2. p. 110.*

————— LA PERRUCHE PHIGY
de la nouvelle Calédonie (Male) *Vaill. perroq. v. 1. pl. 64.*

————— LA PERRUCHE FRINGILLAIRE d'Othaiti *Vaillant pl. 71. vol. 1.*

DIVISION PERROQUET.

PSITTACUS ERITHACUS. *Gmel. Syst. 1. p. 332.*
—— LE PERROQUET CENDRÉ OU
(510) JACO de Guiné *Buff. pl. 311.* — *Vaill. perroq. v. 2. pl. 99.* — ASCH-COLOURED PARROT *Lath. Syn. v. 1. p. 261. N^o. 68.*

PSITTACUS AMAZONICUS *Lath. Ind. Orn.* }
v. 1. p. 120. }
PSITTACUS OCHROCEPHALUS. *Gmel. Syst.* } LE
1. p. 339. }

(509) PERROQUET AMAZONE de l'Amérique Meridionale (Male) *Vaill. perroq. v. 2. pl. 84.* — YELLOW HEADED AMAZONS PARROT *Lath. Syn. v. 1. p. 282.*

PSITTACUS AMAZONICUS. (varietas) — LE PERROQUET AMAZONE TAPIRÉ DE JAU-

(545) JAUNE quaterième variété *Vaill. perroq. v. 2. pl. 89.*

PSITTACUS AURORA. *Gmel. Syst. 1. p. 342.* —
LE PERROQUET AMAZONE JAUNE

(133) *Buff. pl. 13.* — *Vaill. perroq. v. 2. pl. 90.*
— AURORA PARROT *Lath. Syn. v. 1. p. 301. N^o. 106.*

PSITTACUS AURORA. *Viridis* (Mas) — LE
PERROQUET AMAZONE JAUNE VER-

(1056) DATRE (Male) — *Variété intermediaire.*

PSITTACUS PULVERULENTUS. *Gmel. Syst. 1.*
p. 341. — LE PERROQUET MEUNIER

(536) de Caijenne *Buff. pl. 861* — *Vaill. perroq. v. 2. pl. 92.* — MEALLY PARROT
Lath. Syn. v. 1. p. 291. N^o. 94.

LE PERROQUET
LORI RADHIA des Moluques (Male) *Vaill.*

(414) *perroq. v. 2. pl. 94.*

PSITTACUS DOMICELLA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
334. N^o. 26. — LE PERROQUET LORI

(518) à COLLIER JAUNE (Male) des Indes
Orientales *Vaill. perroq. v. 2. pl. 95.* —
Buff. pl. 119. — BLUE-CAPED LORY
Lath. Syn. v. 1. p. 271.

PSITTACUS MOLUCCENSIS. *Gmel. Syst. 1. p. 334.*

— LE PERROQUET LORI-NOIRA
des Moluques *Vaill. perroq. v. 2. pl. 96.*

(529) — *Buff. pl. 216.* — SCORLET LORY
Lath. Syn. v. 1. p. 270. N^o. 76. B.

PSIT-

PSITTACUS OCHROPTERUS. *Gmel. Syst. 1. p.*
341. — Le Crik à tête et Gorge jaune

(553) *Buff. v. 7.* — LE PERROQUET à
EPAULETTES JAUNES de l'Amérique
Meridionale *Vaill. perroq. v. 2. pl. 98. bis.*
— YELLOW-WINGED PARROT *Lath.*
Syn. v. 1. p. 289. N^o. 93.

PSITTACUS LEUCOCEPHALUS. (Mas et Femina)
Gmel. Syst. 1. p. 338.

(549) — l'Amazone à tête blanche *Buff.* }
pl. 335. }
— le Perroquet à ventre pourpre *Buff.* } ^{LE}
pl. 549. }

PERROQUET à FACE ROUGE (Male et
Femelle) de St. Domingue *Vaill. pl. 107 et*
108. — WHITE FRONTED PARROT
Lath. Syn. v. 1. p. 279. N^o. 88.

PSITTACUS LEUCOCEPHALUS. (Pullus) —
LE PERROQUET à FACE ROUGE dans
(751) son premier état *Vaill. perroq. v. 2. pl. 109.*

PSITTACUS ÆSTIVUS. *Gmel. Syst. 1. p. 340.* —
LE PERROQUET AOUROU-COURAOU
(531) (Male) de la Guiane *Buff. pl. 547. — Vaill.*
perroq. v. 2. pl. 110. — COMMON AMA-
ZONS PARROT *Lath. Syn. v. 1. p. 284.*
N^o. 91.

PSITTACUS FESTIVUS. *Gmel. Syst. 1. p. 344.*
— LE PERROQUET TAVONA de la
(785) Guiane *Buff. pl. 840. — Vaill. perroq. v. 2.*
pl.

- pl.* 129. — FESTIVE PARROT *Lath.*
Syn. v. 1. p. 298.
- PSITTACUS MELANOCEPHALUS. *Gmel. Syst.*
1. p. 346. — LE PERROQUET MAÏPOU-
 (528) RI de Caienne *Buff. pl.* 527. — *Vaill.*
perroq. v. 2. pl. 119 — WHITE-BREAS-
 TED PARROT *Lath. Syn. v. 1. p.* 305
 — *Edw. pl.* 169.
- PSITTACUS MENSTRUSIS. (Mas) *Gmel.* }
Syst. 1. p. 345. N^o. 39. }
 PSITTACUS PURPUREUS. (Femina) *Gmel.* } LE
Syst. 1. p. 346. N^o. 124. }
- (530) PERROQUET à CAMAIL BLEU (Male
 et Femelle) de la Guiane *Vaill. perroq. v.*
2. pl. 114 et 115. — Le Perroquet à
 tete bleue *Buff. pl.* 384. (Male) —
 le Perroquet varié de Caienne *Buff. pl.* 408.
 (Femelle) — BLUE HEADED PAR-
 ROT *Lath. Syn. v. 1. p.* 301. N^o. 107 et
 108. — *Edw. pl.* 314 et 315.
- PSITTACUS LORY. *Gmel. Syst. 1. p.* 335. —
 Le Lory des Philippines *Buff. pl.* 168. —
 (169) LE PERROQUET LORI à SCAPULAI-
 RE BLEU (Male) des Moluques *Vaill.*
perroq. v. 2. pl. 123. — FIRST BLACK-
 CAPPED LORY *Lath. Syn. v. 1. p.* 273.
Edw. pl. 170.
-
- LE PERROQUET
 LORI à FRANGES BLEUES (Male) des
 (347) Moluques *Vaill. perroq. v. 2. pl.* 93.

PSIT-

PSITTACUS GRANDIS. *Gmel. Syst. I. p. 335.* —
 LE PERROQUET GRAND LORI des Mo-
 (434) luques *Buff. pl. 683.* — *Vaill. perroq. v.*
2. pl. 126. — GRAND LORY *Lath.*
Syn. v. 1. p. 275. N^o. 81.

LE PERROQUET GE-
 OFFROY (Male) des îles de l'Océan Austral.
 (961) *Vaill. Hist. Nat. des perroq. v. 2. pl. 112.*

LE PERROQUET GE-
 OFFROY à TÊTE BRUNE (le Male) dans
 (1060) son jeune âge — *non décrit.*

LE PERROQUET à
 RAQUETTES de la nouvelle Calédonie
 (856) *Vaill. perr. Supp.*

DIVISION TUI.

PSITTACUS GALGULUS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 349. — LE TUI à COU-
 RONNE SAPHIR des îles Philippines (Male
 (170) et Femelle) *Vaill. perr. Supp.* — Petite Per-
 ruche à tête bleue du Pérou *Buff. pl. 190.*
F. 2. — SAPHIR CROWNED PARRA-
 KEET *Lath. Syn. v. 1. p. 312.* — *Edw.*
t. 293. f. 2.

PSITTACUS PULLARIS. *Gmel. Syst. I. p. 348.*
 — LA PERRUCHE à TÊTE ROUGE
 (171) de Guinée *Buff. pl. 60.* — *Vaill. perr. Supp.*
 — RED HEADED GUINEA PARRA-
 KEET *Lath. Syn. v. 1. p. 309.*

C

PSIT-

- PSITTACUS PHILIPPENSIS. (Mas et Femina)
Gmel. Syst. 1. p. 349. — LE COULAC-
 (173) CISSI des Philippines (Male et Femelle)
Vaill. perroq. Supp. — *Buff. pl. 520. f. 1 et 2* — PHILIPPINE PARRAKEET
Lath. Syn. v. 1. p. 311.
- PSITTACUS CAPENSIS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 350.* — PERRUCHE à AILES
 (176) BLEUES d'Afrique *Buff. pl. 455. f. 1.* —
Vaill. perr. Supp. — BLUE WINGED
 PARRAKEET *Lath. Syn. v. 1. p. 317.*
- PSITTACUS CANUS. *Gmel. Syst. 1. p. 350.* —
 LA PERRUCHE TUI à TÊTE GRISE de
 (181) Madagascar *Buff. pl. 791. f. 2.* — *Vaill. perroq. Supp.* — GREY-HEADED PARRAKEET
Lath. Syn. v. 1. p. 315.
- PSITTACUS PURPURATUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 350.* — LA PERRUCHE TUI à
 (340) QUEUE POURPRÉE (Male) de Caienne
Sonnini Edit. de Buff. v. 28. p. 97. —
Vaill. perroq. Supp. — PURPLE TAI-
 LED PARRAKEET *Lath. Syn. v. 1. p. 315.*
- PSITTACUS PASSERINUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 342.* — PERRUCHE TUI-ÉTÉ du
 (849) Brésil (Male) *Buff. v. 7.* — *Vaill. perroq. Supp.* — LITTLE BLUE AND GREEN
 PARRAKEET *Lath. Syn. v. 1. p. 319.* —
Edw. t. 235.

 LE TUI à FACE

RO-

ROSE d'Afrique pays des Grands Namaquois
(172) *Vaill. perroq. Supp.*

GENUS RAMPHASTOS. GENRE TOUCAN.

RAMPHASTOS TOCO. *Gmel. Syst. I. p. 356.* —
LE TOUCAN TOCO de la Gujane *Buff.*
(93) *pl. 82.* — *Vaill. Histoire naturelle des*
toucans pl. 2. — THE TOCO *Lath. Syn.*
v. I. p. 325. pl. 9.

RAMPHASTOS DICOLORUS. *Gmel. Syst. I. p.*
356. — TOUCAN à GORGE JAUNE,
(94) OU LE PIGNANCOIN de Caienne *Buff.*
pl. 269. — *Vaill. H. N. Toucans pl. 7.*
— YELLOW THROATED TOUCAN
Lath. Syn. v. I. p. 325.

RAMPHASTOS ERYTHORHYNCHOS. *Gmel.*
Syst. I. p. 355. — TOUCAN à GOR-
(95) GE BLANCHE, OU LE TOCAN de l'Ame-
rique meridionale *Buff. pl. 262.* — *Vaill.*
Touc. pl. 3. — RED BEAKED TOUCAN
Lath. Syn. v. I. p. 328.

RAMPHASTOS ERYTHORHYNCHOS. (Varietas) — TOUCAN à GORGE BLANCHE
(580) ET COLIER JAUNE (Variété) du Tocan
Vaill. H. N. Toucans pl. 4.

RAMPHASTOS ARACARI. *Gmel. Syst. I. p.*
354. — L'ARACARI VERD à CINTU-
(520) RON ROUGE, OU LE GRIGRI du Bresil
Vaill. H. N. Touc. pl. 10. — *Buff. pl.*

166. — ARACARI TOUCAN *Lath. Syn.*
v. 1. p. 332. N^o. 10.

RAMPHASTOS ARACARI. (Varietas) — ARA-
CARI VERD à CINTURON ROUGE, OU
(334) LE GRIGRI dans son extrême Vieillesse
Vaill. H. N. Touc. pl. 12.

RAMPHASTOS PIPERIVORUS. (Mas et Femina)
Gmel. Syst. 1. p. 353. — L'ARACARI
(96) KOULIK du Bresil (Male et Femelle) *Vaill.*
Toucans pl. 15 et 16. — *Buff. pl. 577 et*
729. — PIPERINE TOUCAN *Lath.*
Syn. v. 1. p. 334. — *Edw. pl. 330.* (the
Male)

RAMPHASTOS VIRIDIS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 353. — L'ARACARI VERD
(87) de Caienne (Male et Femelle) *Buff. pl. 727*
et 728. — *Vaill. Touc. pl. 17 et 18.* —
GREEN TOUCAN *Lath. Syn. v. 1. p.*
331. — *Edw. t. 329.*

GENUS MOMOTUS.

GENRE MOMOT.

MOMOTUS BRASILIENSIS. *Lath. Ind. Orn. v.*
1. p. 140. — *Ramphastos Momota Gmel.*
(11) *Syst. 1. p. 357.* — LE HOUTOU, OU LE
MOMOT du Bresil *Buff. pl. 370.* — *Vaill.*
Hist. Nat. des Geais et Rolliers pl. 37. —
BRASILIAN MOTMOT *Lath. Syn. v. 1. p.*
338. N^o. 10.

GE-

GENUS BUCEROS.

GENRE CALAO.

BUCEROS PANAYENSIS. *Gmel. Syst.* 1. p. 360.

— LE CALAO à BEC CIZELÉ de l'Isle
(358) Panaye *Buff. pl.* 780. — *Vaillant Hist.*
Natur. des Calaos pl. 16. — PANAYAN
HORNBILL *Lath. Syn.* v. 1. p. 353. N^o. 8.

BUCEROS PLICATUS. (Mas) *Lath. Ind.* v. 1. p.
146. N^o. 12. — LE GRAND CALAO à

(1025) CASQUE FESTONNÉ OU LE CALAO
ANNUAIRE de l'Isle de Waigiou (Male).

— *voy. d'Entercasteaux pl. Atlas.* —
WHREATED HORNBILL *Lath. Supp. to*
Syn. v. 2. p. 371.

BUCEROS PLICATUS. (Junior) (Mas) — LE

(420) GRAND CALAO à CASQUE FESTONNÉ,
OU LE CALAO ANNUAIRE de l'Isle de
Waigiou (dans son Jeun age) — Le Calao
Javan *Vaill. Hist. des Calaos pl.* 22.

————— LE CALAO CASQUE
FESTONNÉ à NUQUE ROUSSE des Ce-
(475) lèbes (Femelle) *Vaill. Hist. Nat. Calaos*
pl. 21.

————— GRAND CALAO à CAS-
QUE EN CROISSANT des Moluques *Vaill.*
(457) *Hist. Nat. des Calaos pl.* 13. — *Sonnini*
v. 20. p. 140.

————— GRAND CALAO à CAS-
QUE CONCAVE des Iles de l'Archipel In-

- (474) dien *Vaill. Calaos pl. 3.* — *Sonnini v. 20.*
p. 136.
- BUCEROS GINGINIANUS. *Lath. Ind. Orn. v.*
1. p. 146. — LE CALAO à CASQUE
- (413) POINTU de Gingi *Sonnerat. voy. Ind.*
T. 121. — *Vaill. Hist. Nat. des Calaos*
pl. 15 — GINGI HORNBILL *Lath.*
Syn. Supp. v. 1. p. 71.
- BUCEROS NOVAE HOLLANDIAE. *Mihi* —
Scythrops novae Hollandiae Lath. Ind. Orn.
- (352) v. 1. p. 141. — LE CALAO BIS-ER-
GOT, OU LE GOREGAN du Port Jackson
Vaill. suite des Calaos avec pl. Entu. —
NEW-HOLLAND CANNEL-BILL *Lath.*
Supp. Syn. v. 2. p. 96. pl. 124.
- BUCEROS CORNICULATUS. *Mihi* — *Merops*
Corniculatus Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 276.
- (511) — LE CORBI-CALAO des Iles de l'Océ-
an pacifique *Vaill. Hist. Nat. Calaos pl.*
24. — Knob fronted Bee-eater *Lath.*
Supp. to Syn. v. 2. p. 151.
-
- LE CALAO GIN-
GALA de Ceylan (Mâle) *Vaill. Hist. Nat.*
- (523) *Calaos. pl. 23.*
-
- LE CALAO COU-
RONNÉ d'Afrique pays des Caffres (Femelle)
- (98) *Vaill. Ois. d'Af. pl. Enl.*
-
- LE CALAO LON-
GIBANDES d'Afrique Côte d'Angôle *Vaill.*
- (778) *Ois. d'Af. pl. Enl.*

BU-

- BUCEROS ABYSSINICUS. *Lath. Inl. Ornith v.*
1. p. 143. — Gmel. Syst. 1. p. 358.
 (1031) LE CALAO D'ABYSSINIE *Buff. pl. 779.*
 — ABBA GUMBA *Bruce's Travels v. 5.*
p. 169. avec pl. — Abyssinian Hornbill Lath.
Syn. v. 1. p. 347.

GENUS CROTOPHAGA. GENRE ANI,

- CROTOPHAGA MAJOR. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
336. — L'ANI DES PALETUVIERS
 (97) (Male) de l'Amérique Meridionale *Buff. pl.*
102. f. 1. — GREATER ANI Lath. Syn.
v. 1. p. 362. N^o. 2.

GENUS CORVUS. GENRE CORBEAU.

- CORVUS CORAX. *Gmel. Syst. 1. p. 364. —*
 LE CORBEAU d'Europe *Buff. pl. 495.*
 (619) — RAVEN *Lath. Syn. v. 1. p. 367. —*
Frisch pl. 63.
 CORVUS CORONE. *Gmel. Syst. 1. p. 365. N^o.*
3. — LA CORNEILLE d'Europe Buff.
 (697) *pl. 483. — CARRION CROW Lath.*
Syn. v. 1. p. 370. N^o. 3.
 CORVUS CORNIX *Gmel. Syst. 1. p. 366. —*
 LA CORNEILLE MANTELÉE d'Europe
 (93) *Buff. pl. 76. — HOODED CROW Lath.*
Syn. v. 1. p. 374. N^o. 5. — Frisch's
T. 65.

- CORVUS DAURICUS. *Gmel. Syst. 1. p. 367. N^o.*

22. — LA CORNEILLE à SCAPULAIRE BLANC d'Afrique *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 53.* — La Corneille du Senegal *Buff. pl. 327.* — WHITE BREASTED CROW *Lath. Syn. v. 1. p. 376. N^o. 6.*
- (7) CORVUS GRACULUS. *Gmel. Syst. 1. p. 377. N^o. 18.* — LE CRAVE, OU LE CORACIAS des Alpes *Buff. pl. 255.* — RED LEGGED CROW *Lath. Syn. v. 1. p. 401. N^o. 39.*
- CORVUS ALBICOLLIS. *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 151. N^o. 3.* — LE CORBEAU à NUQUE BLANCHE, OU LE CORBIVEAU d'Afrique *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 50.* — SOUTH-SEA RAVEN *Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 107. N^o. 2.*
- (6) CORVUS HOTTENTOTTUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 364. N^o. 1.* — LE SIX-CRAINS d'Afrique (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 82.* — Choucas à Moustaches *Buff. pl. 226.* — HOTTENTOT CROW *Lath. Syn. v. 1. p. 380.*
- (345) CORVUS FRUGILEGUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 366.* — LE FREUX, OU LA FRAYONNE d'Europe (Male) *Buff. pl. 484.* — ROOK — *Lath. Syn. v. 1. p. 372.* — *Frisch T. 64.*
- (894) CORVUS PYRRHOCORAX. *Lath. Ind. v. 1. p. 165.* — *Gmel. Syst. 1. p. 376.* — LE CHOUCAS DES ALPES, OU LE CHOCARD *Buff.*
- (739)

- Buff. pl.* 531. — ALPINE CROW *Lath. Syn. v. 1. p.* 183.
- CORVUS MONEDULA. *Lath. Ind. v. 1.* 154. —
Gmel. Syst. 1. p. 367. — LE CHOUCAS
 (1035) (Male) d'Europe *Buff. pl.* 523. — THE
 JACKDAW *Lath. Syn. v. 1. p.* 378.

DIVISION PIE.

- CORVUS PICA. *Gmel. Syst. 1. p.* 373. — LA
 PIE d'Europe *Buff. pl.* 488. — THE MAG-
 (698) PIE *Lath. Syn. v. 1. p.* 392. N^o. 29. —
Frisch T. 58.
- CORVUS MEXICANUS *Gmel. Syst. 1. p.* 375. N^o.
 42. — LA GRANDE PIE, OU L'HOCI-
 (397) SANA du Mexique *Buff. p.* 143. *Edition*
folio. — MEXICAN CROW *Lath. Syn. v.*
1. p. 395. N^o. 34.
- CORVUS RUFUS. *Lath. Ind. Orn. v. 1. p.* 161.
 N^o. 28. — LA PIE ROUSSE du Benga-
 (556) le *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl.* 59. — RU-
 FOUS CROW *Lath. Syn. Supp. v. 2. p.*
 112. N^o. 11.
- CORVUS VARIANS. *Lath. Supp. to Ind. Orn. v.*
 2. p. XXVI. — LA TEMIA, OU PIE
 (317) VERT CHANGEANT de Ceylan *Vaill.*
Ois. d'Af. v. 2. pl. 56. — CHANGEA-
 BLE CROW *Lath. Syn. Supp. v. 2. p.* 119.
 N^o. 26.
- CORVUS COLLURIO. *Daudin. Orn. v. 2. p.* 246.

- *Lanius Picatus* *Lath. Supp. Syn.* —
 LA PIE-PIEGRIÈCHE de Caijenne *Vaill.*
 (789) *Oif. d'Af. v. 2. p. 60.* — Magpie Shrike
Lath. Syn. v. 1. p. 192.

- CORVUS ERYTHORHYNCHOS.* *Gmel. Syst. I p.*
 372. N^o. 34. Le Geay de la Chine à bec
 (394) rouge *Buff. pl. 622.* — LA PIE BLEU
 à LONGUE QUEUE de la Chine *Vaill. Oif.*
d'Af. v. 2. pl. 57. — RED BILLED
 CROW *Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 112.*
 N^o. 12.

-
- PETITE PIE NAT-
 TÉE de la nouvelle Hollande (Male) —
 (784) Guepier natté *Buff. de Sonnini v. 18. p. 292.*

DIVISION GEAI.

- CORVUS CRISTATUS.* (Mas) *Gmel. Syst. I. p.*
 369. — LE GEAI BLEU DU CANADA
 (337) (Male) *Buff. pl. 529. Vaill. Geais pl. 45.* —
 BLUE JAY *Lath. Syn. v. 1. p. 386.*

-
- LE GEAI NOIR à CO-
 LIER BLANC, OU GEAI—LONGUE des
 (448) Iles de l'Océan Indien *Vaill. II. N. des Geais*
pl. 42.

- CORVUS CAYANUS.* *Gmel. Syst. I. p. 370.* —
 LE BLANCHE-COIFFE, OU LE GEAI
 (368) DE CAIJENNE *Buff. pl. 373.* — CA-
 IJENNE JAY *Lath. Syn. v. 1. p. 388.*
 N^o. 22.

COR-

- CORVUS LIENTERICUS. *Mihi* — Ampelis
 Garrulus *Gmel. Syst. i. p. 838.* — LE
 (594) GEAY GOULU d'Europe. — Le Jafeur
 de Bohême *Buff. pl. 261.* — Le grand
 Jafeur *Vaill. Geais pl. 48.* — Bohemian
 Chatrer *Lath. Syn. v. 3. p. 91.*
- CORVUS CARYOCATACTUS. *Gmel. Syst. i. p.*
 370. — LE CASSE NOIX d'Europe
 (595) (Male) *Buff. pl. 50.* — *Vaill. H. N. Ge-*
ais pl. 55. — THE NUTCRACKER *Lath.*
Syn. v. i. p. 400. — *Frisch T. 56.*
- CORVUS GLANDARIUS. *Gmel. Syst. i. p. 368.*
 N^o. 7. — LE GEAY d'Europe *Buff. pl.*
 (699) 481. — *Vaill. Geais pl. 40.* — THE
 JAY *Lath. Syn. v. i. p. 384.* — *Frisch*
T. 55.
- CORVUS STELLERI. *Gmel. Syst. i. p. 370.* —
 LE GEAI BLEU VERDIN de la Baye de
 (178) Nootka *Vaill. H. N. Geais pl. 44.* —
 STELLERS CROW *Lath. Syn. v. i. p.*
 387. N^o. 21.
- CORVUS AUREUS. *Mihi.* — *Pipra Rupicola*
Gmel. Syst. p. 998. — LE COQ DE RO-
 (33) CHE de la Guyane *Buff. pl. 39.* — *Vaill.*
Geais pl. 51. — Roch-Manakin *Lath.*
Syn. v. 4. p. 518.

GE-

GÉNUS CORACIAS.

GENRE ROLLIER.

CORACIAS SENEGALENSIS. *Gmel. Syst. I. p.*
 379. N^o. 8. — LE ROLLIER à LONG-
 (449) BRINS d'Afrique *Vaill. H. N. des Rolliers*
pl. 25. — Le Rollier du Sénégal *Buff. pl.*
 326. — SENEGAL ROLLER *Lath. Syn.*
v. I. p. 408. — *Edwards t. 327.*

CORACIAS BENGALENSIS. *Gmel. Syst. I. p.*
 380. — LE ROLLIER VARIÉ, OU
 (341) LE CUIT d'Afrique *Vaill. Rolliers pl. 28.* —
 Rollier de Mindanao *Buff. pl. 285.* —
 BENGAL ROLLER *Lath. Syn. v. I. p.*
 410. N^o. 5.

CORACIAS MADAGASCARIENSIS. *Gmel. Syst.*
I. p. 379. N^o. 9. — LE GRAND ROL-
 (55) LE VIOLET de Madagascar *Vaill. H. N.*
Rolliers pl. 34. — *Buff. pl. 501.* —
 MADAGASCAR ROLLER *Lath. Syn. v.*
I. p. 413. N^o. II.

CORACIAS ORIENTALIS. *Gmel. Syst. I. p. 379.*
 N^o. 4. — LE ROLLE à GORGE BLEU
 (564) des Indes Orientales *Vaill. Rolliers pl. 36.* —
Buff. pl. 619. — ORIENTAL ROL-
 LER *Lath. Syn. v. I. p. 411. N^o. 6.*

CORACIAS MELANOPS. *Mihi.* — ROLLIER à
 MAS-

- MASQUE NOIR, OU LE KAIALORA de
 (49) la nouvelle Hollande *Vaill. rolliers pl.* 30. —
 BLACK-FACED CROW *Lath. Supp. 10*
Syn. v. 2. p. 116. N^o. 19.
- CORACIAS GARRULA *Gmel. Syst. 1. p. 378.* —
 LE ROLLIER d'Europe *Buff. pl.* 486. —
- (854) *Vaill. rolliers pl.* 32. — THE ROLLER
Lath. Syn. v. 1. p. 406. — *Frisch T.* 57.
 ————— LE ROLLIER à CA-
 LOTTE AIGUEMARIN d'Otaheite (Male)
 (957*) — *non décrit.*
- CORACIAS VIOLACEA. (Mas et Femina) *Mihi.*
 — LE PETIT ROLLE VIOLET A
 (718) GORGE BLEUE du Sénégal (Male et Fe-
 melle) *Vaill. rolliers pl.* 35. (la Femelle) —
pl. 35. (le Male)

GENUS ORIOLUS.

GENRE LORIOT.

- ORIOLOUS MELANOCEPHALUS. *Gmel. Syst. 1.*
p. 383. — LE LORIOT à CAMAIL
 (140) NOIR de la Chine (Male) *Buff. pl.* 79. —
 BLACK-HEADED INDIAN ICTERUS
Edw. t. 77. — *Lath. Syn. v. 2. p. 451.*
Var. A.
- ORIOLOUS GALBULA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 382. — LE LORIOT d'Eu-
 (704) rope (Male et Femelle) *Buff. pl.* 26. —
Frisch T. 31. — GOLDEN ORIOLE *Lath.*
Syn. v. 2. p. 244.

LE LORIOT GRIVELÉ
(475*) de Java. — *non décrit.*

LE LORIOT BICOLOR,
OU LORIOT D'OR du Senegal (Male) —
(569*) *non décrit.*

LE LORIOT à MASQUE
NOIR d'Afrique (Male et Femelle) — *non*
(141*) *descrit.*

GENUS ICTERUS.

GENRE TROUPIALE.

ICTERUS VULGARIS. *Daudin. Orn. v. 2. p.*
340. — Oriolus Icterus *Lath. Ind. v. 1.*
(154) *p. 176.* — LE TROUPIALE NOIR ET
JAUNE d'Amerique *Buff. pl. 532.* —
ICTERIC ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p.*
424.

ICTERUS PERSICUS. *Mihi.* — Oriolus Persicus
Lath. Ind. v. 173. — LE CASSIQUE à
(155) DOS JAUNE, OU L'YAPOU du Bresil (Ma-
le) *Buff. pl. 184.* — BLACK AND YEL-
LOW ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p. 418.*

ICTERUS HÆMORRHOUS (Mas et Femina) *Mi-*
hi — Oriolus Hæmorrhous *Lath. Ind. v. 1.*
(383) *p. 174.* — CASSIQUE à DOS ROUGE,
OU LE JAPABA du Bresil (Male et Fe-
melle) *Buff. pl. 482.* — RED RUMPED
ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p. 420.*

ICTERUS CRISTATUS. (Mas et Femina) *Mihi* —
Oriolus Cristatus *Lath. Ind. v. 1. p. 174.* —

- (151) GRAND CASSIQUE HUPPÉ *Buff. pl.* 344. (le Male) — GRAND CASSIQUE VERT *Buff. pl.* 328. (la Femelle) — CRESTED ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p.* 421. N^o. 3. *et var. B.*
- ICTERUS PHŒNICEUS. (Mas et Femina) *Mihi* — Oriolus Phœniceus *Lath. Ind. v. 1. p.* 178. —
- (158) LE TROUPIAL COMMANDEUR de Virginie (Male et Femelle) *Buff. pl.* 402. (le Male) — RED-WINGED ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p.* 428.
- ICTERUS BALTIMORE. *Mihi* — Oriolus Baltimore *Lath. Ind. v. 1. p.* 180. —
- (429) BALTIMORE, OU LE TROUPIAL AURÔRE DU CANADA *Buff. pl.* 506. f. 1. — BALTIMORE ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p.* 432.
- ICTERUS SPURIUS. *Mihi* — Oriolus Spurius *Lath. Ind. v. 1. p.* 180. — LE BALTIMÔRE
- (804) BÂTARD du Canada *Buff. pl.* 506. f. 2. — *Lath. Syn. v. 2. p.* 433.
- ICTERUS XANTHORUS. *Mihi* — Oriolus Xanthorus *Lath. Ind. v. 1. p.* 181. — LE CAR
- (159) ROUGE, OU PETIT CUL-JAUNE du Mexique (Male) *Buff. pl.* 5. f. 1. — LESER BONANA ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p.* 438.
- ICTERUS AMERICANUS. (Mas et Femina) *Mihi* — Oriolus Americanus *Lath. Ind. v.*
- (148) 1. *p.* 178. — LE TROUPIALE à POITRI
- TRI.

TRINE ROUGE de Caijenne (Male et Femelle) *Buff. pl.* 236. — RED BREASTED ORIOLE *Lath. Syn. v. 1. p.* 430.

ICTERUS ICTEROCEPHALUS. (Mas et Femina) *Mihi* — Oriolus Icterocephalus *Lath.*

(149) *Ind. v. 1. p.* 183. — LE CARROUGE à COIFFE-JAUNE de Caijenne (Male et Femelle) — *Buff. pl.* 343. (le Male) — YELLOW HEADED STARLING *Edw. t.* 323. — *Lath. Syn. v. 2. p.* 441.

ICTERUS MINOR. (Mas) *Mihi* — Oriolus Minor *Lath. Ind. v. 1. p.* 185. — LE PE-

(505) TIT TROUPIAL NOIR du Brèfil (Male) *Buff. pl.* 606 f. 1. — LESSER BLACK ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p.* 446.

ICTERUS OLIVACEUS. *Mihi* — Oriolus Olivaceus *Lath. Ind. v. 1. p.* 186. — LE

(150) TROUPIAL OLIVE de Caijenne *Buff. pl.* 606. f. 2 — CAIJEENNE OLIVE ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p.* 447.

ICTERUS NIGER. *Mihi* — Oriolus Niger *Lath. Ind. v. 1. p.* 185. — LE TROUPIAL

(415) NOIR de St. Domingue *Buff. pl.* 534. — BLACK ORIOLE *Lath. Syn. v. 1. p.* 445.

ICTERUS DOMINICENSIS. (Mas) *Mihi* — Oriolus Dominicanensis *Lath. Ind. v. 1. p.*

(613) 182. — CARROUGE à CAPE JAUNE de St. Domingue (Male) — *Buff. pl.* 5. f. 2. (la Femelle) — ST. DOMINGO ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p.* 439.

Ic-

ICTERUS MEXICANUS. (Mas et Femina) *Mihi* —
Oriolus Mexicanus *Lath. Ind. v. 1. p. 179.*

(807) — LE TROUPIAL JAUNE à CALOTTE
NOIRE de Caienne (Male et Femelle) *Buff.*
pl. 533. — BLACK CROWNED ORIOLE
Lath. Syn. v. 2. p. 431.

LE CASSIQUE CUIVRÉ
de la Louisiane (Male et Femelle) — *non*
(423*) *decrit.*

ICTERUS CASTANEUS. *Mihi* — Oriolus Cas-
taneus *Lath. Ind. v. 1. p. 181.* — LE
(758) CARROUGE VARIÉ de Caienne *Buff. pl.*
607. *f. 1.* — CHESNUT AND BLACK
ORIOLE *Lath. Syn. v. 2. p. 437.*

ICTERUS TEXTOR. (Mas et Femina) *Mihi* —
Oriolus Textor *Lath. Ind. v. 1. p. 180.* —
(806) LE TROUPIAL CAP-MÔRE du Sénégal
(Male et Femelle) *Buff. pl. 375 et 376.* —
WEEVER ORIOLE *Lath. Syn. v. 1. p. 435.*

LE TROUPIAL à MASQUE-
NOIR d'Afrique pays des Namaquois (Male
(152*) et Femelle) — *non decrit.*

LE CARROUGE à GORGE
ROUSSE de l'Amerique Meridionale (Male)
(157*) — *non decrit.*

LE CASSIQUE VIOLET à
FRAISE de l'Amerique Septentrionale. (Male)
(612*) — *non decrit.*

GENUS GRACULA. GENRE GRACULE.
DIVISION MAINATTE.

GRACULA RELIGIOSA. *Gmel. Syst. 1. p. 395.*

—— LE GRAND MAINATTE des Indes
(355) Orientales (Male) *Buff. pl. 268.* — GREATER MINOR *Lath. Syn. v. 2. p. 457.* —
Edwards. t. 17.

—— LE PETIT MAINATTE
VERD à CAPUCHON NOIR de la nouvel-
(320*) le Hollande — *Espèce nouvelle non decrite.*

—— LE MAINATTE VERD
à VENTRE TACHETÉ de la nouvelle Hol-
(600*) lande (Male et Femelle) — *Espèce nouvelle non decrite.*

DIVISION MARTIN.

GRACULA CARUNCULATA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 399.* — LE PORTE-LAMBEAUX

(459) d'Afrique pays des Caffres (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 93.* — COCKSCOMB STARE *Lath. Syn. v. 3. p. 9.*

GRACULA PAGODARUM. (Mas) *Mithi* — Tur-
dus Pagodarum. *Gmel. Syst. 1. p. 816. N°.*

(388) 52. — LE MARTIN-BRÂME des Indes
Orientales (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 95. f. 1.* — Pagoda Thrush *Lath. Syn. v. 2. p. 30.*

GRA-

GRACULA TRISTIS *Gmel. Syst. 1. p. 401.* —

LE MARTIN TRISTE des Philippines *Buff.*

(127) *pl. 219.* — PARADISE GRAKLE *Lath.*

Syn. v. 2. p. 458.

LE MARTIN à JOUES
ROUGES du Bengale. — *Espèce nouvelle*
(588*) *non decrite.*

GRACULA CRISTATELLA. *Gmel. Syst. 1. p.*

397. — LE MARTIN HUPPÉ de la Chi-

(790) ne — Merle Huppe de la Chine *Buff. pl.*

507. — CRESTED GRAKLE *Lath. Syn.*

v. 2. p. 464.

GRACULA GRISEA. *Daudin Ornith. v. 2. p. 286.*

— LE MARTIN GRIS-DE-FER d'Afri-

(610) que (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 95.*

f. 2. — *Sonnini. v. 10. p. 343.*

GRACULA LEUCOCEPHALA. (Mas) *Mihi* —

Turdus Leucocephalus Gmel. Syst. 1. p. 829.

(131) — LE MARTIN DOMINQUAIN de

la Chine (Male) — Merle Dominiquain.

Sonnerat voy. Ind. v. 2. p. 191. — White

headed thrush *Lath. Syn. v. 3. p. 59.*

GRACULA CYANOTIS (Mas) *Lath. Ind. Orn.*

Supp. v. 2. p. XXIX. — LE MARTIN

(962) OLIVE à JOUES BLEUES (Male) de la

nouvelle Hollande. — BLUE-EARED

GRAKLE *Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 130.*

GENUS PARADISEA. GENRE OISEAU DE PA-
RADIS.

PARADISEA APODA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
399. — L'OISEAU DE PARADIS GRAND
(106) EMERAUDE (Male) *Buff. pl. 254.* —
Vaillant Oif. paradis pl. 1. — *Audebert*
Oif. dorés pl. 1. — GREATER BIRD
OF PARADISE *Lath. Syn. v. 2. p. 471.*

PARADISEA REGIA (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 400. — LE MANUCÔDE, OU
(107) ROI DES OISEAUX DE PARADIS des îles
Arou (Male et Femelle) *Buff. pl. 496.* —
Vaill. Oif. para. pl. 7. — *Aud. pl. 5.* —
KING OF PARADISE BIRD *Lath. Syn.*
v. 2. p. 475.

PARADISEA MAGNIFICA. *Gmel. Syst. 1. p. 401.*
— LE MANUCÔDE à BOUQUETS de
(109) la nouvelle Guinée (Male) *Buff. pl. 631.* —
Vaill. Oif. para. pl. 9. — *Audeb. pl. 4.* —
MAGNIFICENT PARADISE BIRD *Lath.*
Syn. v. 2. p. 477.

PARADISEA ORIOLUS. (Mas) *Mihi.* — *Oriolus*
Aureus Gmel. Syst. 1. p. 483. — LE
(108) PARADIS ORANGE, OU LORIOT DE
PARADIS (Male) des grandes Indes —
Vaill. Oif. para. pl. 18. — *Aud. pl. 11.* —
GOLDEN BIRD OF PARADISE *Lath.*
Syn. v. 2. p. 483.

PA-

- PARADISEA GULARIS. (Mas et Femina) }
Lath. Ind. v. 1. p. 195. } —
 PARADISEA NIGRA. (Mas et Femina) *Gmel.* }
Syst. 1. p. 401. N^o. 5. }
- (348) L'OISEAU DE PARADIS L'INCOMPARABLE des grandes Indes (Male et Femelle)
Vaill. Oif. par. pl. 20 et 21. (le Male) pl. 22. (la Femelle) — Audeb. pl. 14 et 15. (Male) — GORGET BIRD OF PARADISE
Lath. Syn. v. 2. p. 478.
- PARADISEA SEXETACEA. *Lath. Ind. v. 1. p. 196.* }
 PARADISEA AUREA. *Gmel. Syst. 1. p. 402. N^o. 7.* } LE
- (438) MANUCÔDE à SIX FILETS de la nouvelle Guinée (Male) *Buff. pl. 633. — Vaill. Oif. para. pl. 12 et 13. — Audeb. pl. 6. — GOLD-BREASTED BIRD OF PARADISE*
Lath. Syn. v. 2. p. 481.

DIVISION CALYBÉ.

- PARADISEA CHALYBEA. *Lath. Ind. Ornith. v. 1. p. 197. — Paradisea Viridis Gmel. Syst. 1. p. 402. — LE CALYBÉ VERD de la nouvelle Guinée*
 (639) *Buff. pl. 634. — Vaill. Oif. de para. pl. 23. — Sonnerat Voy. p. 164. t. 99. — Audeb. pl. 10. — BLUE-GREEN PARADISE BIRD*
Lath. Syn. v. 2. p. 482.
- PARADISEA TIBICEN. (Mas) *Mihi — Coracias Tibicen*
Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p.

- (855) XXVII. — LE CALYBÉ TARRAWAR-
NANG (Male) de la nouvelle Hollande —
Piping Roller *Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 122.*

GENUS TROGON, GENRE COUROUCOU,

- TROGON CURUCUI. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 405. — LE COUROUCOU à VEN-
(392) TRE ROUGE (Male et Femelle) de Caijenne
Buff. pl. 452. — RED-BELLIED CU-
RUCUI *Lath. Syn. v. 2. p. 485.*

- TROGON CURUCUI. *Junior* (Mas) — LE
COUROUCOU à VENTRE ROUGE *Jeuni-*
(393) *age* (Male)

- TROGON VIRIDIS. (Mas) *Gmel. Syst.* I. p. 404.
— LE COUROUCOU à VENTRE JAU-
(30) NE (Male) de Caijenne *Buff. pl. 195.* —
YELLOW-BELLIED CURUCUI *Lath.*
Syn. v. 2. p. 488. N^o. 2.

- TROGON VIOLACEUS. *Gmel. Syst.* I. p. 404.
— COUROUCOU à VENTRE BLANC
(31) ET CHAPERON VIOLET de Caijenne *Buff.*
pag. 380. v. 6. Edit. folio. — VIOLET-
HEADED CURUCUI *Lath. Syn. v. 2.*

-
- GRAND COUROUCOU
(436*) à VENTRE BLANC de Suriname (Male)
— non décrit.

-
- PETIT COUROUCOU
à VENTRE ROUGE de la Guijane (Male)
(755*) — non décrit.

— LE

———— LE COUROUCOU NA-
 RINA , OU COUROUCOU à VENTRE
 (29*) ROSE d'Afrique (Male et Femelle) ———
non décrit. Espèce nouvelle.

GENUS BUCCO.

GENRE BARBU.

BUCCO TAMATIA. *Gmel. Syst. 1. p. 405.* —
 LE TAMATIA à GORGE ROUSSE de la
 (803) Guiane *Buff. pl. 746. fig. 1.* — *Vaill. H.*
N. des Barb. pl. 41. — SPOTTED-
 BELLIED BARBET *Lath. Syn. v. 2. p.*
 494.

BUCCO COLLARIS. *Lath. Ind. Orn. v. 1. p.*
 202. — *Bucco Capensis Gmel. Syst. 1. p.*
 (381) 406. — LE TAMATIA à COLLIER
 NOIR de Caienne *Buff. pl. 395.* — *Vaill.*
Barbus pl. 42. — COLLARED BARBET
Lath. Syn. v. 2. p. 497.

BUCCO MACRORHYNCHOS. *Gmel. Syst. 1. p.*
 406. N^o. 5. — LE TAMATIA NOIR
 (541) ET BLANC, OU LE PLASTRON NOIR
 de Caienne *Buff. pl. 689.* — *Vaill. Barb.*
pl. 39. — GREATER PIED BARBET
Lath. Syn. v. 2. p. 498.

BUCCO MELANOLEUCOS. *Gmel. Syst. 1. p.*
 406. — Le Barbu à Poitrine noire de
 (761) Caienne *Buff. pl. 688. fig. 2.* — PETIT
 TAMATIA à PLASTRON NOIR *Vaill.*
Barbus pl. 40.

- BUCCO DUBIUS. *Gmel. Syst. 1. p. 409.* —
 LE BARBICAN d'Afrique (Male) *Buff. pl.*
 (92) 602. — *Vaill. Barb. pl. 18.* — DOUBT-
 FULL BARBET *Lath. Syn. v. 2. p. 506.*
 ————— LE PETIT BARBICAN à
 VENTRE RÔSE d'Afrique côte d'Angôle
 (731) *Vaill. Barb. pl. A.*
 ————— LE PETIT BARBU, OU LE
 (89) BARBION d'Afrique pays des Caffres *Vaill.*
Barb. pl. 32.
 BUCCO VIRIDIS. *Gmel. Syst. 1. p. 408.* — LE
 BARBU VERD, OU BARBU KOTTOREA
 (90) des Indes (Male) *Buff. pl. 870.* — *Vaill.*
Barb. pl. 38. — GREEN BARBET
Lath. Syn. v. 2. p. 504. N^o. II.
 ————— LE BARBU RÔSE-GORGE
 (467) de Java (Male) *Vaill. Barb. pl. 33.*
 BUCCO NIGER. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1.*
p. 407. — LE BARBU à GORGE NOI-
 (88) RE du Cap de Bonne Esperance (Male et
 Femelle) *Buff. pl. 688. f. 1.* — *Vaill. Barb.*
pl. 29 et 30.
 ————— LE BARBU TACHETÉ de la
 Guiane (Male et Femelle) *Vaill. Barb. pl.*
 (187) 23 et 24.
 ————— LE BARBU TACHETÉ Variété
 (602) (Male) *Vaill. pl. 25.*
 ————— LE BARBU BARBICHON des
 Indes Orientales (Male) — *Vaillant Bar-*
 (590) *lus pl. 56.*

GE-

GENUS CUCULUS.

GENRE COUCOU.

CUCULUS INDICATOR. *Gmel. Syst. 1. p. 418.*

—— LE COUCOU INDICATEUR d'A-
(91) frique pays Anteniquoi *Buff. v. 6. p. 458.*
Ed. folio. —— HONEY CUCKOW *Lath.*
Syn. v. 2. p. 533.

CUCULUS VETULA. *Gmel. Syst. 1. p. 410. N^o.*
4. — LE COUCOU à LONG-BEC, OU
(643) LE TACCO de la Jamaïque *Buff. pl. 772.* —
LONG-BILLED RAIN CUCKOW *Lath.*
Syn. v. 2. p. 535.

—— LE COUCOU GRIS BRON-
(781*) ZÉ d'Afrique côte d'Angôle —— *Vaill.*
Ois. d'Af. v. 5. pl. 215.

CUCULUS CANORUS. *Gmel. Syst. 1. p. 409.* —
LE COUCOU d'Europe *Buff. pl. 811.* ——
(24) COMMON CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p.*
509. —— *Frisch pl. 40 et 41.*

CUCULUS CAIJANUS *Gmel. Syst. 1. p. 417. N^o.*
14. —— LE COUCOU ROUX, OU LE
(22) PIAYE de Caijenne *Buff. pl. 211.* ——
CAIJENNE CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p.*
542.

CUCULUS NAEVIUS. *Gmel. Syst. 1. p. 413.* —
LE COUCOU BRUN VARIÉ DE ROUX
(343) de Caijenne *Buff. pl. 812.* —— SPOTTED
CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p. 539.*

CUCULUS PERSA. *Gmel. Syst. 1. p. 419. N^o. 17.*
—— LE TOURACO de la côte de Guiné

- (32) (Male) *Buff. pl.* 601. — THE TOURACO *Edw. T.* 7. — *Lath. Syn. v. 2. p.* 545. N^o. 46.

LE COUCOU ROUX à BEC ROUGE des Indes, Isle de Java — *non* (380*) *décrit.*

- CUCULUS ÆGIPTICUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.* 420. N^o. 43. — GRAND COUCOU à (409) AILES BRUNES, OU LE HOUHOU des grandes Indes (Male) *Buff. pl.* 824. — EGIPTIAN CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p.* 523. N^o. 164.

- CUCULUS AMERICANUS. *Gmel. Syst. 1. p.* 414. LE COUCOU VIEILLARD à AILES (1014) ROUSSES de la Caroline *Buff. pl.* 816. — CAROLINA CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p.* 527.

- CUCULUS MACULATUS. *Gmel. Syst. 1. p.* 415. — LE COUCOU TACHETÉ de (28) la Chine *Buff. pl.* 764. — CHINESE SPOTTED CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p.* 516.

-
- LE COUCOU GRIS, OU VULGAIRE du Cap de Bonne Espérance (26) dans le Camdebo *Vaill. Ois. d'Af. v. 5. pl.* 200.

- CUCULUS CÆRULEUS *Gmel. Syst. 1. p.* 418. — LE COUCOU BLEU, OU LE TAIT-SOU (371) de Madagascar *Buff. pl.* 295. f. 2. — BLUE CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p.* 531. CU-

CUCULUS AURATUS. *Gmel. Syst. I. p. 421.* —

- (425) LE COUCOU VERD DORÉ, OU LE DIDRIC d'Afrique pays des Caffres *Buff. pl. 657.* — GILDED CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p. 527. N^o. 23.* — *Vaill. Ois. d'Af. v. 5. pl. 210.*

TRÈS PETIT COUCOU DORÉ de Java (Male) — *non décrit* (483*) *èce nouvelle.*

CUCULUS CLAMOSUS. *Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p. XXX. N^o. 2.* — LE COUCOU

- (25) CRIARD du Cap de Bonne Espérance *Vaill. Ois. d'Af. pl. 204.* — NOISY CUCKOW *Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 136.*

CUCULUS TRANQUILUS. *Gmel. Syst. I. p. 417. N^o. 38.* — COUCOU NOIR à BEC

- (417) ROUGE, OU LE BARBACOU de Caijenne *Buff. pl. 512.* — *Vaill. Barbus pl. 44.* — CAIJEENNE BLACK CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p. 543.*

CUCULUS TENEBROSUS. *Gmel. Syst. I. p. 417.*

- PETIT COUCOU NOIR, OU LE BARBACOU ECAUDÉ de Caijenne *Buff. pl. 505.* — *Vaill. Barbus pl. 45.* — WHITE RUMPED BLACK CUCKOW *Lath. Syn. v. 2. p. 544. N^o. 43.*

LE COUCAL-GEANT, OU COUCOU RAYÉ DE BLANC de la nouvelle Zelande (Male) — *non décrit.* (562*)

LE MALKOHA ROUVER

(469*) VERDIN (Male) de Ceylan — *non décrit.*

————— LE PETIT COUCOU
à QUEUE FRANGÉ de la nouvelle Hollan-
(895*) de. — *Espèce nouvelle non décrite.*

CUCULUS PYRRHOCEPHALUS. *Gmel. Syst. 1. p.*
417. — LE COUCOU MALKOHA de
(468) Ceylan *Sonnini Edit. de Buff. v. 18. p.*
87. — RED HEADED CUCKOW *Lath.*
Syn. v. 2. p. 544.

CUCULUS SENICULUS. *Lath. Ind. Syn. v. 1. p. 219.* }
CUCULUS MINOR. *Gmel. Syst. 1. p. 411.* } LE

(722) COUCOU DES PALETUVIERS, OU LE
PETIT VIEILLARD de la Guiane. —
Buff. pl. 813. — MANGROVE CUCKOW
Lath. Syn. v. 2. p. 537.

————— LE PETIT COUCOU ECLA-
TANT, OU LE COUCOU DE KLAAS
(1050) d'Afrique — *Vaill. Ois. d'Af. v. 5. pl. 212.*

CUCULUS EDOLIO. (Mas et Femina) *Mihi* — Cu-
culus Melanoleucos *Gmel. Syst. 1. p. 416.* —
LE COUCOU EDOLIO d'Afrique (Male et Fe-
(23) melle *Vaill. Ois. d'Af. v. 5. pl. 207 et 208.*
— Le Coucou Jacobin *Buff. pl. 872.* —
(la Femelle) — Le Coucou à plaque dente-
lée aux ailes *Sonnini Edit. de Buff.* (le male)
— COROMANDEL CRESTED CUC-
KOW *Lath. v. 2. p. 520.*

GENUS YUNX.

GENRE TORCOL.

- YUNX TORQUILLA. (Mas et Femina) *Lath. Ind.*
v. 1. p. 223. — Gmel. p. 423. — LE
 (869) TORCOL (Male et Femelle) d'Europe *Buff.*
pl. 698. — Frisch T. 38. — WRYNECK
Lath. Syn. v. 2. p. 548.

GENUS SITTA.

GENRE TORCHEPOT.

- SITTA EUROPEÆA. (Mas et Femina) *Lath. Ind. v. 2.*
p. — Gmel. p. 440. — LA SITELLE,
 (897) OU LE TORCHEPOT d'Europe (Male et
 Femelle) *Buff. pl. 623. — Frisch T. 39. —*
 NUTHATCH *Lath. Syn. v. 2. p. 648.*

GENUS PICUS.

GENRE PIC.

- PICUS MARTIUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1.*
p. 424. — LE GRAND PIC NOIR D'EU-
 (652) ROPE (Male et Femelle) *Buff. pl. 596. —*
 GREAT BLACK WOODPECKER *Lath.*
Syn. v. 2. p. 552. — Frisch pl. 34.
- PICUS PRINCIPALIS. *Gmel. Syst. 1. p. 425. N^o.*
2. — GRAND PIC NOIR HUPPÉ à
 (587) BEC BLANC de la Caroline *Buff. pl. 690.*
 — WHITE BILLED-WOODPECKER
Lath. Syn. v. 2. p. 553.
- PICUS LINEATUS. *Gmel. Syst. 1. p. 425. N^o. 4.*
 L'OUANTOU, OU PIC NOIR HUPPÉ de
 Ca.

- (76) Caienne (Male) *Buff. pl.* 717. — LI-
NEATED WOODPECKER *Lath. Syn. v.*
2. p. 556. *N^o.* 4.
- PICUS RUBRICOLLIS (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 426. — GRAND RE PIC HUP-
(632) PÉ à TÊTE ET COU ROUGE de Caijen-
ne (Male et Femelle) *Buff. pl.* 612. —
RED-NECKED WOODPECKER *Lath. Syn.*
v. 2. p. 558. *N^o.* 5.
- PICUS HIRUNDINACEUS (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
426. N^o. 5. — LE PETIT PIC NOIR
(74) à VENTRE ROUGE de Caienne *Buff. pl.*
694 fig. 2. — LESSER BLACK WOOD-
PECKER *Lath. Syn. v. 2. p.* 559. *N^o.* 7.
- PICUS ERYTHROCEPHALUS. *Gmel. Syst. 1. p.*
429. N^o. 7. — LE PIC NOIR à DOMI-
(450) NO ROUGE de Virginie *Buff. pl.* 117. —
RED-HEADED WOODPECKER *Lath. Syn.*
v. 2. p. 561.
- PICUS MAJOR. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.* 436. —
LE PIC VARIÉ, OU L'EPECHE d'Europe
(629) *Buff. pl.* 169. — *Frisch pl.* 36. —
GREATED (SPOTTED WOODPECKER
Lath. Syn. v. 2. p. 564. *N^o.* 12.
- PICUS MINOR. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p.*
437. N^o. 19. — PETIT PIC VARIÉ,
(760) OU LE PETIT EPEICHE (Male et Fe-
melle) d'Europe *Buff. pl.* 598. — *Frisch pl.*
37. — LESTER SPOTTED WOOD-
PECKER *Lath. Syn. v. 2. p.* 566.

— LE

————— LE PIC BRUN RAYÉ DE NOIR
des îles de l'Océan Indien — *non décrit* Espèce
(480*) *nouvelle.*

————— LE PIC TACHETÉ À DOS ROUGE
de Java (Male) — *Espèce nouvelle non*
(481*) *décrite.*

PICUS VIRIDIS. *Gmel. Syst. I. p. 433. N^o. 12.*
— LE PIC VERD d'Europe (Male) *Buff.*
(759) *pl. 371.* — GREEN WOODPECKER
Lath. Syn. v. 2. p. 577. — *Frisch pl. 39.*

PICUS BENGALENSIS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 433. N^o. 13. — LE PIC VERD
(482) DORÉ (Male et Femelle) du Bengale *Buff. pl.*
695. — BENGAL WOODPECKER *Lath.*
Syn. v. 2. p. 580. — *Edw. pl. 182.*

PICUS SENEGALENSIS. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.*
430. — LE PETIT PIC VERD RAYÉ
(635) d'Afrique du Sénégal (Male) *Buff. pl. 345.*
fig. 2. — GOLD-BACKED WOODPECKER
Lath. Syn. v. 2. p. 586. N^o. 33.

PICUS CAPENSIS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I.*
p. 430. — PIC VERD À TÊTE GRISE
(79) du Cap de B. E. (Male et Femelle) *Buff. pl.*
786. fig. 2. — CAPE WOODPECKER
Lath. Syn. v. 2. p. 586. N^o. 34.

PICUS EXALBIDUS (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 428.*
N^o. 29. — LE PIC JAUNE HUPPÉ
(519) de Caienne *Buff. pl. 509.* — YELLOW
WOODPECKER *Lath. Syn. v. 2. p. 591.*

PICUS CINNAMOMEUS. *Gmel. Syst. I. p. 428. N^o.*

30. — PIC JAUNE TACHETÉ, OU LE
 (73) MORDORÉ de Caijenne *Buff. pl.* 524. —
 FERRUGINOUS WOODPECKER *Lath.*
Syn. v. 2. p. 592. *N^o.* 42.
- PICUS RUFUS. *Gmel. Syst. 1. p.* 432. *N^o* 38. —
 LE PIC ROUX RAYÉ de Caijenne (Male)
 (636) *Buff. pl.* 694. *fig.* 1. — RUFIOUS
 WOODPECKER *Lath. Syn. v. 2. p.* 594.
- PICUS MINUTISSIMUS. *Gmel. Syst. 1. p.* 423.
 — TRES PETIT PIC, OU LE PIC-
 (82) MIGNON de Caijenne *Buff. pl.* 786. *fig.* 1.
 MINUTE WOODPECKER *Lath. Syn. v. 2.*
p. 596. *N^o.* 48.
- PICUS AURATUS. (Femina) *Gmel. Syst. 1. p.* 430.
 — LE PIC à BAGUETTES D'OR, OU
 (75) AILES DORÉES de la Louisiane (Femelle)
Buff. pl. 693. — GOLD-WINGED
 WOODPECKER *Lath. Syn. v. 2. p.* 597.
- PICUS CAYANENSIS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.* 428.
 — LE PETIT PIC RAYÉ de Caijenne
 (633) (Male) *Buff. pl.* 613. — CAYENNE WOOD-
 PECKER *Lath. Syn. v. 2. p.* 590.
- PICUS MULTICOLOR. *Gmel. Syst. 1. p.* 429. —
 LE PIC BRUN à CRAVATE NOIRE de
 (630) Caijenne *Buff. pl.* 863. — BLACK BREAST-
 TED WOODPECKER *Lath. Syn. v. 2.*
p. 593. *N^o.* 43.
- PICUS NUBICUS. *Gmel. Syst. 1. p.* 439. —
 L'ÉPEICHE ONDÉE ET TACHETÉE d'A-
 (80) frique *Buff. pl.* 667. — NUBIAN WOOD-
 PECKER *Lath. Syn. v. 2. p.* 576. PI-

PICUS CHLOROCEPHALUS. *Gmel. Syst. I. p.*
 432. — PIC à GORGE JAUNE, OU LA
 (605) TÊTE D'OR du Bresil. *Buff. pl. 784.* —
 YELLOW HEADED WOODPECKER *Lath.*
Syn. v. 2. p. 595.

LE PIC à VEN-
 TRE ENSANGLANTÉ de la Trinité (Male)
 (724*) — *non décrit.*

LE PETIT PIC à
 FAGUETTES D'OR d'Afrique riviere Dui-
 venhoek — *non décrit.*

LE PIC à MOU-
 STACHES NOIRES d'Afrique pays des
 (1054*) Caffres — *non décrit.*

PICUS MEDIUS (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 436.* —
 LE PIC VARIÉ à TÊTE ROUGE, OU PIC
 (898) MAR de Loraine (Male) *Buff. pl. 611.* —
 MIDDLE SPOTTED WOODPECKER *Lath.*
Syn. v. 2. p. 565.

PICUS NORVEGICUS. *Lath. Ind. v. I. 236.* }
 PICUS CANUS. *Gmel. Syst. I. p. 434.* } LE

PIC VERD à TÊTE GRISE de l'Europe
 (947) Septentrionale *Edwards t. 65.* — GREY
 HEADED GREEN WOODPECKER *Lath.*
Syn. v. 2. p. 583.

PICUS OLIVACEUS. *Gmel. Syst. I. p. 431.* —
 LE PIC ROC d'Afrique pays des Caffres.
 (81) *Vaillant Second voyage en Afrique p. 144.*
 — Le Pic Marcheur *Sonnini v. 19. p. 273.*
 — CRIMSON-BREADED WOODPEC-
 KER *Lath. Syn. v. 2. p. 599.*

E

— LE

LE PIC BARBARESQUE ,
 (1*) OU GRAND PIC VERDATRE de Barbarie
 — non décrit.

LE PETIT PIC ROUGEA-
 (83*) TRE de Ceylan — non décrit.

DIVISION PIC-GRIMPEREAU.

PICUS SCANDENS. *Mihi.* — *Gracula Scandens Lath.*
Syn. v. 1. p. 193. — LE PIC GRIMPE-
 (955) REAU, OU PICUCULE de Caijenne *Buff.*
pl. 621. — Climbing Grakle *Lath. Syn. v.*
2. p. 467.

PICUS ORIOLUS. *Mihi* — *Oriolus Picus Lath. Ind.*
Orn. v. 1. p. 188. — LE TALAPIOT de
 (86) Caijenne *Buff. pl. 605* — Climbing Oriole
Lath. Syn. v. 2. p. 453.

GENUS GALBULA.

GENRE JACAMAR.

GALBULA PARADISEA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
458. — LE JACAMAR à LONGUE-
 (364) QUEUE de Suriname (Male) *Buff. pl. 271.*
 — *Audebert jacamars pl. 3.* — *Vaillant Oif.*
de paradis pl. 52. — PARADISE JACA-
 MAR *Lath. Syn. v. 2. p. 605.* — *Edw.*
t. 10.

GALBULA VIRIDIS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 459. — LE JACAMAR de la Guija-
 (386) ne et du Brésil (Male et Femelle) *Buff. pl.*
238. — *Audeb. pl. 1 et 2.* — *Vaill. pl.*

47 et 48. — GREEN JACAMAR *Lath. Syn. v. 2. p. 603.*

GALBULA FLAVIROSTRIS. *Mihi* — Galbula Albirostris (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. (712) v. 1. p. 245.* — LE PETIT JACAMAR à BEC JAUNE, OU LE VENETOU de l'Amérique Meridionale (Male et Femelle) — *Audb. pl. 4 et 5. — Vaill. pl. 51.* — WHITE-BILLED JACAMAR *Lath. Syn. Supp. v. 1. p. 113.*

GENUS ALCEDO. GENRE MARTIN-PÊCHEUR.

ALCEDO FUSCA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 454.* — LE GRAND MARTIN PÊCHEUR (212) de la nouvelle Guinée (Male et Femelle) *Buff. pl. 663.* (le Male) — GREAT BROWN KINGFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 609.*

ALCEDO CAPENCIS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 455.* — LE MARTIN-PÊCHEUR à GROS-BEC (206) ROUGE d'Afrique *Buff. pl. 590.* — CAPE KINGFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 610.*

ALCEDO CAPENSIS. (Varietas) — LE MARTIN-PÊCHEUR BRUN à GROS-BEC (213) ROUGE d'Afrique (Male) (*varieté*).

ALCEDO MAXIMA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 455.* — LE GRAND MARTIN-PÊCHEUR (202) HUPPÉ d'Afrique (Male et Femelle) *Buff. p. 679.* — GREAT AFRICAN KINGFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 611.*

ALCEDO RUDIS *Gmel. Syst. I. p. 457.* — LE MARTIN-PÊCHEUR TACHETÉ, OU (201) PIE d'Afrique *Buff. pl. 62.* — BLACK AND WHITE KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 612.*

ALCEDO SMYRNENSIS. *Gmel. Syst. I. p. 456. B.* — MARTIN-PÊCHEUR BLEU ET (207) ROUX de Madagascar *Buff. pl. 232.* — GREAT GAMBIA KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 616.*

ALCEDO CHLOROCEPHALA. *Gmel. Syst. I. p. 454.* — LE MARTIN PÊCHEUR À TÊTE (489) VERTE des Moluques *Buff. pl. 783.* — GREEN-HEADED KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 620.*

ALCEDO ARTRICAPILLA. *Gmel. Syst. I. p. 453.* — LE MARTIN-PÊCHEUR À COIFFE (486) NOIRE de la Chine *Buff. pl. 673.* — BLACK-CAPED KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 624. N^o. 15.*

ALCEDO ISPIDA. *Gmel. Syst. I. p. 448.* — LE MARTIN PÊCHEUR VULGAIRE d'Eu- (667) rope (Male) *Buff. pl. 77.* — THE COMMON KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 626. N^o. 16.*

ALCEDO DEA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 458.* — LE MARTIN PÊCHEUR À LONGSBRINS (485) de Ternate (Male) *Buff. pl. 116.* — TERNATE KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2. p. 634. N^o. 24.*

AL-

- ALCEDO BICOLOR.** (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
 1. p. 451. — MARTIN FÉCHEUR VERD
 (208) ET ROUX, OU MARTIN PÉCHEUR à
 COLLIER de Caienne (Male et Femelle)
Buff. pl. 592. — RUFIOUS AND GREEN
 KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2. p.* 640.
- ALCEDO AMERICANA.** (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 451. — LE MARTIN-PÉCHEUR
 (387) VERD ET BLANC de Caienne (Male et
 Femelle) *Buff. pl.* 591. — WHITE AND
 GREEN KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2.*
p. 641.
- ALCEDO ALCYON.** *Gmel. Syst.* 1. p. 451. —
 LE MARTIN-PÉCHEUR HUPPÉ, OU LE
 (214) JAGUACATI de la Louisiane *Buff. pl.* 715.
 — BELTED KINGSFISHER *Lath. Syn.*
v. 2. p. 637.
- ALCEDO TORQUATA.** (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
 1. p. 452. — LE MARTIN-PÉCHEUR
 (203) HUPPÉ, ON L'ALATLI du Mexique (Ma-
 le et Femelle) *Buff. pl.* 284. — CINE-
 ROUS KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2.*
p. 636. N^o. 26.
- ALCEDO CRISTATA.** (Mas) *Gmel. Syst.* 1. p. 447. —
 LE PETIT-MARTIN PÉCHEUR HUP-
 (204) PÉ, OU LE VINTSI de l'isle de Luçon (Male)
Buff. pl. 756. f. 1. — CRESTED KING-
 FISHER *Lath. Syn. v. 2. p.* 652. N^o. 22.
- ALCEDO RUDIS.** (Varietas) — MARTIN-PÉ-
 CHEUR

(205) CHEUR HUPPÉ, OU LE PIE d'Afrique
Buff. pl. 716. — BLACK AND WHITE
 KINGSFISHER *Lath. Syn. v. 2. p.* 612.
 — *Edwards t.* 9.

ALCEDO SUPERCILIOSA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 450. — LE MARTIN-PÉ-
 (209) CHEUR PETIT-VERD à COLIER de
 Caienne (Male et Femelle) *Buff. pl.* 756. f.
 2. — SUPERCILIOUS KINGSFIS-
 HER *Lath. Syn. v. 2. p.* 643. — *Ed-*
wards t. 245.

————— LE MARTIN-CHAS-
 SEUR d'Afrique, pays des Caffres (Male et
 (210*) Femelle) — *non décrit.*

————— LE MARTIN-PÉ-
 CHEUR AIGUE-MARIN à VENTRE
 (731*) SABLÉ de la Côte d'Angôle — *non de-*
crit.

————— LE MARTIN-CHAS-
 SEUR TOUZI de la Côte d'Angôle (Male
 (786) et Femelle) — *Sonnini v. 20. p.* 231.
 (Variété du Martin-pêcheur bleu et noir.)

————— GRAND MARTIN-
 PÉCHEUR à PLASTRON, OU LE VER-
 (787*) DEROUX d'Amerique — *Espèce nouvelle*
non décrite.

————— LE PETIT MARTIN-PÉCHEUR
 AIGUE-MARIN de Java (Male) — *non*
 (466*) *décrit.*

AL-

- ALCEDO SACRA.** *Gmel. Syst. I. p. 453.* —
 LE MARTIN-PÊCHEUR SACRÉ des îles
 (963) de l'Océan Austral. — Le Martin-Pê-
 cheur des mers du Sud. — *Sonnini v. 20.*
p. 219. — SACRED KINGSFISHER
Lath. Syn. v. 2. p. 621. var. A.
- ALCEDO SENEGALENSIS.** *Lath. Ind. v. I. p. 249.*
 — *Gmel. Syst. I. p. 455.* — LE MARTIN
 (1032) PÊCHEUR à TÊTE GRISE du Sénégal *Buff.*
pl. 594. — SENEGAL KINGSFISHER
Lath. Syn. v. 2. p. 618.

GENUS TODUS.

GENRE TODIER.

- TODUS CINEREUS.** *Gmel. Syst. I. p. 443.* —
 LE TIC-TIC, OU TODIER à VENTRE
 (310) JAUNE d'Amérique *Buff. pl. 585. f. 3.* —
 CINEROUS TODY *Lath. Syn. v. 2. p.*
p. 658.
- TODUS VIRIDIS.** (Mas) *Gmel. Syst. I p. 442.* —
 LE TODIER VERD de l'Amérique septen-
 (599) trionale (Male) *Buff. pl. 585. f. 1.* —
 GREEN TODY *Lath. Syn. v. 2. p. 657.*
- TODUS REGIUS.** (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 445.*
 — LE TODIER HUPPÉ, OU ROI DES
 (430) TODIERS (Male) — Roi des Gobe-
 Mouches, ou Tyran huppé *Buff. pl. 289.*
 — KING-TODY *Lath. Syn. v. 2. p. 662.*

GENUS MEROPS.

GENRE GUËPIER.

- MEROPS APIASTER. *Gmel. Syst. 1. p. 460.* —
LE GUËPIER, OU GRAND GUËPIER
(103) VERD d'Europe *Buff. pl. 938.* — THE
BEE-EATER *Lath. Syn. v. 2. p. 667. N^o. 5.*
- MEROPS VIRIDIS. *Gmel. Syst. 1. p. 460.* —
LE GUËPIER VERD à COLLIER de Ma-
(426) dagascar (Male) *Buff. pl. 740.* — INDIAN
BEE-EATER *Lath. Syn. v. 2. p. 672. N^o.
2.* — *Edw. pl. 183.*
- MEROPS NUBICUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 464.
N^o. 14.* — LE GUËPIER ROUGE à
(454) TÊTE BLEUE de Nubie (Male) *Buff. pl.
649.* — BLUE-HEADED BEE-EATER
Lath. Syn. v. 2. p. 680.
- MEROPS NOVÆ SEELANDIÆ. *Gmel. Syst. 1.
p. 464.* — LE GUËPIER KOGO de la
(899) Nouvelle Zélande *Buff. de Sonnini v. 1^{er}.
p. 284.* — POE BEE-EATER *Lath.
Syn. v. 2. p. 682. N^o. 17.* — La Cravate
frisée *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 92.*
-
- LE GUËPIER à
COLLIER GROS BLEU de Malymbe. —
(714) Guëpier à plumage Varié *Sonnini v. 18. p.
p. 278.*
-
- PETIT GUËPIER
à QUEUE D'HIRONDELLE, OU LE
(105) TAWA d'Afrique *Vaill. 2. voy. d'Afrique.
v. 2. p. 318.* — *Sonnini v. 18. p. 273.*

— PE-

PETIT GUËPIER
à HAUSSECOL NOIR du Sénégal (Male)
(1046*) — *non décrit.*

GENUS UPUPA

GENRE HUPPÉ.

UPUPA CAPENSIS. *Gmel. Syst. I. p. 466. N^o.*
4. — LA HUPPÉ NOIRE ET BLAN-
(418) CHE d'Afrique *Buff. pl. 697. — Audeb.*
Oif. Dorés pl. 3. — MADAGASCAR
HOPPO *Lath. Syn. v. 2. p. 690.*

UPUPA EPOPS. *Gmel. Syst. I. p. 466. — LA*
HUPPÉ d'Europe *Buff. pl. 52. — Au-*
(900) *deb. pl. 1. — THE HOPPO Lath. Syn*
v. 2. p. 687. — Frisch T. 43.

UPUPA PROMEROPS. *Gmel. Syst. I. p. 467. —*
LE PROMEROPS d'Afrique, Cap de Bonne
(110) Esperance *Buff. pl. 637. — Audeb. pl.*
4. — CAPE PROMEROPS *Lath. Syn.*
v. 2. p. 692.

LA HUPPE VARIÉE d'A-
frique, Roiyaume du Congo. — *Audeb. pl.*
(189) 2. *Buff page 511. v. 6. Var.*

LE PROMEROPS OLIVA-
TRE des îles de la mer pacifique *Audeb.*
(568) *pl. 5.*

LE PROMEROPS à PLAS-
TRON BLEU, OU LE PROMÉFIL de la
(525*) nouvelle Guinée (Male) *non décrit.*

UPUPA ERYTHRORYNCHOS. (Mas et Femina)

E 5

Lath.

- Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 280.* — LE PROMEROPS à BEC ROUGE, OU LE GRIMPART d'Afrique (Male et Femelle) *Audeb. pl. 6.* — RED-BILLED PROMEROPS *Lath. Syn. Supp. p. 124. t. 110.*

- LE PROMEROPS NAMAQUI d'Afrique, pays des grands
 (100*) Namaquois — *non décrit.*
 UPUPA SUPERBA. (Mas et Femina) *Lath. Ind. v. 1. p. 279.* — Upupa Papuensis *Lath. Ind. p. 279.* (Femina) — Upupa Magna (Mas) — Upupa Fusca (Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 468.* — LE GRAND PROMEROPS de la nouvelle Guinée (Male et Femelle) *Buff. pl. 639.* (le Male) *pl. 638.* (la Femelle) — *Audeb. pl. 7. et 8.* — *Lath. Syn. v. 2. p. 695. t. 32.* (le Male) *p. 694. N^o. 4.* (la Femelle)
 UPUPA SUPERBA. *Hornotinus* (Mas) — LE GRAND PROMEROPS de la nouvelle Guinée (372) *Jeun age* (Male)

GENUS CERTHIA. GENRE GRIMPEREAU.

- CERTHIA SENEGALENSIS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 477. N^o. 14.* — SOUÏMANGA VIOLET à POITRINE ROUGE d'Afrique, Rivière du Sénégal (Male) *Buff. v. 6. p. 335. Edit. folio.* — *Audebert Oiseaux dorés v. 2. pl.*

- pl.* 8. — SENEGAL CREEPER *Lath.*
v. 2. *p.* 209.
- CERTHIA CHALYBEA. *Gmel Syst.* 1. *p.* 475.
 N^o. 10. — LE SOUÏ-MANGA à COLLIER
 (116) d'Afrique, pays Anténiquoi *Buff. pl.* 246.
f. 3. — *Aud. v.* 2. *pl.* 13. — COL-
 LARED CREEPER *Lath. Syn. v.* 2. *p.*
 709.
-
- LE SOUÏMANGA à
 FRONT D'ORÉ (Male et Femelle) d'Afrique
 (113) *Audeb. v.* 2. *pl.* 516.
-
- LE SOUÏMANGA à TÉ-
 TE BLEUE de Malimbe (Male) *Audeb. v.*
 (705) 2. *pl.* 7.
- CERTHIA SPERATA. (Mas) *Gmel. Syst.* 1. *p.*
 477. — LE SOUÏ-MANGA à CINTU-
 RE MARON des Philippines (Male) *Buff.*
 (118) *v.* 6. *page* 340. *Edit. folio.* — *Audeb. pl.*
 16. — RED BREASTED CREEPER
Lath. Syn. v. 2. *p.* 706.
-
- LE SOUÏMANGA à CIN-
 TURE BLEUE du Sénégal — *Audeb.*
 (114) *v.* 2. *pl.* 10.
- CERTHIA FAMOSA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
 1. *p.* 481. — LE GRAND SOUÏ-MANGA
 (111) à LONGUE QUEUE du Cap de Bonne Espe-
 rance (Male et Femelle) — *Buff. pl.* 83 (le
 Male) — *Audeb. v.* 2. *pl.* 37 et 38. —
 FAMOUS CREEPER *Lath. Syn. v.* 2. *p.*
 720. N^o. 21.

CER-

CERTHIA VIOLACEA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. i. p. 482.* — LE SOUÏ-MANGA (112) à CAPUCHON VIOLET d'Afrique (Male et Femelle) *Buff. pl. 670. f. 2.* (le Male) — *Audeb. v. 2. pl. 39.* — VIOLET-HEADED CREEPER *Lath. Syn. v. 2. p. 718. N^o. 19.*

CERTHIA PULCHELLA. *Gmel. Syst. i. p. 481. N^o. 19.* — LE PETIT SOUÏ-MANGA à (452) LONGUE QUEUE de la Côte de Guinée *Buff. pl. 670. f. 1.* — *Audeb. pl. 40.* — BEAUTIFUL CREEPER *Lath. Syn. v. 2. p. 719.*

LE SOUÏ-MANGA à BEC DROIT, OU LE MIGNON d'Afrique, pays (115*) des Caffres (Male et Femelle) *Audeb. v. 2. pl. 75.* (la Femelle) — *Le Male non décrit.*

LE SOUÏ-MANGA ROUGE ET GRIS des Indes Orientales — (66) *Audeb. v. 2. pl. 36.*

CERTHIA MURARIA. *Gmel. Syst. i. p. 473.* — LE GRIMPEREAU DE MURAILLE (101) d'Europe *Buff. pl. 372.* — *Audeb. v. 2. pl. 73.* — WALL CREEPER *Lath. Syn. v. 2. pl. 730.* — *Edw. pl. 361.*

LE SOUÏ-MANGA GRIS à LUNETTES du Port Jackson — (707) *v. 2. pl. 28.*

CERTHIA CINNAMOMEA. *Gmel. Syst. i. p. 480.*
GRIM-

- GRIMPEREAU ROUX, OU LE CINNAMON de Caijenne *Audeb. v. 2. pl. 62.* — CINNAMON CREEPER *Lath. Syn. v. 1. 298. N^o. 56.*
-
- LE SOUÏ-MANGA VIOLET à VENTRE JAUNE d'Afrique Deserts du Zahara (Male et Femelle) — *non décrit. Espèce nouvelle.*
-
- LE SOUÏ-MANGA à VENTRE AURÔRE des Iles de l'Océan pacifique — *non décrit.*
-
- LE SOUÏ-MANGA JACINTE des Iles de l'Océan pacifique (Male) — *non décrit.*
-
- LE SOUÏ-MANGA à COLLIER BLEU ET ROUGE de Malimbe (Male) — Souimanga verd et brun. — *Audeb. v. 2. pl. 24.*
-
- LE SOUÏ-MANGA à FLANCS SOUCI, OU SOUÏ-MANGA NA-MAQUOI d'Afrique — *non décrit.*
- CERTHIA CAYANEA. *Gmel. Syst. 1. p. 483.* —
- LE GUIT-GUIT-NOIR ET BLEU à TÊTE VERTE de Caijenne *Buff. pl. 83 f. 2.* — *Audeb. pl. 44.* — BLACK AND BLUE CREEPER *Lath. Syn. v. 2. p. 724.*
- CERTHIA CAYANEA. (Varietas) — LE GUIT-GUIT NOIR ET BLEU à TÊTE VERTE variété, ou Oiseau en mue. — *Audeb. v. 2. pl. 42.*
- CERTHIA CAYANEA. *Gmel. Syst. 1. p. 475.* — LE GUIT-

GUIT-GUIT VERD TACHETÉ à GORGE ROUSSE de Caienne (Male) *Buff. pl.* (389) 682 *f.* 2. — CAYENNE CREEPER *Lath. Syn. v. 2. p. 728. N^o. 29.*

CERTHIA CÆRULEA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.* 474. — LE GUIT-GUIT NOIR ET (506) BLEU, OU LE BICOLOR de la Guiane (Male) *Audeb. v. 2. pl. 45.* — BLUE CREEPER *Lath. Syn. v. 2. p. 725.* — *Edw. t. 21.*

CERTHIA CÆRULEA (Varietas) — LE GUIT-GUIT NOIR ET BLEU, OU LE BICOLOR de la Guiane (en Mue) — *non figuré.*

CERTHIA SPIZA (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p.* 476. — LE GUIT-GUIT VERD à (410) CAPUCHON NOIR (Male et Femelle) du Brésil *Buff. p. 362. v. 6.* — *Audeb. v. 2. pl. 47 et 48.* — BLACK-HEADED CREEPER *Lath. Syn. v. 2. p. 726.*

CERTHIA SPIZA. (Varietas) — LE GUIT-GUIT VERD à CAPUCHON NOIR du (439) Brésil jeun age — *Audeb. v. 2. pl. 49.*

CERTHIA FLAVEOLA. *Gmel. Syst. I. p.* 479. — LE GUIT-GUIT SUCERIER des Antilles (164) *Buff. v. 6. p. 368.* — *Audeb. pl. 51.* YELLOW-BELLIED CREEPER *Lath. Syn. v. 2. p. 737.*

CERTHIA VESTIARIA. (Mas) *Lath. Ind.* } *Orn. v. I. p. 282.*

CERTHIA COCCINEA. — *Gmel. Syst. I.* } LE } *p. 470.*

HEO-

- HEOROTAIRE ROUGE d'Otaheite (Male)
 (102) *Audeb. v. 2 pl. 52.* — HOOK-BILLED
 RED CREEPER *Lath. Syn. v. 2. p. 704:*
 ————— LE SOUÏ-MANGA POUR-
 PRE des Indes (Male) *Audeb. v. 2. pl. II.*
 (929) PURPLE INDIAN CREEPER *Edwards t.*
265. Figure superieure.
 ————— LE SOUÏ-MANGA ECLA-
 TANT de la Côte de Guiné (Male) *Audeb.*
 (69) *v. 2. pl. 2.*
 ————— LE HEOROTAIRE GRI-
 GRACULE de la nouvelle Zélande ———
 (984*) *non decrit.*
 ————— LE HEOROTAIRE VE-
 LOUTÉ de la nouvelle Galle Meridionale
 (985*) (Male) — *non decrit.*
 ————— LE HEOROTAIRE AL-
 BICAPIL de la nouvelle Hollande — *non*
 (670*) *decrit.*

GENUS TROCHILUS. GENRE MELLIVÔRE.

- TROCHILUS PELLA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 485. — LE COLIBRI TOPAZE
 (432) (Male et Femelle) de Caienne *Buff. pl. 599.*
fig. 1. — *Audebert Oiseaux dorés v. 1. pl.*
2. et 3. — TOPAZ HUMING-BIRD
Lath. Syn. v. 2. p. 746.
 TROCHILUS JUGULARIS. *Gmel. Syst. I. p.*
489. — Le Colibri à gorge carmin *Buff.*
 (433) *p^lge 39. v. 7. Edis. folio.* — LE COLIBRI
 GRE-

- GRENAT de St. Domingue *Audeb. v. 1. pl.*
 4. — RED-BREASTED HUMING-BIRD
Lath. Syn. v. 2. p. 735. N^o 10.
- TROCHILUS CAMPYLOPTERUS. (Mas) }
Gmel. Syst. 1. p. 499. N^o 65. } LE
- (121) TROCHILUS CINEREUS. (Femina) *Gmel.* }
Syst. 1. p. 490. N^o 41. }
- COLIBRI à LARGES TUYAUX (Male et
 Femelle) de Caienne — *Audebert pl.*
 (121) 5. (la Femelle) *et pl. 21.* (le Male) —
 ASCH-BELLIED HUMING-BIRD *Lath.*
Syn. v. 2. p. 759. (la Femelle) — BROAD
 SHAFTED HUMING-BIRD *Lath. Syn.*
v. 2. p. 765. (le Male).
- TROCHILUS PECTORALIS. *Lath. Ind. v. 1. p.*
 306. — Trochilus Gramineus *Gmel. Syst.*
 (119) 1. p. 488. — LE COLIBRI HAUSSE-
 COL VERD de l'Amérique Septentrionale
Buff. pag. 47. v. 7. — *Audeb. v. 1. pl. 9.*
 — BLACK BREASTED HUMING-
 BIRD *Lath. Syn. v. 2. p. 756. N^o 16.*
- TROCHILUS PECTORALIS. (Varietas) *Mihi* —
 Trochilus Gularis *Lath. Ind. v. 1. p. 306.*
- (122) Trochilus Maculatus *Gmel. Syst. 1. p. 488.*
 — LE COLIBRI à CRAVATE VERT-
 TE (Variété du hausse-col verd) *Buff. pl.*
 671. f. 1. — *Audeb. v. 1. pl. 10.* —
 Green Throated humming-bird *Lath. Syn.*
v. 2. p. 755.
- TROCHILUS HIRSUTUS. *Gmel. Syst. 1. p. 490.*
 — LE

— LE COLIBRI à VENTRE ROUX
 (365) ET PIEDS VETUS du Bresil *Audeb. pl. 16.*
 — RUFIOUS BELLIED HUMING-BIRD
Lath. Syn. v. 2. p. 760. N^o. 21.

TROCHILUS THAUMANTIAS. *Gmel. Syst. 1. p.*
 489. — LE PETIT COLIBRI ROUX à
 (408) QUEUE DE PIE (Male) — Le Colibrif
Buff. p. 50. v. 7. Ed. folio — Le brin-
 blanc Jeun age *Audeb. v. 1. pl. 19.* —
 Admirable Huming-bird *Lath. Syn. v. 2.*
p. 763.

TROCHILUS VIRIDIS. (Mas) *Audebert*
 TROCHILUS MARGARITACEUS. *Gmel.* } LE
Syst. 1. p. 490. (Femina)
 COLIBRI GROS-VERD (Male et Femelle)
 (513) des Iles de l'Amerique Septentrionale *Audeb.*
v. 1. pl. 15. (le Male) et pl. 16. (la Femelle).

TROCHILUS MANGO. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 491. — LE COLIBRI à PLAS-
 (356) TRON NOIR (Male et Femelle) de la Jamai-
que Buff. pl. 680. fig. 2. — Audeb. pl.
7. (le Male) — (la Femelle n'est pas decrite)
 — MANGO HUMMING-BIRD *Lath.*
Syn. v. 2. p. 758. N^o. 18.

TROCHILUS HOLOSERICEUS. *Gmel. Syst. 1. p.*
 491. — LE COLIBRI VERDE ET NOIR
 (126) à CINTURON BLEU du Mexique *Buff. v.*
7. p. 42. Ed. folio. — Audeb. v. 1. pl. 6. —
 BLACK BELLIED HUMING-BIRD *Lath.*
Syn. v. 2. p. 754.

TROCHILUS SUPERCILIOSUS. (Mas et Femina)
 F *Gmel.*

(407) *Gmel. Syst.* I. p. 485. — LE COLIBRI
à BRINS-BLANC (Male et Femelle) de la
Guiane — *Buff. pl.* 600. *fig.* 3. — *Au-*
deb. pl. 17. (le Male) — LONG-TAI-
LED HUMING-BIRD *Lath. Syn.* v. 2. p.
748. N^o. 4.

TROCHILUS MELLIVORUS. (Mas et Femina)
Gmel. Syst. I. p. 499. — L'OISEAU-
(123) MOUCHE à COLLIER DIT LA JACOBI-
NE (Male et Femelle) de Caienne *Buff. pl.*
640. *fig.* 2. — *Audeb. pl.* 23 et 24. —
WHITE-BELLIED HUMING-BIRD *Lath.*
Syn. v. 2. p. 765. N^o. 31.

TROCHILUS AURITUS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 493. — L'OISEAU-MOUCHE
(405) à OREILLES BLEUES (Male et Femelle)
de la Guiane *Buff.* v. 7. p. 25. *Ed. folio.*
— *Audeb. pl.* 25 et 26. — VIOLET-
EARED HUMING-BIRD *Lath. Syn.* v. 2. p.
767. N^o. 33.

TROCHILUS MOSCHITUS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. p. 494. — L'OISEAU-MOUCHE
(500) RUBIS-TOPAZE (Male et Femelle) de
Caienne *Buff. pl.* 227. *fig.* 2. — *Audeb.*
pl. 29. (le Male) *pl.* 55. (la Femelle) —
RUBY-NECKED HUMING-BIRD *Lath.*
Syn. v. 2. p. 779. N^o. 46.

TROCHILUS MOSCHITUS. (*Pullus*) — L'OI-
SEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE (Male
(514) Jeun age) *Audeb.* v. 1. *pl.* 30.

TRO.

- TROCHILUS COLUBRIS (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
492. — L'OISEAU MOUCHE RUBIS
(428) (Male) d'Amerique *Buff. v. 7. p. 10. Ed.*
folio. — *Audeb. v. 1. pl. 31.* — RED-
THROATED HUMMING-BIRD *Lath.*
Syn. v. 2. p. 769. N^o. 35.
- TROCHILUS COLUBRIS (Pullus) — L'OISEAU
MOUCHE RUBIS (Male Jeun age) *Audeb.*
(125) *v. 1. pl. 33.*
- TROCHILUS FURCATUS (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
486. — L'OISEAU-MOUCHE VIOLET
(412) à QUEUE FOURCHUE (Male) de la Ja-
maïque- *Buff. v. 7. p. 30. Ed. folio.* —
Audeb. v. 1. pl. 34. — LESSER FORK-
TAILED HUMING-BIRD *Lath. Syn. v. 2.*
p. 751.
- TROCHILUS FURCATUS. (Pullus) — L'OISEAU-
MOUCHE VIOLET à QUEUE FOUR-
(577) CHUE (Male Jeun age) — *non décrit.*
- TROCHILUS ORNATUS (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 497. — L'OISEAU MOU-
(378) CHE HUPPECOL (Male et Femelle) de la
Guiane *Buff. pl. 640. fig. 3.* — *Audeb.*
v. 1. pl. 49 et 50. — TUFFED-NEC-
KED HUMING-BIRD *Lath. Syn. v. 2. p.*
784. N^o. 55.
- TROCHILUS CRISTATUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1.*
p. 498. — L'OISEAU-MOUCHE HUP-
(124) PÉ de Caienne (Male) *Buff. pl. 227. fig. 1.*
— *Audeb. v. 1. pl. 47.* — CRESTED

- GREEN HUMING-BIRD *Lath. Syn. v. 2. p. 783. N^o. 53. — Edwards pl. 37.*
- TROCHILUS VIRIDISSIMUS. (Mas et Femina)
Gmel. Syst. 1. p. 496. — L'OISEAU-
 (120) *MOUCHE EMERAUDE, OU TOUT*
VERD (Male et Femelle) Audeb. v. 1. pl.
42 et 43. — ALL-GREEN HUMING-
BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 786. N^o. 58.
— Edwards pl. 360. fig. 1.
- TROCHILUS VIRIDIS. *Audeb. Oif. dorés — L'OI-*
SEAU-MOUCHE VERD DORÉ à QUEUE
 (269) *BLANCHE ET VERTE de la Guijane —*
Audeb. v. 1. pl. 41.
- TROCHILUS SAPHIRINUS. *Gmel. Syst. 1. p. 496.*
L'OISEAU-MOUCHE SAPHIR de Caijenne
 (382) *Buff. v. 7. p. 20. Ed. folio. — Audeb. v.*
1. pl. 35. — SAPHIR HUMING-BIRD
Lath. Syn. v. 2. p. 775. N^o. 39.
- TROCHILUS SAPHIRINUS. (Junior) — *L'OI-*
SEAU-MOUCHE SAPHIR passant du jeun
 (406) *age à l'age fait.*
- TROCHILUS LONGICAUDUS. (Mas) *Gmel.*
Syst. 1. p. 498. — L'OISEAU-MOU-
 (396) *CHE à RAQUETTES de l'Amérique Me-*
ridionale: (Male) Buff. v. 7. p. 13. Edit.
folio — Audeb. v. 1. pl. 52. — RAC-
KET-TAILED HUMING-BIRD Lath.
Syn. v. 2. p. 782.
- TROCHILUS MAUGAEUS. (Mas) *Audebert —*
 (517) *L'OISEAU-MOUCHE MAUGE de Porto-*
Rico

Rico (Male) — *Audeb. Oif. dorés v. 1.*
pl. 37.

L'OISEAU-MOUCHE
 VERD DE MER d'Amérique (Male) —
 (555*) *non décrit.*

GENUS STURNUS. GENRE ETOURNEAU.

STURNUS VULGARIS. *Gmel. Syst. 1. p. 801.* —
 L'ETOURNEAU d'Europe *Buff. pl. 75.* —

(729) COMMON STARE *Lath. Syn. v. 3. p. 2.*

STURNUS CAPENSIS. *Gmel. Syst. 1. p. 802.* —
 L'ETOURNEAU PIE du Cap de Bonne Es-

(156) pérance *Buff. pl. 280.* — CAPE STARE
Lath. Syn. v. 3. p. 5.

STURNUS LUDOVICIANUS. (Mas et Femina)
Gmel. Syst. 1. p. 802. — LE STOUR-

(339) NE, OU L'ETOURNEAU DE LOUISIANE
 (Male et Femelle) *Buff. pl. 256.* (le Male)

— LOUISIANE STARE *Lath. Syn. v.*
3. p. 6.

STURNUS MILITARIS. *Gmel. Syst. 1. p. 803.*

* N^o. 6. — LE BLANCHERAIE, OU
 (422) ETOURNEAU DES TERRES MAGELLA-

NIQUES *Buff. pl. 113.* — MAGELLANIC
 STARE *Lath. Syn. v. 3 p. 7.*

STURNUS NABIROP. *Daudin. Orn. v. 2. p. 312.*

— *Turdus Auratus Gmel. Syst. 1. p. 819.*
 (144) N^o. 64. — LE NABIROP, OU ETOUR-

NEAU CUIVRÉ d'Afrique *Vaill. Oif. d'Af.*
v. 2. pl. 89. — Le Merle Violet de Juida

Buff. pl. 540. — Gilded Thrush *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 57.

STURNUS NITENS. *Daudin. Orn. v.* 2. *p.* 313.

— *Turdus Nitens Gmel. Syst. I. p.* 818.

(259) — L'ETOURNEAU COUIGNOP, d'Afrique *Vaill. Ois. d'Af. v.* 2. *pl.* 90. — Le Merle verd d'Angola *Buff. pl.* 561. — Shining Thrush *Lath. Syn. v.* 2.

STURNUS MORIO. *Daudin Ornith. v.* 2. *p.* 307.

— *Turdus Morio Gmel. Syst. I. p.* 297.

(147) N^o. 26. — L'ETOURNEAU ROUPENNE, OU LE JAUNOIR d'Afrique *Vaill. Ois. d'Af. v.* 2. *pl.* 83 et 84. — *Buff. pl.* 199. (Male) — African Thrush *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 55.

STURNUS ÆNEUS. (Mas) *Daudin Orn. v.* 2. *p.* 310.

— *Turdus Æneus Gmel. Syst. I. p.* 818.

(135) N^o. 63. — LE VERD DORÉ, OU ETOURNEAU à LONGUE QUEUE d'Afrique (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v.* 2. *pl.* 87. — Le Merle verd à longue queue *Buff. pl.* 220. — Glosfy Thrush *Lath. Syn. v.* 2. *p.* 57. N^o. 61.

STURNUS BARITA. *Daudin Orn. v.* 2. *p.* 320.

— *Gracula Barita Gmel. Syst. I. p.* 396.

(717) — L'ETOURNEAU à QUEUE BRISÉE EN GOUTIÈRE, OU LE BARITE des Antilles *Buff. de Sonnini v.* 9. *p.* 106. — Boat-tailed Grakle *Lath. Syn. v.* 2. *p.* 460.

STURNUS SPLENDENS. (Mas) *Daudin Ornith.*

v. 2.

(435) v. 2. p. 309. — L'ÉTOURNEAU ÉCLATANT des îles de l'Océan Indien (le Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 85.* — *Buff. de Sonnini v. 9. p. 90.*

STURNUS NABOUROUP. (Mas) *Daudin Orn. v. 2. p. 308.* — L'ÉTOURNEAU NABOUROUP d'Afrique (le Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 91.*

(701) — L'ÉTOURNEAU BRILLANT d'Afrique, Royaume de Congo (Male) — Le Merle Brillant *Sonnini Edit. de Buff. v. 10. p. 209.*

GENUS TURDUS.

GENRE GRIVE.

TURDUS VISCIVORUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 806.* — LA GROSSE GRIVE, OU LA DRAINE d'Europe (le Male) *Buff. pl. 489.* — MISSEL THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 16.*

TURDUS PILARIS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 807.* — LA LITORNE, OU LA TOURDELLE d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 490.* — *Frisch T. 26.* — FIELDFARE THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 24, N^o. II.*

TURDUS MIGRATORIUS. *Gmel. Syst. 1. p. 811.* LA LITORNE à POITRINE ROUSSE du Canada *Buff. pl. 556. f. 1.* — RED

BREAſTED THRUSH *Lath. Syn. v. 3.*
p. 43.

TURDUS MERULA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 831. — LE MERLE (Male et Fe-
 (737) melle) d'Europe *Buff. pl. 2. et 555.* —
Friſch T. 29. — BLACK-BIRD *Lath.*
Syn. v. 3. p. 43.

TURDUS TORQUATUS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 832. — LE MERLE à COL-
 (738) LIER, OU LE PLASTRON BLANC
 (Male et Femelle) *Buff. pl. 516.* — *Lath.*
Friſch T. 30. — RING-OUZEL THRUSH
Syn. v. 3. p. 46.

TURDUS MAURITANUS. *Gmel. Syst. 1. p. 822.*
N^o. 75. — LE MERLE VERD d'isle de
 (60) France *Buff. pl. 648. f. 2.* — MAURITIUS
 THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 69.*

TURDUS CAPENSIS. *Gmel. Syst. 1. p. 822.* —
 LE MERLE à CUL JAUNE, OU LE
 (136) BRUNOIR d'Afrique *Buff. pl. 317.* —
Vaill. Oif. d' Af. v. 3. pl. 106. — BRUNET
 THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 71.*

TURDUS PLUMBEUS. *Gmel. Syst. 1. p. 814.* —
 LE TILLY, OU LA GRIVE CENDRÉE
 (753) d'Amerique *Buff. pl. 560. f. 1.* — RED
 LEGGED THRUSH *Lath. Syn. v. 3.*
p. 33.

LE MERLE ORANGÉ,
 OU LE RECLAMEUR d'Afrique (le Male)
Vaill.

(132) *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 104. — Sonnini Edit. de Buff. v. 9. p. 192.*

LE MERLE ESPION D'AFRIQUE *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 103. — Buff. de Sonnini v. 9. p. 187.*

TURDUS CINEREUS. *Gmel. Syst. 1. p. 810. N^o. 36. — LE MERLE CENDRÉ DES*

(123) *INDES Buff. page 104. Ed. folio. — ASH-COLOURED THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 67.*

LE MERLE À CRAVATE BLANCHE de Batavia *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 115. — Sonnini Edit. de Buff. v. 9. p. 252.*

LE MERLE ECAILLÉ de l'isle de Java *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 116. — Sonnini v. 9. p. 254.*

LE MERLE FLUTEUR du Cap de Bonne Espérance (le Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 112. f. 2. — Sonnini v. 9. p. 212.*

TURDUS MINDANENSIS. *Gmel. Syst. p. 823. — LE MERLE CADRAN d'Afrique Vaill. (20) Ois. d'Af. v. 3. pl. 109. — Sonnini v. 9. p. 256. — Merle de Mindanao Buff. pl. 627. — MINDANAO THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 69. N^o. 87.*

TURDUS MUSICUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 809. — LA GRIVE VULGAIRE, OU (943) GRIVE DE VIGNE (Male) d'Europe Buff.*

pl. 406. — Song Thrush *Lath. Syn. v. 3. p. 18. N^o. 2.*

TURDUS SINENSIS. *Gmel. Syst. 1. p. 829.* —
L'HOAMY, OU LA GRIVE ROUSSE de la
(902) Chine (Male) *Buff. v. 4. p. 45. Edit. folio.* —
CHINESE THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 36.*

TURDUS ILIACUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 808.* — LE MAUVIS, OU MAUVIETTE
(949) d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 51.* —
REDWING THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 22.*

TURDUS SAXATILIS. *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 336.* — Lanius infaustus Minor *Gmel. Syst. 1. p. 310.* — LE MERLE DE ROCHE d'Europe *Buff. pl. 562.* — *Frisch T. 32.* — LESSER ROCK THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 54.* — *et v. 1. p. 177.*

LE MERLE GRIMPEUR
à QUEUE EPINEUSE de la nouvelle Galle
(968*) meridionale *Espèce nouvelle non decrite.*

LE MERLE GUTTURAL de la nouvelle Zelande (Male) —
(901*) *non decrit.*

TURDUS CAYANUS. *Gmel. Syst. 1. p. 834.* —
LE MERLE BLEU, OU LE MERLE SOLITAIRE d'Europe — *Buff. pl. 250.*
(845) (la Femelle) — *Edw. T. 18.* (le Male) —
BLUE THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 51.*

LE MERLE à CROISANTS de la nouvelle Zelande — *non*
(1000*) *decrit.*

TUR-

- TURDUS PERSPICILLATUS. *Lath. Ind. v. 1. p. 349.* — *Gmel. Syst. 1. p. 830.* — LE
 (1048) MERLE à LUNETTES de la Chine. —
 Merle de la Chine *Buff. pl. 604.* — SPECTACLE THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 6.*
- TURDUS MOLUCCENSIS (Mas) — *Brisf. Ornith. p. 316. v. 2.* — LE BRÈVE à BANDEAU NOIR de Madagascar (Male) —
 (129) Merle des Moluques *Buff. pl. 257.*
- TURDUS MOLUCCENSIS. (Varietas) — LE
 BRÈVE à BANDEAU NOIR de Madagascar
 (476) *car Variété.*
- TURDUS ARUNDINACEUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 834.* — LA GRIVE ROUSSE-
 (904) ROLLE d'Europe (Male) *Buff. pl. 513.* —
 REED THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 32.*
- TURDUS JOCOSUS. (Mas) *Mihi.* — Lanius Joco-
 cosus *Gmel. p. 310.* — LE PETIT MER-
 (492) LE HUPPÉ, OU LE BOULBOUL des In-
 des (le Male) *Sonnerat voy. v. 2. p. 189. T. 109.* —
 Jocofoe Shrike *Lath. Syn. v. 1. p. 175.*
- TURDUS OLIVACEUS. *Gmel. Syst. 1. p. 810.* —
 LE GRIVERON du Cap de Bonne Espè-
 (903) rance *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 98.* — Le
 Merle Olive du Cap de B. E. *Buff. v. 4. p. 101. Edit. folio.* — OLIVE THRUSH
Lath. Syn. v. 3. p. 66.

GENUS FORMICIVORUS. GENRE FOURMI-
 LIER.

- FORMICIVORUS TINIENS. *Mihi* — *Turdus*
Tiniens Gmel. Syst. 1. p. 827. N° 96. —
 (134) LE FOURMILIER GRAND BEFFROI de
 Caienne *Buff. pl. 706. fig. 1. —* ALARUM
 THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 86.*
- FORMICIVORUS COLMA. *Mihi* — *Turdus*
Colma Gmel. Syst. 1. p. 827. —
 (146) FOURMILIER à TÊTE ROUSSE, OU
 LE TETMA de Caienne *Buff. pl. 821. —*
 RUFOS-NAPED THRUSH *Lath. Syn.*
v. 3. p. 85. N° 117.
- FORMICIVORUS BAMBLA. *Mihi* — *Turdus*
Bambla Gmel. Syst. 1. p. 827. N° 93. —
 (721) FOURMILIER BARÉ, OU LE BAMBLA
 de Caienne *Buff. pl. 703. f. 2. —*
 BLACK-WINGED THRUSH *Lath. Syn.*
v. 3. p. 84. N° 115.
- LE TRÈS PETIT FOUR-
 MILIER GRIVELÉ de la Gujane ———
 (726*) *non décrit espèce nouvelle.*
- FORMICIVORUS CINNAMOMEUS. *Mihi* ———
Turdus Cinnamomeus Gmel. Syst. 1. p. 825.
 (756) — LE FOURMILIER à CRAVATE
 de Caienne *Buff. pl. 560. fig. 2. (Merle) —*
 BLACK BREASTED THRUSH *Lath. Syn.*
v. 3. p. 79.
- FORMICIVORUS CANTANS. *Mihi.* ——— *Tur-*
 du

- dus Cantans *Gmel. Syst. 1. p. 825. N^o. 87.* — L'ARADA, OU FOURMILIER
 (791) CHANTEUR d'Amerique (le Male) *Buff. pl. 706. f. 2.* — MUSICAN THRUSH
Lath. Syn. v. 3. p. 80. N^o. 109.

- FORMICIVORUS CAYANURUS. *Mihi* — Tur-
 dus Cayanurus (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
 (366) *1. p. 828. N^o. 99.* — L'AZURIN, OU
 LE FOURMILIER à QUEUE BLEUE de
 Java (Male et Femelle) *Sonnini* — Le Merle
 à queue bleue *Buffon pl. 355.* — BLUE-
 TAILED THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p.*
88.

-
- LE FOURMILIER à
 CALOTTE NOIRE de la Guijane (Male) —
 (793*) *non decrit.*

- FORMICIVORUS PECTORALIS *Mihi* — Tur-
 dus Pectoralis *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 357.*
 (138) LE PETIT FOURMILIER à GORGE
 ROUSSE de Caijenne. — Petit Merle
 Brun *Buff. pl. 644. f. 2.* — YELLOW
 BREASTED THRUSH *Lath. Syn. v. 3.*
p. 78.

- FORMICIVORUS PALIKOUR *Mihi* — Tur-
 dus Formicivorus *Gmel. Syst. 1. p. 828.*
 (860) — LE PALIKOUR, OU FOURMILIER
 de la Guijane *Buff. pl. 700. f. 1.* — ANT
 THRUSH *Lath. Syn. v. 3. p. 87.*

-
- LE GRAND FOUR-
 MI-

MILIER GRIS RAYÉ de la Guijane (Femelle) (966*) *non decrit espèce nouvelle.*

LE FOURMILIER à CUTIPENNES de la Guijane — *non decrit espèce nouvelle.*

LE FOURMILIER (987*) GRI-NOIR d'Amérique (Male) — *non decrit.*

LE FOURMILIER SOURCI-BLANC de la Guijane — *non decrit.* (1008*)

GENUS AMPELIS.

GENRE COTINGA.

AMPELIS MAYNANA. *Gmel. Syst. i. p. 840. N^o. 5.*

(363) — LE COTINGA à PLUMES SOYEUSES des Maynas *Buff. pl. 229. — Vaill. H. Nat. Cotingas pl. 43. — SILKY CHATERER Lath. Syn v. 3. p. 95. N^o. 4.*

AMPELUS POMPADORA. (Mas) *Gmel. Syst. i. p. 839. — LE COTINGA PACAPACA, (47) OU POMPADOUR de la Guijane (Male) — Buff. pl. 279. — Vaill. Cot. pl. 31. — POMPADOUR CHATTERER Lath. Syn. v. 3. p. 96.*

AMPELIS POMPADORA. (*Pullus*) (Mas) — LE COTINGA PACAPACA, OU POMPADOUR (*dans son jeun age*) (Male) *Vaill. Cot. pl. 33.*

AMPELIS POMPADORA. (*Biennis*) (Mas) —

LE COTINGA PACAPACA, OU POMPA-
 (573) DOUR (*moyen age*) (le Male) — *Vaill.*
Cotingas pl. 31. bis.

AMPELIS CAYANA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
 I. p. 840. — LE COTINGA QUEREÏVA

(44) de la Guijane (Male et Femelle) *Buff. pl. 624.*
 (le Male) — *Vaill. Hist. Nat. des Cot. pl.*
 27 et 30. — PURPLE-THROATED
 CHATTRER *Lath. Syn. v. 3. p. 95.*

AMPELIS CAYANA. (*Varietas*) (Mas) — LE CO-
 TINGA QUEREÏVA *passant du jeun age*

(566) à l'age fait (Male) — *Vaill. Cotingas pl. 29.*

AMPELIS COTINGA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.*
 840. — LE COTINGA CORDON-BLEU

(416) du Brésil (le Male) *Buff. pl. 188. —*
Vaill. Cot. pl. 40. — PURPLE BREAS-
 TED CHATERER *Lath. Syn. v. 3. p. 94.*

AMPELIS CÆRULEUS. (Mas et Femina) *Mihi —*

Ampelis Cotinga (Femina) *Gmel. Syst. I. p.*

(361) 840. — LE COTINGA BLEU de Caijen-
 ne (Male et Femelle) *Buff. pl. 186.* (Celui-ci

en fait la Femelle du cordon bleu) — *Vaill.*

Hist. Nat. des Cot. pl. 34 et 35.

AMPELIS CÆRULEUS. (*Varietas*) (Mas) —

LE COTINGA BLEU (Male) *Variété —*

(458) *Vaill. Cotingas. pl. Supplémentaire.*

LE COTINGA FLAⁿ

(716*) ROU de la Guijane (Male) — *non décrit*
Espèce nouvelle.

LE PETIT COTINGA à

FLANCS

- FLANCS VIOLET du Pérou (Male) —
 (493) *non décrit.*
- AMPELIS CARUNCULATA (Femina) *Gmel. Syst.*
 I. p. 841. — COTINGA BLANC CA-
 (567) RONCULÉ, OU LE GUIRAPANGA de la
 Guijane (Femelle) *Buff. pl. 794.* — *Vaill.*
Cotingas. pl. 40. — CARUNCULATED
 CHATERER *Lath. Syn. v. 3. p. 98.*
- AMPELIS RUBRICOLLIS. (Mas) *Mihi* — Mus-
 ficapa Rubricollis *Gmel. Syst. I. p. 933.*
 (51) LE COTINGA à HAUSSECOL ROUGE,
 OU LE PIAHAU de Caienne (le Male) *Buff.*
pl. 381. (Celui-ci le range dans le Genre Go-
 be Mouches) — *Vaill. Hist. Nat. des Cotin-*
gas pl. 47. — PURPLE THROATED
 FLYCATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 365.*
N^o. 78.
- AMPELIS GRANDIS. (Mas) *Mihi* — CORVUS
 Calvus *Gmel. Syst. I. p. 372.* — LE GRAND
 (566) COTINGA à CALOTTE GRISE (dans son
etat parfait ayant, la tête couverte de plumes)
 (Male) *Vaill. Cot. pl. 49. figure impar-*
faite — Choucas Chauve *Buff. pl. 521.* —
 Bald Crow *Lath. Syn. v. I. p. 383. N^o. 16.*
- AMPELIS CARNIFEX. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 839. — LE COTINGA
 (349) ROUGE, OU L'OUETTE (Male et Fe-
 melle) *Buff. pl. 378.* (le Male) — *Vaill.*
Hist. Nat. des Cot. pl. 37 et 38. — RED
 CHATERER *Lath. Syn. v. 3.*

AM-

AMPELIS CAERULEUS. (Biennis) (Mas) —

LE COTINGA BLEU de Caijenne —

(1052) (Male) (*Un individu en mue, conservant quelques plumes de son jeun age.*)

AMPELIS NUDUS. (Mas) *Mihi* — COIVUS NU-

— dus *Gmel. Syst. 1. p. 371.* — LE CO-

(52) TINGA COL-NUD de Caijenne (Male) —

Vaill. Hist. Natur. des Oisf. des Ind. et

d'Ameriq. pl. 45. — Buff. pl. 609. Cet

Auteur le range dans le genre Choucas. —

BARE-NECKED CROW *Lath. Syn. v. 1.*

p. 382.

GENUS COLIUS.

GENRE COLIOU.

COLIUS ERYTHROPUS. *Gmel. Syst. 1.*

p. 842.

COLIUS LEUCONOTUS. *Lath. Ind. Orn.* } ^{LB}

v. 1. p. 369.

(160) COLIOU à CROUPION BLANC du Cap

de bonne Espérance *Sonnini v. 13. p. 230.*

— WHITE-BACKED COLY *Lath. Syn.*

v. 3. p. 101. pl. 41.

COLIUS STRIATUS. (Femina) *Gmel. Syst. 1. p.*

843. — LE COLIOU RAYÉ du Cap de

(183) Bonne Espérance (Femelle) *Sonnini v. 13. p.*

227. — RADIATED COLY *Lath. Syn.*

v. 3. p. 102.

————— LE COLIOU JOU-NUE

(162*) d'Afrique pays des Caffres — *non décrit.*

————— LE COLIOU à GORGE NOI-

(780*) RE de Malymbe — *non décrit.*

G

GE-

GENUS LOXIA.

GENRE GROS-BEC.

LOXIA CAPENSIS. *Gmel. Syst. 1. p. 862. N^o.*

39. — LE GROS BEC à CROUPION
(276) JAUNE de Coromandel *Buff. pl. 101. f. 1.*
— CAPE GROSBEAK *Lath. Syn. v. 3.*
p. 113.

LOXIA CURVIROSTRA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 843. — LE BEC - CROISÉ d'Eu-

(290) rope (Male et Femelle) *Buff. pl. 218. — COM-*
MON CROSS-BILL *Lath. Syn. v. 3. p. 106.*

LOXIA CARDINALIS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 847. — LE GROS-BEC DE

(385) VIRGINIE, OU LE CARDINAL HUPPE
(Male et Femelle) *Buff. pl. 37. — CAR-*
DINAL GROSBEAK *Lath. Syn. v. 3. p. 118.*

LOXIA ORIX. *Gmel. Syst. 1. p. 863. N^o. 42. —*

LE CARDINAL ROUGE ET NOIR du
(275) Cap de Bonne Espérance *Buff. pl. 6. f. 2.*
— GRENADIER GROSBEAK *Lath.*
Syn. v. 3. p. 120.

LOXIA DOMINICANA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 848.*

— LE PAROARA, OU CARDINAL
(285) DOMINICAIN (Male) *Buff. pl. 55. f. 2. —*
DOMINICAIN GROSBEAK *Lath. Syn. v.*
3. p. 123. — Edw. t. 127.

LOXIA CUCULATA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 1.*

p. 378. — LE CARDINAL DOMINI-
(443) CAIN HUPÉ de Louisiane (Male) *Buff. pl.*
103. — CRESTED DOMINICAIN
GROSBEAK *Lath. Syn. v. 3. p. 123.*

LOXIA

- LOXIA MADAGASCARIENSIS. *Gmel. Syst. I. p. 847.* — LE GROS-BEC FOUDIS de
 (295) Madagascar (Male) *Buff. pl. 134. f. c.* —
 MADAGASCAR GROSBKAK *Lath. Syn. v. 3. p. 119.*
- LOXIA SIBIRICA. *Gmel. Syst. I. p. 849.* —
 LE GROS-BEC RÔSE, OU LE CARDI-
 (165) NAL DE SIBERIE (Male) *Buff. de Son-
 nini v. II. p. 99.* — SIBIRIAN GROSB-
 BEAK *Lath. Syn v. 3. p. 124. N^o. 21.*
-
- LE GROS-BEC MANGEUR
 DE RIZ, OU LE PADDA-GRI d'Isle de
 (797*) France — *non décrit.*
-
- LE GROS-BEC COL-COUPÉ
 (641*) d'Afrique pays des Caffres — *non décrit.*
-
- LE GROS-BEC à VENTRE
 PERLÉ d'Afrique Coté d'Angôle — *non*
 (703*) *décrit.*
- LOXIA ORYZIVORA. *Gmel. Syst. I. p. 850.* —
 LE PADDA, OU L'OISEAU DE RIZ de la
 (278) Chine *Buff. pl. 152. f. 1.* — JAVA
 GROSBKAK *Lath. Syn. v. 3. p. 129.* —
Edw. pl. 41.
- LOXIA COCCOTHAUSTUS. (Mas et Femina)
Gmel. Syst. I. p. 844. — LE GROS-BEC
 (822) d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 99 et*
100. — THE HAWFINCH *Lath. Syn.*
v. 3. p. 103. — *Frisch t. 4.*
- LOXIA MALACCA. *Gmel. Syst. I. p. 851.* —
 LE JACOBIN, OU GROS-BEC DE JAVA
 (837) *Buff. pl. 139. f. 3.* — MALACCA GROSB-
 BEAK

- BEAK *Lath. Syn. v. 3. p. 140.* — *Edwards pl. 355. f. 2.*
- LOXIA BRASILIANA. *Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 377.* — LE GROS-BEC, OU GRIVELIN du Brésil *Buff. pl. 309. f. 1.* — (281) BRASILIAN GROS-BEAK *Lath. Syn. v. 3. p. 122.*
- LOXIA PUNCTULARIA. *Gmel. Syst. 1. p. 851.* — LE GROS-BEC TACHETÉ, OU (282) LE COURY de Java (Male) *Buff. pl. 139. f. 1.* — COWRY GROSBEAK *Lath. Syn. v. 3. p. 142.* — *Edwards t. 40.*
- LOXIA MALACCA. *Gmel. Syst. 1. p. 851. Var. B.* — LE GROS-BEC CAP-NOIR de la Chine (280) *Brisson Orn. v. 3. p. 235* — THE CHINESE SPARROW *Edwards pl. 43.* — *Lath. Syn. v. 3. p. 141. Var. A.*
- LOXIA CHLORIS. (Mas et Femina). *Gmel. Syst. 1. p. 854.* — LE VERDIER d'Europe (277) (Male et Femelle) *Buff. pl. 267. f. 2.* — GREEN FINCH *Lath. Syn. v. 3. p. 134.*
- LOXIA RUBRA. *Mihi* — *Emberiza Zubra Gmel. Syst. 1. p. 877.* — LE GROS-BEC FOU-DIS à VENTRE GRIS d'Isle de France (795) — Moineau d'Isle de France *Buff. pl. 665.* — CRIMSON BUNTING *Lath. Syn. v. 3. p. 194.*
- LE PETIT CARDINAL ROUGE ET NOIR, OU LE CARDINALIN du (606*) Sénégal (Male) — *non décrit.*

————— PETIT GROS-BEC à COURONNE
 ET PLASTRON COULEUR DE FEU de
 (437*) Java — *non décrit.*

LOXIA GROSSA (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1.*
p. 864. — LE GROS-BEC BLEU à
 (981) BEC ROUGE d'Amérique (Male et Femelle)
 — *Buff. pl. 154.* (le Male) — WHITE
 THROATED GROSBEAK *Lath. Syn. v.*
3. p. 115.

————— LE VERDIER à VENTRE JAUNE
 d'Afrique Cap de Bonne Esperance —
 (286*) *non décrit.*

DIVISION BOUVREUIL.

LOXIA PYRRHULLA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 846. — LE BOUVREUIL d'Eu-
 (651) rope (Male et Femelle) — *Buff. pl. 145.*
 — THE BULFINCH *Lath. Syn. v. 3.*
p. 145. — *Frisch t. 2.*

LOXIA MINUTA. *Gmel. Syst. 1. p. 865.* — LE
 BOUVREUIL BEC - ROND à VENTRE
 (455) ROUX de Caijenne *Buff. pl. 319. f. 2.* —
 MINUTE GROSBEAK *Lath. Syn. v. 3.*
p. 158.

LOXIA PORTORICENSIS. (Mas) *Daudin. Ornith.*
v. 2. p. 411. — LE GRAND BOUVREUIL
 (628) FER-à-CHEVAL de Portorico (Male) *Dau-*
din. pl. 29.

LOXIA TORRIDA. *Gmel. Syst. 1. p. 854.* — LE

- BOUVREUIL BEC-BLANC de la Guiane
(353) *Buff.* 353. *Oif.* v. 5. — WHITE-BILLED
GROSBEAK *Lath. Syn.* v. 3. p. 146.

LE PETIT BOUVREUIL
GRIS du Cap de Bonne Esperance —
(331*) *non decrit.*

- LOXIA ANGOLENSIS. *Gmel. Syst.* 1. p. 853. —
LE BOUVERON à VENTRE BRUN
(484) d'Afrique. — BLACK GROSBEAK *Edw.*
t. 352. *f.* 2. — ANGOLA GROSBEAK
Lath. Syn. v. 3. p. 145.

DIVISION ANGROYAN. (*)

L'ANGROYAN GRIS de
(166*) la nouvelle Galle meridionale — *non decrit.*

L'ANGROYAN LONGI-
BANDE des iles de l'Ocean Austral. —
(1009*) *non decrit.*

DIVISION REPUBLICAIN (*).

LE REPUBLICAIN à
CAPUCHON ECARLATE d'Afrique Roi-
(702*) jaume de Congo (Male) — *non decrit.*

LE REPUBLICAIN à
VENTRE ET GORGE JAUNE d'Afri-
(754*) que Côte d'Angôle (Male) — *non decrit.*

LE REPUBLICAIN NA-
MAQUOI d'Afrique (Male) — *Vaill. roy.*
(313*) 2. p. 322. — *Paterfon trav. in Africa pl.*

GE-

GENUS EMBERIZA.

GENRE BRUANT.

- EMBERIZA ORYZIVORA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 880.* — LA GRIPENNE, OU L'OR-
 (823) TOLAN DE RIZ d'Amerique (Male) *Buff. pl. 388. f. 1.* — RICE BUNTING *Lath. Syn. v. 3. p. 188.* — *Edwards t. 291.*
- EMBERIZA CAYANEA. *Gmel. Syst. 1. p. 876.* —
 LE MINISTRE d'Amerique *Buff. p. 274.*
 (299) *Edit. folio.* — INDIGO BUNTING *Lath. Syn. v. 3. p. 205.* — *Edwards t. 273.*
- EMBERIZA SIRIS. *Gmel. Syst. 1. p. 885.* — LE
 PAPE de la Caroline *Buff. pl. 159. f. 1.* —
 (306) PAINTED BUNTING *Lath. Syn. v. 3. p. 206.* — *Edwards t. 130.*
- EMBERIZA CITRINELLA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 870.* — LE BRUANT d'Eu-
 (563) rope (Male et Femelle) *Buff. pl. 30. f. 1.* — YELLOW BUNTING *Lath. Syn. v. 3. p. 170.* — *Frisch t. 5.*
- EMBERIZA CIRLUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 879.* — LE BRUANT DE HAYE
 (565) d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 653. f. 1. et 2.* — CIRL BUNTING *Lath. Syn. v. 3. p. 190.*
- EMBERIZA MILIARIA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 879.* — LE PROYER d'Eu-
 (284) rope (Male et Femelle) *Buff. pl. 233.* — THE BUNTING *Lath. Syn. v. 3. p. 171.* — *Frisch t. 6.*

- EMBERIZA PARADISEA. *Gmel. Syst. I. p. 882.*
 — LA VEUVE à COLIER D'OR d'An-
 (274) gole *Buff. pl. 194.* — WHIDAH BUN-
 TING *Lath. Syn. v. 3. p. 178.* — *Ed-*
wards t. 86.
- EMBERIZA SERENA. *Gmel. Syst. I. p. 883.* —
 LA VEUVE DOMINICAINE d'Afrique
 (273) *Buff. pl. 8. f. 2.* — DOMINICAN BUN-
 TING *Lath. Syn. v. 3. p. 180.*
- EMBERIZA SCHÖNICLUS. (Mas et Femina)
Gmel. Syst. I. p. 881. — L'ORTOLAN
 (792) DE ROSEAUX d'Europe (Male et Femelle)
Buff. pl. 247. f. 2. (le Male) *pl. 477. f. 2.*
 (la Femelle) — REED BUNTING *Lath.*
Syn. v. 3. p. 173. — *Frisch t. 7.*
- EMBERIZA REGIA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 884.*
 — LA VEUVE à QUATRE BRINS de
 (272) la Côte d'Afrique (le Male) *Buff. pl. 8. f.*
1. — SHIFT-TAILED BUNTING
Lath. Syn. v. 3. p. 183.
- EMBERIZA LONGICAUDA (Mas) *Gmel. Syst. I.*
p. 884. — LA GRANDE VEUVE à
 (271) EPAULETTES du Cap de Bonne Espe-
 rance (Male) *Buff. pl. 635.* — ORANGE-
 SHOULDERED BUNTING *Lath. Syn. v.*
3. p. 184.
- EMBERIZA NIVALIS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 866. — L'ORTOLAN BLANC,
 (696) OU L'ORTOLAN DE NEIGE d'Europe
 (Male et Femelle) *Buff. pl. 497. f. 1.* — SNOW
 BUN-

BUNTING *Lath. Syn. v. 3. p. 161.* —
Edw. t. 126. (the Male)

EMBERIZA CIA. *Gmel. Syst. 1. p. 402.* — LE
 BRUANT, FOUON DE PRÈS D'EUROPE
 (973) *Buff. pl. 30. f. 2.* — FOOLISH BUN-
 TING *Lath. Syn. v. 3. p. 191.*

————— LE BRUANT à COLLIER OU
 BRAUNT BICOLOR (Male) de Java —
 (294*) *non décrit.*

EMBERIZA CAPENSIS. *Lath. Ind. v. 2. p. 407.*
 — L'ORTOLAN DU CAP DE BONNE
 (308) ESPERANCE *Buff. v. 5. p. 72. Edit. fo-*
lio — CAPE BUNTING *Lath. Syn. v.*
3. p. 185.

EMBERIZA QUELEA. (Mas et Femina) *Lath.*
Syn. v. 1. p. 409. — *Gmel. Syst. 1. p. 877.*
 (287) ——— LE BRUANT à BEC ROUGE du
 Sénégal ——— Moineau à bec rouge *Buff. pl.*
183. f. 2. (le Male) — BLACK-FACED
 BUNTING *v. 3. p. 192.*

EMBERIZA QUELEA. *Hornotinus* (Mas) ———
 LE BRUANT à BEC ROUGE du Sénégal
 (1033) (le Male dans son Jeun age.)

GENUS TANAGRA. GENRE TANGARA.

TANAGRA RUBRA. *Gmel. Syst. 1. p. 889.* —
 LE SCARLATE, OU LE TANGARA
 (298) DU CANADA *Buff. pl. 156. f. 1.* — *Desma-*
ret Tangaras pl. Enl. — SCARLET
 TANAGER *Lath. Syn. v. 3. p. 217.*

- TANAGRA MISSISSIPIENSIS. *Gmel. Syst. 1. p. 889.* — LE TANGARA ROUGE DU
 (139) MISSISSIPI (Male) *Buffon pl. 741.* —
Desmaret Tang. pl. Enl. — MISSISSIPI
 TANAGER *Lath. Syn. v. 3. p. 218.*
- TANAGRA JACAPA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 888.* — LE CARDINAL POUR-
 (303) PRE, OU LE TANGARA BEC-D'AR-
 GENT de Caienne (Male et Femelle) *Buff. pl. 128.* (le Male) — Ramphocèle bec-
 d'argent (Male et Femelle) *Desmaret Tang. pl. Enl.* — RED-BREASTED TANAGER
Lath. Syn. v. 3. p. 214. — *Edwards. t. 267.*
- TANAGRA [BRASILIA. *Gmel. Syst. 1. p. 888.*
 — LE TANGARA ROUGE, OU LE
 (304) CARDINAL du Mexique *Buff. pl. 127. f. 1.* — Ramphocèle Scarlate *Desmaret Tan-
 garas pl. Enl.* — BRASILIAN TANA-
 GER *Lath. Syn. v. 3. p. 215.*
- TANAGRA MAGNA. *Gmel. Syst. 1. p. 890.* —
 LE GRAND TANGARA, OU TANGARA
 (650) DES GRANDS BOIS de Caienne *Buff. pl. 205.* — GRAND TANAGER *Lath. Syn. v. 3. p. 220.*
- TANAGRA CRISTATA. *Gmel. Syst. 1. p. 898.*
 — LA HOUPETTE, OU TANGARA
 (315) HUPPÉ de la Guijane (Femelle) *Buff. pl. 7. f. 2.* — CRESTED TANAGER *Lath. Syn. v. 3. p. 221.*
- TANAGRA ATRA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 898.*
 N^p. 39. — LE TANGARA à CAMAIL, OU
 CRA-

(684) CRAVATE - NOIRE de Caienne (Male)
Buff. pl. 714. *f.* 2. — BLACK-FACED
 TANAGER *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 222. N^o.
 10.

TANAGRA EPISCOPUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p.* 896. — LE TANGARA

(305) BLEUET, OU L'EVÊQUE de Caienne
 (Male et Femelle) *Buff. pl.* 178. *fig.* 1. *et* 2.
 — *Desmaret Tang. pl. Enl.* — BISCHOP
 TANAGER *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 226.

TANAGRA GULARIS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p.* 894. — LE TANGARA ROUGE-

(805) CAPE d'Amerique (Male et Femelle) *Buff. pl.* 155. *f.* 2. — *Desmaret Tang. pl. Enl.* —
 RED HEADED TANAGER *Lath. Syn. v.*
 3. *p.* 228.

TANAGRA MEXICANA. *Gmel. Syst. I. p.* 893.

— LE TANGARA TACHETÉ, OU DIA-
 (402) BLE ENRHUMÉ de Caienne *Buff. pl.* 290.
f. 2. — BLACK AND BLUE TANA-
 GER *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 230. — *Des-*
marel Tang. pl. Enl.

TANAGRA CAYANA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.*
 892. — LE PASSEVERT, OU TAN-

(302) GARA à TÊTE ROUSSE de Caienne
 (Male) *Buff. pl.* 201. *f.* 2. *et* 290. *f.* 1. —
 RUFIOUS HEADED TANAGER *Lath.*
Syn. v. 3. *p.* 231.

TANAGRA TRICOLOR. (Mas) *Gmel. Syst. I.*
p. 891. — LE TANGARA VARIÉ à
 TÈ-

- (301) TÊTE VERTE, OU LE TRICOLOR de
Caienne *Buff. pl.* 33. *f.* 1. — GREEN-
HEADED TANAGER *Lath. Syn. v.* 3. *p.*
234. N^o. 30.
- TANAGRA TRICOLOR. (*Varietas*) — LE TAN-
GARA VARIÉ à TÊTE BLEUE, OU LE
(554) TRICOLOR de Caienne (Male) *Buff. pl.*
33. *f.* 2. — *Lath. Syn. var. A.*
- TANAGRA GYROLA. (Mas) *Gmel. Syst. i. p.* 891.
— LE TANGARA ROUVERDIN du
(346) Pérou (Male) *Buff. pl.* 133. *f.* 2. — RED-
HEADED TANAGER *Lath. Syn. v.* 3. *p.*
233. — *Edwards t.* 23.
- TANAGRA TATAO. (Mas) *Gmel. Syst. i. p.* 893.
— LE TANGARA SEPTICOLOR du
(300) Brésil (Male) *Buff. pl.* 127. *f.* 2. — PA-
RADISE TANAGER *Lath. Syn. v.* 3. *p.*
236.
- TANAGRA VIOLACEA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. i. p. 890. — LE PETIT TAN-
(360) GARA NOIR ET JAUNE, OU LE TEITÉ
du Brésil (Male et Femelle) *Buff. pl.* 114. *f.*
2. — GOLDEN TANAGER *Lath. Syn.*
v. 3. *p.* 239. — (la Femelle non decrite.)
- TANAGRA CAYANENSIS. *Gmel. Syst. i. p.*
894. — LE PETIT TANGARA NÈ-
(411) GRE de Caienne *Buff. pl.* 114. *f.* 3. —
NEGRO TANAGER *Lath. Syn. v.* 3. *p.*
240.
- TANAGRA ARTICAPILLA. *Gmel. Syst. i. p.*
899.

899. — LE TANGARA JAUNE à TÊTE
(640) NOIRE, OU LE MORDORÉ de Caijenne
Buff. pl. 809. *f.* 2. — BLACK-HEADED
TANAGER *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 224.

TANAGRA VELIA. — *Motacilla Velia Gmel.*
Syst. 1. *p.* 991. — LE TANGARA VA-
(427) RIÉ de Surinam *Desmaret Tangaras pl.*
Enl. — Le pipit varié *Buff. pl.* 669. *f.* 3.

TANAGRA NIGERRIMA. *Gmel. Syst.* 1. *p.*
899. — LE TANGARA NOIR d'Ameri-
(188) que *Buff. pl.* 179. *f.* 2. *Desm. Tang. pl.* —
GUYANA TANAGER *Lath. Syn. v.* 3. *p.*
225.

TANAGRA SILENS. *Lath. Ind. Orn. v.* 1. *p.*
432. — LE TANGARA SILENTIEUX
(637) de la Guijane (Male) *Buff. pl.* 742. —
Desmaret Tang. pl. Enl.

LE TRÈS PETIT TAN-
GARA NOIR, OU LE NEGRIN de la
(798*) Guijane (Male et Femelle) — *non décrit*
Espèce nouvelle.

LE TANGARA BLEU à
VENTRE JAUNE d'Amerique (Male) —
(604*) *Espèce nouvelle non décrite.*

LE TANGARA ISABEL-
LE de Guijane (Male et Femelle) — *non*
(994*) *décrit.*

LE TANGARA ARCHE-
VÊQUE à EPAULETTES BLEUES du
(307*) Perou (Male) — *non décrit.*

T A

- TANAGRA PUNCTATA. *Gmel. Syst. 1. p. 897.* —
 LE TANGARA SYACOU de l'Amerique
 (1051) Meridionale *Desmaret Tang. pl. Enl.* —
 Le Tangara tacheté des Indes *Buff. pl. 133.*
fig. 1. — SPOTTED TANAGER *Lath.*
Syn. v. 2. p. 228.

GENUS FRINGILLA.

GENRE PINÇON.

- FRINGILLA CRISTATA. *Gmel. Syst. 1. p. 926.*
 — LE FRIQUET à HUPPE ROUGE
 (311) de Caienne *Buff. pl. 181. f. 1.* — BLACK-
 FACED FINCH *Lath. Syn. v. 3. p. 253.*
- FRINGILLA PÉTRONIA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 919. — LE MOINEAU DE
 (838) BOIS, OU LA SOULCIE d'Europe (Male
 et Femelle) *Buff. pl. 225.* — RING SPAR-
 ROW *Lath. Syn. v. 3. p. 254.*
- FRINGILLA DOMESTICA. *Gmel. Syst. 1. p. 925.*
 — LE MOINEAU d'Europe *Buff. pl. 6. f. 1.*
 (344) — HOUSE SPARROW *Lath. Syn. v. 3.*
p. 284. — *Frisch T. 8.*
- FRINGILLA CŒLEBS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 901. — LE PINÇON (Male
 (839) et Femelle) d'Europe *Buff. pl. 54. f. 1.* —
 CHAFFINCH *Lath. Syn. v. 3. p. 257.* —
Frisch T. 1.
- FRINGILLA MONTIFRINGILLA. *Gmel. Syst. 1.*
p. 902. — LE PINÇON D'ARDENNES
 (840) d'Europe *Buff. pl. 54. f. 2.* — BRAM-
 BLING

- BLING *Lath. Syn. v. 3. p. 261.* —
Frisch T. 3.
- FRINGILLA GRANATINA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 906.* — LE GRENADIN des Côtes
 (293) d'Afrique (Male) *Buff. pl. 109. f. 3.* —
Vieillot Oif. Chant. pl. 17. — BRASILIAN
 FINCH *Lath. Syn. v. 3. p. 316.*
- FRINGILLA CARDUELIS. *Gmel. Syst. I. p. 903.*
 — LE CHARDONNERET d'Europe
 (479) *Buff. pl. 4. f. 1.* — THISTEL FINCH
Lath. Syn. v. 3. p. 281. — *Frisch T. I.*
- FRINGILLA BENGHALUS. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 920.* — LE BENGALI BLEU à
 (182) MOUSTACHES ROUGES, OU LE MARI-
 POZA d'Afrique *Buff. pl. 115. f. 1.* —
 BLUE-BELLIED FINCH *Lath. Syn. v. 3.*
p. 310. — *Edw. pl. 131.* (la Fenelle)
- FRINGILLA AMANDAVA. *Gmel. Syst. I. p. 905.* —
 LE BENGALI PICQUETÉ de Java *Buff.*
 (289) *pl. 115. f. 3.* — l'Amandava *Vieillot pl. Enl.*
 — AMANDAVA FINCH *Lath. Syn. v. 3.*
p. 311. — *Edw. pl. 355. f. 1.*
- FRINGILLA ASTRILD. *Mihi.* — Loxia Astrild
Gmel. Syst. I. p. 852. — LE SENEGA-
 (642) LI RAYÉ, OU L'ASTRILD d'Afrique *Buff.*
pl. 157. f. 2. — *Vieillot Oif. Chant. pl. 12.*
 — WAX-BILL GROSBEAK *Lath. Syn.*
v. 3. p. 152. — *Edw. pl. 179 et 354.*
- FRINGILLA SPINUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 914. — LE TARIN d'Europe (Ma-

- (861) le et Femelle) *Buff. pl.* 485. *f.* 3. — SISKIN OR ABERDEVINE *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 289.
- FRINGILLA CANNABINA. (Mas) *Gmel. Syst. I.* *p.* 916. — LA GRANDE LINOTTE
- (862) DES VIGNES d'Europe (Male) *Buff. pl.* 485. *f.* 1. — GREATER RED-HEADED LINNET *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 304. — *Frisch T.* 9.
- FRINGILLA SPINUS (Var.) (Mas) *Lath. Ind. v.* 1. *p.* 452. *B.* — LE TARIN DE LA
- (503) NOUVELLE YORK (Male) — *Buff. pl.* 292. *f.* 1. — NEW YORK SISKIN *Lath. Syn. v.* 3. *p.* 291. *var. B.*
-
- LE SENEGALI QUIN-
TICOLOR de la nouvelle Hollande. —
- (994) *Vieillot Hist. Natur. des Ois. Chanteurs p.* 15.
- FRINGILLA FRONTALIS. (Mas) *Mihi* — *Loxia Frontalis Lath. Ind. Supp. p.* XLVI.
- (499) LE SENEGALI à FRONT POINTILLÉ (Male) *Daudin. Orn. v.* 2. *p.* 445. — *Vieillot. Ois. Chants. pl.* 16. — FRONTAL GROSBKAK *Lath. Syn. Supp. v.* 2. *p.* 197.
- FRINGILLA MONTIUM (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p.* 917. — LA PETITE LINOTTE, OU LE CABARET d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.* 485. *f.* 2. — TWITE *Lath. Syn. v.* 3. 307.

FRIN-

FRINGILLA LINARIA. (Mas et Femina) *Gmel.*

Syst. 1. p. 917. — LA PETITE LI-
(1026) NOTTE DE VIGNES (Male et Femelle)
d'Europe *Buff. pl.* 151. f. 1. et 2. —
COMMON LINET *Lath. Syn.* v. 3. p. 302.
— LESSER RED-POLE *Lath. Syn.* v.
3. p. 305.

FRINGILLA MONTANA. *Gmel. Syst.* 1. p. 925. —

LE FRIQUET, OU MOINEAU DE MON-
(1027) TAGNE d'Europe *Buff. pl.* 267. f. 1. —
Mountain Sparrow *Edw. t.* 269. — TREE
SPARROW *Lath. Syn.* v. 3. p. 252. —
Frisch T. 1. — LE HAMBOUVREUX
Buffon Ois.

FRINGILLA SENEGALA. (Mas) *Gmel. Syst.* 1.

p. 909. — LE SENEGALI ROUGE d'Afri-
(291) que (Male) *Buff. pl.* 157. f. 1. — SENE-
GAL FINCH *Lath. Syn.* v. 3. p. 312.

FRINGILLA TRISTIS. (Mas) *Lath. Ind.* v. 1. p.

452. — *Gmel. Syst.* 1. p. 907. — LE
(1049) CHARDONNET JAUNE de Surinam
(Male) *Buff. pl.* 202. f. 2. — AMERI-
CAN GOLDFINCH *Lath. Syn.* v. 3. p. 288.
Edwards t. 274.

LE CAPI à CROU-
PION ROUGE d'Afrique pays des Caffres
(292*) (Male) — *non décrit Espèce nouvelle.*

LE CAPI à FRAISE
JAUNE des Iles de la mer pacifique —
(601*) *non décrit Espèce nouvelle.*

LE CAPI à GORGE

ET SOURCILS ORANGE de la Trinité
(796*) (Male et Femelle) — *non décrit* *Espèce nouvelle.*

LE BENGALI NOIR à
EPAULETTES BLANCHES du Sénégal
(211*) — *non décrit* *Espèce nouvelle.*

GENUS MUSSICAPA. GENRE GOBE-MOUCHES.

MUSSICAPA FORFICATA. *Mihi* — *Lanius*
Forficatus Gmel. Syst. 1. p. 297. — LE
(351) DRONGO HUPPÉ de Madagascar (Male)
Buff. pl. 189. — *Vaill. Ois. d'Af. v. 4.*
pl. 166. — Fork-Tailed-Shrike *Lath.*
Syn. v. 3. p. 158.

LE DRONGOLON à
QUEUE FOURCHUE du Bengale *Vaill.*
(682) *Ois. d'Af. v. 4. pl. 174.*

LE GRAND DRONGO
OU LE DRONGUP des Indes. *Vaill. Ois.*
(424) *d'Af. v. 4. pl. 173.*

L'ECHENILLEUR
GRIS d'Afrique (Male et Femelle) *Vaill. Ois.*
(43) *d'Af. v. 4. pl. 162 et 163.*

L'ECHENILLEUR
JAUNE RAYÉ d'Afrique *Vaill. Ois. d'Af.*
(45) *v. 4. pl. 164.*

L'ECHENILLEUR
LONG-BEC du Bengale — *non décrit.* —
(969*) *Genre des Echenilleurs d'Afrique.*

MUSSICAPA CRISTATA. (Mas et Femina) *Gmel.*

- Syst.* 1. p. 938. — GÔBE-MOUCHES huppé du Sénégal *Buff. pl.* 573. f. 2. — LE GÔBE-MOUCHES TCHEITREC du Cap de Bonne Espérance (Male et Femelle) *Vaill. Ois. d'Af. v.* 3. *pl.* 142. — CRESTED SENEGAL FLYCATCHER *Lath. Syn. v.* 3. p. 329.

LE GÔBE-MOUCHES MIGNARD du Cap de Bonne Espérance

- (38) *Vaill. Ois. d'Af. v.* 4. *pl.* 154.

MUSSICAPA CÆRULEA. *Gmel. Syst.* 1. p. 943.

- GÔBE-MOUCHES BLEU, OU LE PETIT AZUR des Philippines *Buff. pl.* 666. f. 1. — *Vaill. Ois. d'Af. v.* 3. *pl.* 153. — AZUR FLYCATCHER *Lath. Syn. v.* 3. p. 339.

MUSSICAPA PARADISI. (Mas et Femina) *Gmel.*

- Syst.* 1. p. 929. — LE GÔBE-MOUCHES TCHEITRECBE BLANC du Cap de Bonne Esperance *Vaill. Ois. d'Af. v.* 3. *pl.* 145. — Gobe-Mouches blanc huppé *Buff. pl.* 234. f. 2. — PARADISE FLYCATCHER *Lath. Syn. v.* 3. p. 345.

MUSSICAPA PARADISI. (Mas et Femina) (*Varietas*) — GÔBE-MOUCHES TCHEITRECBE ROUX du Cap de Bonne Esperance

- (35) (Male en Femelle) *Vaill. Ois. d'Af. v.* 3. *pl.* 144. — Gôbe-Mouches roux huppé

*Buff. pl. 234. f. 1. — Lath. Syn. v. 3.
var. A.*

LE GÔBE-MOUCHES
MANTELÉE du Cap de Bonne Esperance
(36) (Male) *Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 151.*

GÔBE - MOUCHES
BLANC à FILETS ET AILES NOIRES,
(495) OU LE NEBULEUX d'Afrique pays des
Namaquois *Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 149.*

MUSSICAPA CINNAMOMEA. *Gmel. Syst. I. p.
937. — LE TYRAN ROUX de Caienne*
(864) — CINNAMOM FLYCATCHER *Lath.
Syn. v. 3. p. 354. N^o. 56.*

LE GÔBE-MOU-
CHES SOURCILS BLANC des Iles de l'O-
(865*) cean Austral — *Espèce nouvelle non decrite.*

MUSSICAPA ERYTHROGASTRA. (Mas) *Lath.
Ind. v. 1. p. 479. — Muscicapa Multico-*
(624) *lor Gmel. Syst. I. p. 499. — LE GÔBE-*
MOUCHES à POITRINE ROUGE de l'Isle
Norfolk (Male) — RED BELLIED FLY-
CATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 343. t. 50.*

LE GÔBE -
MOUCHES BICOLOR de la nouvelle Galle
(1002*) Meridionale — *non decrit.*

LE GÔBE -
MOUCHES MILITAIRE de la nouvelle
(1010*) Zelande — *non decrit.*

MUSSICAPA FLANMEA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.
942.*

942. — LE GÔBE-MOUCHES ORAN-
 GE ET NOIR des Indes Orientales (Male)
 (21) *Sonnini Edit. de Buff. v. 14. p. 142.* —
 FLAMMEOUS FLYCATCHER *Lath. Syn.*
v. 3. p. 338.

- MUSSICAPA MUTATA (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
 930. — LE GÔBE-MOUCHES SCHET-
 ROUX *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. p. 147.* —
 (342) Gôbe-Mouches à longue queue et ventre
 blanc de Madagascar *Buff. pl. 248. f. 2.* —
 MUTABLE FLYCATCHER *Lath. Syn. v.*
3. p. 347.

- MUSSICAPA MUTATA. (Mas) *Varietas* — LE
 GÔBE-MOUCHES SCHET-BLANC de
 (350) Madagascar (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 3.*
pl. 148. — Gobe-Mouches blanc à lon-
 ga queue *Buff. pl. 248. f. 1.*

- MUSSICAPA MALABARICA. *Mihi.* — Parus
 Malabaricus *Gmel. Syst. 1. p. 1012.* —
 (42) LE GÔBE-MOUCHES ORANOR de Ceylan
Vaill. Ois. d'Af. v. 4. pl. 155. — Me-
 fange du Malabar *Sonnerat voy. ind. t. 114.*
 — Malabar Titmouse *Lath. Syn. v. 4. p. 555.*

- MUSSICAPA BORBONICA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 939. — LE GÔBE-MOUCHES
 (801) HUPPÉ D'ISLE DE FRANCE (Male et Fe-
 melle) *Buff. pl. 573. f. 1. (le Male)* —
 BOURBON FLYCATCHER *Lath. Syn. v.*
3. p. 330. N^o. 7.

- MUSSICAPA CAYANENSIS. (Mas et Femina)
 II 3 *Gmel.*

- (647) *Gmel. Syst. I. p. 937.* — LE GÔBE-MOUCHES à VENTRE JAUNE de Caienne (Male et Femelle) *Buff. pl. 569. f. 2.* (le Male) — YELLOW BELLIED FLY-CATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 359.*
- MUSSICAPA TYRANNUS. *Gmel. Syst. I. p. 931.*
 (357) — LE SAVANA, OU LE TYRAN à QUEUE FORCHUE de la Guiane (Male) *Buff. pl. 571. f. 2.* — FORK-TAILED FLYCATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 355. N^o. 19.*
- MUSSICAPA RUTICILLA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p. 935.* — LE GÔBE-MOUCHES
 (727) PETIT NOIR AUBRE d'Amerique (Male et Femelle) *Buff. pl. 566. f. 1.* (le Male) BLACK-HEADED WARBLER *Lath. Syn. v. 2. p. 427.* — *Edwards t. 80.*
-
- (719*) TRES PETIT TYRAN à HUPPE JAUNE, OU LE TYRANNIN de Caienne — *non decrit Espèce nouvelle.*
-
- (496) LE GÔBE-MOUCHES à CAPUCHON BLANC d'Afrique, pays des Houzouanas (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 4. pl. 159.*
-
- (515) LE GÔBE-MOUCHES BRIRIT d'Afrique Cap de Bonne Esperance (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 4. pl. 161.*
- MUSSICAPA GRISOLA (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p. 949.* — LE GÔBE-MOUCHES

- (683) CHES d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.* 565. f. 1. — SPOTTED FLYCATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 323.* — *Frisch T. 22.*
- MUSSICAPA ATRICAPILLA (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 935.* — LE GÔBE-MOUCHES DE LORAINÉ (Male et Femelle) *Buff. pl. 565. f. 2. et 3.* — PIED FLYCATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 324.*
-
- LE GÔBE-MOUCHES MOLENAAR d'Afrique pays Aute-
 (802) niquoi (Femelle) *Vaill. Ois. d'Af. v. 4. pl. 160. fig. 2.*
- MUSSICAPA FEROX. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 934.* — LE TYRAN à HUPPE SOUCI,
 (867) OU PETIT TYRAN de Caijenne (Male) *Buff. pl. 571. f. 1.* — TYRAN FLYCATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 357. et 358.*
- MUSSICAPA AUDAX. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 934.* — LE TYRAN TACHETÉ, OU
 (868) LE CAUDEC de Caijenne (Male) *Buff. pl. 453. f. 2.* (Gôbe-Mouches) — YELLOW CROWNED FLYCATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 358.*
- MUSSICAPA BICOLOR. (Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 946.* — LE GILLIT, OU GÔBE-MOUCHES PIE de Caijenne (Femelle) *Buff. pl. 675. f. 1.* — BLACK AND WHITE FLYCATCHER *Lath. Syn. v. 3. p. 327.*

GENUS ALAUDA.

GENRE ALOUETTE.

ALAUDA CRISTATA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.*
796. — LE COCHEVIS, OU GROSSE

(841) ALOUETTE HUPPÉE d'Europe (Male)
Buff. pl. 503. f. 1. — CRESTED LARK
Lath. Syn. v. 4. p. 389. N^o. 23.

— LA PETITE ALOUETTE
à TÊTE ROUSSE d'Afrique Cap de Bonne
(268) Espérance *Vaill. Ois. d'Afr. v. 4. pl. 199.*

ALAUDA ALPESTRIS. *Gmel. Syst. I. p. 800.* —
L'ALOUETTE à HASSE-COL NOIR *Buff.*
(779) *page 341. Edition folio.* — SHORE LARK
Lath. Syn. v. 4. p. 385.

ALAUDA NEMOROSA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 797. — L'ALOUETTE DE BOIS,
(870) OU LE LULU d'Europe (Male et Femelle)
Buff. pl. 503. f. 2. — LESSER CRES-
TED LARK *Lath. Syn. v. 4. p. 391.*

ALAUDA PRATENSIS. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 792. — LA FARLOUSE, OU
(871) L'ALOUETTE DES PRÉS (Male et Fe-
d'Europe *Buff. v. 5. pl. 660. f. 1.* — TIT-
LARK *Lath. Syn. v. 4. p. 374.* — *Frisch*
T. 16.

ALAUDA ARVENSIS. *Gmel. Syst. I. p. 791.* —
L'ALOUETTE VULGAIRE d'Europe *Buff.*
(999) *pl. 363. f. 1.* — FIELD-LARK *Lath.*
Syn. v. 4. p. 368.

ALAUDA TATARICA. *Gmel. Syst. I. p. 795.* —

LA

LA GRANDE ALOUETTE NOIRE de
(270) Tartarie *Sonnini Edit. de Buff.* — BLACK
LARK *Lath. Syn. v. 4. p. 380.*

ALAUDA MOSELLANA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 794. — LA ROUSSELINÉ, OU
(1003) L'ALOUETTE DE MARAIS D'EUROPE (Ma-
le et Femelle) *Buff. pl. 661. f. 1.* — MARSH
LARK *Lath. Syn. v. 4. p. 377.*

ALAUDA CAPENSIS (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 798.*
— L'ALOUETTE SENTINELLE D'AFRI-
(267) que (Male) *Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 195.*
— La Cravate-Jaune, ou Calandre du Cap
de B. E. *Buff. pl. 504. f. 2.* — CAPE
LARK *Lath. Syn. v. 4. p. 384.*

L'ALOUETTE STRIÉE
de la nouvelle Galle meridionale — *non*
(872*) *decrit.*

GENUS MOTACILLA, GENRE MOTACILLE.

MOTACILLA ALBA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 960.*
— LA LAVANDIÈRE D'EUROPE (Male)
(279) *Buff. pl. 652. f. 1.* — WHITE WAGTAIL
Lath. Syn. v. 4. p. 395. — *Frisch T. 23.*

LA LAVANDIÈRE PIE,
OU L'AGUIMP D'AFRIQUE pays des Nama-
(71) quois *Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 178.*

MOTACILLA CINEREA. *Gmel. Syst. 1. p. 961.*
Nº. 79. — LA BERGERONETTE GRI-
(283) SE D'EUROPE *Buff. pl. 674. f. 1.* — CI-

NEROUS WAGTAIL *Lath. Syn. v. 4. p. 397.*

MOTACILLA FLAVA. *Gmel. Syst. 1. p. 963.* —
LA BERGERONETTE DE PRINTEMPS
(842) *Buff. pl. 674. f. 2.* — YELLOW WAG-
TAIL *Lath. Syn. v. 4. p. 400.* — *Frisch*
t. 23.

MOTACILLA BOARULA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 997. — LA GRANDE BER-
(72) GERONETTE, OU LA BERGERONET-
TE JAUNE d'Europe (Male et Femelle)
Buff. pl. 28. f. 1. — GREY WAGTAIL
Lath. Syn. v. 4. p. 398.

GENUS SYLVIA.

GENRE BEC-FIN.

SYLVIA SCHOENOBANUS. *Lath. Ind. Orn. v.*
2. p. 510. — Motacilla Schoenobanus
(843) *Gmel. Syst. 1. p. 953.* — LA FAUVE-
TE DE BOIS, OU LA ROUSSETTE *Buff.*
v. 6. p. 49. Ed. folio. — RED WAR-
BLER *Lath. Syn. v. 4. p. 418.*

SYLVIA PHOENICURUS. (Mas et Femina) *Lath.*
Ind. Orn. v. 2. p. 511. — Motacilla
(844) Phoenicurus *Gmel. Syst. 1. p. 987.* —
LE ROSSIGNOL DE MURAILLE d'Eu-
rope (Male et Femelle) *Buff. pl. 351.* —
THE REDSTART *Lath. Syn. v. 4. p. 421.*

SYLVIA MAURA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 526.*
— Mo.

- Motacilla Maura *Gmel. Syst. 1. p.*
 (57) 975. — LE TRAQUET PATRE, OU
 LE MAURE du Cap de B. E. (Male) *Vaill.*
Ois. d' Af. v. 4. pl. 180. f. 1. — MOOR
 WARBLER *Lat. Syn. v. 4. p. 458. N^o. 60.*
- SYLVIA LEUCOMELA.** *Mihi* — Motacilla Leu-
 comela *Gmel. Syst. 1. p. 974. N^o. 117.* —
 (59) LE TRAQUET à TÊTE BLANCHE,
 OU LE LEUCOMÈLE de Sibérie —
 LEUCOMELE WARBLER *Lath. Syn. v.*
4. p. 456.
- SYLVIA PROTONOTARIUS.** *Lath. Ind. Orn. v.*
2. p. 542. — Motacilla Protonotarius *Gmel.*
 (723) *Syst. 1. p. 972.* — LE FIGUIER à VEN-
 TRE ET TÊTE JAUNE, OU LE PRO-
 TONOTAIRE de la Caroline *Buff. pl. 704.*
f. 2. — PROTONOTARY WARBLER
Lath. Syn. v. 4. p. 494. N^o. 128.
- SYLVIA VARIA.** *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 539.* —
 Motacilla Varia *Gmel. Syst. 1. p. 979.* —
 (175) LE FIGUIER VARIÉ de St. Domingue
Buff. page 182. v. 6. Ed. folio. — WHITE-
 POLL WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 488.*
 — *Edw. t. 300.*
- SYLVIA ÆSTIVA.** *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 551.*
 — Motacilla Æstiva *Gmel. Syst. 1. p.*
 (338) 169, — LE FIGUIER JAUNE TACHE-
 TÉ du Canada *Buff. pl. 58. f. 2.* — YEL-
 LOW-POLL WARBLER *Lath. Syn. v. 4.*
p. 515.

SYL-

- SYLVIA MADAGASCARIENSIS. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 533.* — Motacilla Madagascariensis *Gmel. Syst. 1. p. 981.* — LE FIGUIER à PAUPIÈRES BLANCHES, OU LE CHERIC du Cap de B. E. *Buff. page 161. v. 6. Edit. folio* — *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 132.* — WHITE-EYED WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 475. N^o. 91.*
- (63) SYLVIA TIPHIA. (Mas et Femina) *Mihi* — Motacilla Tiphia *Gmel. Syst. 1. p. 963.* —
- (663) LE FIGUIER QUADRICOLOR de Ceylan (Male et Femelle) *Vaill. Ois. d'Af. v. 3.* — Le Figuier verd et Jaune *Buff. v. 6. page 160. Edit. folio.* — GREEN INDIAN WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 474.* — *Edwardz t. 79. (le Male)*
- SYLVIA TROGLODYTES. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 547.* — Motacilla Troglodytes *Gmel. Syst. 1. p. 993.* — LE ROITELET TROGLODYTE d'Europe *Buff. pl. 651. f. 2.* — THE WREN *Lath. Syn. v. 4. p. 506.* — *Frisch t. 24.*
- (58) SYLVIA REGULUS. (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 508.* — Motacilla Regulus
- (669) *Gmel. Syst. 1. p. 995.* — LE ROITELET HUPPÉ, OU LE SOUCI d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 651. f. 3.* — GOLD-CRESTED WREN *Lath. Syn. v. 4. p. 508.* — *Frisch t. 24.*
- SYLVIA CAYANA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 545.* — Mo-

- *Motacilla Caijana Gmel. Syst. I. p. 990.*
 (70) — LE PIPIT BLEU de Caienne (Male)
Buff. pl. 669. — CAYENNE WARBLER
Lath. Syn. v. 4. p. 502.

- LA FAUVETTE à LONGUE-
 QUEUE, OU LE CITRIN du Cap de B.
 (62) *E. Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 127.*

- LA FAUVETTE à CUL ROUX,
 OU LE GRIGNET d'Afrique (Male)
 (61) *Vaill. Ois. d'Af. v. 3. pl. 126.*

SYLVIA SIALIS. (Mas) *Lath. Syn. v. 2. p. 446.*

- *Motacilla Sialis Gmel. Syst. I. p. 989.* —
 (77) LE ROUGE-GORGE BLEU de l'Amerique
 Septentrionale (Male) *Buff. pl. 396. f.*
I. — BLUE WARBLER *Lath. Syn. v.*
4. p. 446.

- LE TRAQUET à EPAULET-
 TES RÔSES, OU LE TRAQUET COM-
 MANDEUR d'Afrique Côte d'Angole *Vaill.*
 (788) *Ois. d'Af. v. 4. pl. 189.*

SYLVIA HORTENSIS. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v.*
2. p. 507. — *Motacilla Hortensis Gmel.*

- (67) *Syst. I. p. 955.* — LA FAUVETTE
 d'Europe (Male) *Buff. pl. 579. f. I.* —
 PETTYCHAPS *Lath. Syn. v. 4. p. 413.*

SYLVIA RUBICOLA. (Mas et Femina) *Lath. Ind.*
Orn. v. 2. p. 523. — *Motacilla Rubicola*

- (874) *Gmel. Syst. I. p. 969.* — LE TRAQUET
 (Male et Femelle) d'Europe *Buff. pl. 678.*
f. I.

- f. 1.* — STONE SMICH *Lath. Syn. v. 4. p. 448.*
- SYLVIA RUBETRA. (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 525.* — Motacilla Rubetra
 (875) *Gmel. Syst. 1. p. 967.* — LE TARRIER, OU GRAND TRAQUET d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 678. f. 2.* — WHINCHAT *Lath. Syn. v. 4. p. 454.* — *Frisch T. 22.*
- SYLVIA ŒNANTHE. (Mas et Femina) *Lath. Syn. v. 2. p. 529.* — Motacilla Œnanthe *Gmel. (876) Syst. 1. p. 966.* — LE CUL-BLANC, OU MOTTEUX (Male et Femelle) d'Europe *Buff. pl. 554. f. 1 et 2.* — WHEAT-EARE *Lath. Syn. v. 4. p. 465.*
- SYLVIA SUECIA. (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 521.* — Motacilla Suecia
 (877) *Gmel. Syst. 1. p. 989.* — LE GORGE-BLEUE d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 610. f. 1 et 2.* — BLUE-THROATED WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 444.* — *Frisch, T. 19.*
- SYLVIA MODULARIS. (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 511.* — Motacilla Modularis
 (878) — *Gmel. Syst. 1. p. 952.* — LE TRAINÉ BUISSON, OU LA FAUVETTE D'HIVER d'Europe *Buff. pl. 615. f. 1.* — HEDGED SPARROW *Lath. Syn. v. 4. p. 419.* — *Frisch T. 21.*

SYL-

SYLVIA ALPINA. (Mas et Femina) *Mihi* — Motacilla
Alpina (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 957.*

- (879) — LA FAUVETTE DES ALPES (Male et Femelle) *Buff. pl. 668. f. 2.* (le Male)
— ALPINE WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 434.*

SYLVIA ERYTHACUS. (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 513.* — Motacilla

- (880) Erythacus *Gmel. Syst. 1. p. 988.* — LE ROUGE-QUEUE des Voges (Male et Femelle) — *Buff. v. 6. p. 82. Edit. folio.*
— RED-TAIL *Lath. Syn. v. 4. p. 425.*
— *Frisch T. 20.*

SYLVIA LONGICAUDA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. 545.* — Motacilla Longicauda *Gmel. Syst.*

- (881) *I. p. 954.* — LE PETIT FIGUIER à LONGUE-QUEUE de la Chine *Sonnerat voy. v. 2. p. 206.* — *Sonnini Edit. de Buff.* — LONG-TAILED WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 501.*

-
- LE TRAQUET NOIR, OU LE MONTAGNARD d'Afrique pays des grands Namaquois *Vaill. Ois. d'Af. v. 4. pl. 184. f. 2.*

SYLVIA HOTTENTOTTA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 531.* — Motacilla Hottentotta

- (53) *Gmel. Syst. 1. p. 963.* — LE TRAQUET IMITATEUR d'Afrique Cap de Bonne Esperance (Male) *Vaill. Ois. d'Af. v. 4. pl. 181.* — Grand Motteux, ou Cul-blanc
Buff.

Buff. v. 6. p. 135. *Edit. folio.* — CAPE
WHEAT-EAR *Lath. Syn.* v. 4. p. 470.

SYLVIA ATRICAPILLA. (Mas et Femina) *Lath.*
Ind. v. 2. p. 508. — Motacilla Atricapilla

(873) *Gmel. Syst.* 1. p. 970. — LA FAUVETTE
à TÊTE NOIRE d'Europe (Male et Femelle)
Buff. pl. 580. f. et 2. — BLACKCAP *Lath.*
Syn. v. 4. p. 415. — *Frisch T.* 23.

SYLVIA CAYANOCEPHALA. *Lath. Ind.* v. 2. p.
546. — Motacilla Caijanocephala *Gmel. Syst.*

(558) 1. p. 990. — LE PETIT VERD de Caijenne
Buff. v. 6. p. 209. *Edit. folio* — BLUE-
HEADED WARBLER *Lath. Syn.* v. 4.
p. 503.

SYLVIA MALACHURA. (Mas et Femina) *Mihi* —
Musficapa Malachura *Lath. Ind. Supp.* p.

(451) *LII.* — LA FAUVETTE à QUEUE
GAZÉE des Iles l'Archipel Indien (Male et
Femelle) *Vaill. Ois. d'Af.* v. 3. pl. 130. f.
2. (le Male) — SOFT-TAILED FLY-
CATCHER *Linn. Trans.* v. 4. pl. 21. —
Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 224.

LE TRAQUET FOUR-
MILLIER d'Afrique Cap de Bonne Espe-
(54) rance (Male) *Vaill. Ois. d'Af.* v. 4. pl. 186.

LE FIGUIER GRISAL-
(800*) BIN d'Isle de France — *non decrit Espèce*
nouvelle.

SYLVIA PUSILLA (Mas et Femina) *Lath. Ind.*
(1001) *Supp.* p. *LVI.* — LE FIGUIER NAIN

de

de la nouvelle Hollande (Male et Femelle)

— DWARF WARBLER *Lath. Syn. Supp.*

v. 2. p. 251. — White pl. p. 257.

LE FIGUIER SERCLE-EN-
(996*) QUEUE de la Guijane — *non decrit.*

LE FIGUIER LANCIFER de
de la nouvelle Galle Meridionale — *non*
(997*) *decrit Epèce nouvelle.*

SYLVIA PASSERINA. (Mas et Femina) *Lath. Ind.*

v. 2. p. 508. — Motacilla Passerina Gmel.

(1019) *p. 954. — PETITE FAUVETTE ,*
OU LA PASSERINETTE d'Europe (Male
et Femelle) Buff. pl. 579. f. 2. — PAS-
SERINE WARBLER Lath. Syn v. 4. p. 414.

SYLVIA CURRUCA. (Mas et Femina) *Lath. Ind.*

v. 2. p. 509. — Motacilla Curruca Gmel.

(1020) *Syst. I. p. 954. — LA FAUVETTE*
BABILLARDE d'Europe (Male et Femelle)
Buff. pl. 580. f. 3. — BABBLING WAR-
BLER Lath. Syn. v. 4. p. 417. — Frisch
T. 21.

SYLVIA SALICARIA. (Mas et Femina) *Lath. Ind.*

v. 4. p. 516. — Motacilla Salicaria Gmel.

(1021) *Syst. I. p. 955. — LA FAUVETTE*
DE ROSEAU d'Europe (Male et Femelle)
Buff. pl. 581. f. 2. — SEDGE WAR-
BLER Lath. Syn. v. 4. p. 430.

LE GRIVETIN (Male)
d'Afrique Riviere Gamtos. — *Vaill. Ois.*

(1040) *d'Af. v. 3. pl. 118.*

- SYLVIA LUSCINIA *Lath. Ind. v. 2. p. 506.*
 Motacilla Luscinia *Gmel. Syst. 1. p. 950.*
 (1057) — LE ROSSIGNOL d'Europe *Buff. pl. 615. f. 2.* — *Frisch T. 21.* — NIGHTINGALE *Lath. Syn. v. 4. p. 408.*
- SYLVIA RUFÆ. (Mas) *Lath. Ind. v. 2. p. 516.*
 — *Muscipeta minima Frisch T. 24.* —
 (1058) LA FAUVETTE ROUSSE, OU LA PETITE ROUSSE ROLLE (Male) d'Europe *Buff. pl. 581. f. 1.* — RUFous WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 431. N^o. 22.*
- SYLVIA ARUNDINACEA. *Lath. Ind. v. 2. p. 510.*
 — *Motacilla Arundinacea Gmel. Syst. 1. p. 992.* — LA BOUSCARLE de Provence *Buff. pl. 655. f. 2.* — REED WREN *Lath. Syn. Supp. v. 1. p. 184.*
- SYLVIA FICEDULA. (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 517.* — *Motacilla Ficedula Gmel. Syst. 1. p. 956.* — *Frisch T. 22.* (Mas) — LE BECFIGUE d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 668. f. 1.* — EPI-CUREAN WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 432.*
- SYLVIA NÆVIA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 517.*
 — *Motacilla Nævia Gmel. Syst. 1. p. 957.*
 (1068) — LA FAUVETTE TACHETÉE d'Europe *Buff. pl. 581. f. 3.* — FIG-EATER *Lath. Syn. v. 4. p. 433.*

GENUS PIPRA.

GENRE MANAKIN.

- PIPRA PAREOLA. (Mas) *Gmel. Syst.* 1. p. 999. —
LE TIJE, OU GRAND MANAKIN HUP-
(43) PÉ de Caienne (Male) *Buff. pl.* 687. f. 2.
Desmaret H. N. des Manakins pl. Enl. —
BLUE BACKED MANAKIN *Lath. Syn.*
v. 4. p. 520.
- PIPRA PAREOLA. *Varietas.* (Mas) — LE TIJE,
OU GRAND MANKIN HUPPÉ (*passant*
(504) *du Jeun age à l'age fait*) (Male) — *Des-*
marel Manak. pl. Enl.
- PIPRA PAREOLA. *Hernotinus* (Mas) — LE
TIJE, OU GRAND MANANAKIN (*Dans*
(847) *son premier age*) (Male) — *non figuré.*
- PIPRA ERYTHROCEPHALA. (Mas) *Gmel. Syst.*
1. p. 1001. — LE MANAKIN à TÊTE
(296) D'OR du Brésil (Male) *Buff. pl.* 34. f. 1.
— GOLD-HEADED BLACK TITMOUS
Edw. t. 21. — *Lath. Syn.* v. 4. p. 522.
- PIPRA LEUCOCAPILLA (Mas) *Gmel. Syst.* 1. p.
1002. — LE MANAKIN à TÊTE BLAN-
(370) CHE de la Guijane (Male) *Buff. pl.* 34. f. 2.
— WHITE CAPPED MANAKIN *Lath.*
Syn. v. 4. p. 523.
- PIPRA AUREOLA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 1001. — LE MANAKIN ROUGE
(332) de Mexique (Male et Femelle) *Buff. pl.* 34.
f. 3. — RED AND BLACK MANA-
KIN *Lath. Syn.* v. 4. p. 525.

 GRAND MANAKIN TACHE-

- TÉ , OU LE COTIMANAK de Caijenne
 (46*) *non décrit Espèce nouvelle.*
- PIPRA PUNCTATA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. Supp.*
v. 2. p. LVI. — LE PETIT MANAKIN
 (964) PERLÉ des Iles de l'Océan Austral (Male)
 — SPECKLED MANAKIN *Lath. Syn.*
Sup. v. 2. p. 253. — *Nat. Misc. T. III.*
- PIPRA ALBIFRONS. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 1000.*
 — LE PLUMET-BLANC, OU LE MA-
 (494) NICUP de Caijenne (Male) *Buff. pl. 707.*
f. 1. — WHITE-FACED MANAKIN
Lath. Syn. v. 4. p. 530.
- PIPRA SERENA. *Gmel. Syst. I. p. 1002.* — LE
 MANAKIN à FRONT BLANC de Caijenne
 (50) *Buff. pl. 324. f. 2.* — WHITE-FRONT-
 TED MANAKIN *Lath. Syn. v. 4. p. 521.*
- PIPRA MANACUS. *Gmel. Syst. I. p. 1002.* —
 LE MANAKIN CASSE-NOISETTE du
 (40) Brésil (Male) *Buff. pl. 302. f. 1.* — *Ed-*
wards T. 260. f. 1. — BLACK-CAP-
 PED MANAKIN *Lath. Syn. v. 4. p. 521.*
- PIPRA ATRICAPILLA *Gmel. Syst. I. p. 1003.*
 — LE COTIMANAK GRIS à CALOTTE
 (908) NOIRE de la Guijane — Manakin Cen-
 dré *Buff. pl. 687. f. 1.* — BLACK-
 CROWNED MANAKIN *Lath. Syn. v. 4.*
p. 532.
- PIPRA FULVA. (Mas) *Mihi.* — LEMANAQUIN
 JAUNE ET NOIR, OU MANAKIN D'OR
 (297) de la Guijane (Male) *non décrit.*

GENUS PARUS.

GENRE MESANGE.

PARUS CÆRULEUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 1008.* — LA MESANGE BLEUE d'Europe (Male) *Buff. pl. 3. f. 2.* — BLUE TITMOUS *Lath. Syn. v. 4. p. 543.* — *Frisch T. 14.*

PARUS CAYANEUS. (Mas) *Mihi.* — *Motacilla Caijanea Gmel. Syst. 1. p. 991.* — LA MESANGE à FRONT ET MOUSTACHES BLEUES, OU LA MESANGE SUPERBE du Cap de Diemen (Male) — SUPERB WARBLER *Lath. Syn. v. 4. p. 501. pl. 53.*

LA MESANGE à GORGE NOIRE, OU LE GRISET d'Afrique Cap de B. E. *Vaill. Ois. d'Af. pl. 138.*

PARUS CAUDATUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 1010.* — *Frisch T. 14.* — LA MESANGE à LONGUE QUEUE (Male et Femelle) d'Europe *Buff. pl. 502. f. 3.* (le Male) — LONG-TAILED TITMOUSE *Lath. Syn. v. 4. p. 550.*

PARUS BIARNICUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 1011.* — *Frisch T. 8.* — LA MESANGE BARBUE, OU LE MOUSTACHE (Male et Femelle) d'Europe *Buff. pl. 618. f. 1. et 2.* — BEARDED TITMOUSE *Lath. Syn. v. 4. p. 552.*

PARUS MAJOR. *Gmel. Syst. 1. p. 1006.* — LA GROSSE MESANGE, OU CHARBONNIÈ-

- (859) RE d'Europe *Buff. pl. 3. f. 1.* — GREAT
TITMOUSE, OR OX-EYE *Lath. Syn. v.*
4. p. 536.
- PARUS CRISTATUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
1. p. 1005. — *Frisch T. 14.* — LA ME-
(905) SANGE HUPPÉE d'Europe (Male et Fe-
melle) *Buff. pl. 502. f. 2.* — CRESTED
TITMOUSE *Lath. Syn. v. 4. p. 545.*
- PARUS PENDULINUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
1014. — LE REMIS, OU MESANGE
(906) DE POLOGNE (Male) *Buff. pl. 618. f. 3.*
— PENDULINE TITMOUSE *Lath.*
Syn. v. 4. p. 547.
- PARUS PALUSTRIS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 1009.*
— LA MESANGE DE MARAIS, OU
(907) LA NONETTE CENDRÉE d'Europe (Ma-
le) *Buff. pl. 3. f. 3.* — MARSH TIT-
MOUSE *Lath. Syn. v. 4. p. 541.*
- PARUS ATER. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 1009.* —
LA PETITE MESANGE CHARBONNIE-
(1017) RE (Male) d'Europe *Buff. v. 6. p. 257.*
Edit. folio. — *Frisch T. 13.* — CO-
LEMOUSE *Lath. Syn. v. 4. p. 540.*

GENUS HIRUNDO. GENRE HIRONDELLE,

- HIRUNDO RUSTICA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
1015. — *Frisch T. 18.* — L'HIRON-
(808) DELLE DE CHIMINÉE, OU L'HIRON-
DELLE DOMESTIQUE (Male) *Buff. pl.*
543.

543. f. 1. — CHIMNY SWALLOW *Lath. Syn. v. 4. p. 561.*
- HIRUNDO FASCIATA. *Gmel. Syst. 1. p. 1022.*
 — L'HIRONDELLE à CINTURE BLAN-
 (240) CHE de Caienne *Buff. pl. 724. f. 2.* —
 WHITE BELLIED SWALLOW *Lath. Syn. v. 4. p. 567.*
- HIRUNDO LEUCOPTERA. *Gmel. Syst. 1. p. 1022.*
 — L'HIRONDELLE à VENTRE BLANC
 (379) de Caienne *Buff. pl. 546. f. 2.* — WHI-
 TE WINGED SWALLOW *Lath. Syn. v. 4. p. 577.*
- HIRUNDO PELASGIA. *Gmel. Syst. 1. p. 1023.* —
 L'HIRONDELLE BRUNE à CUTIPEN-
 (238) NES de la Loufiane *Buff. pl. 726. f. 2.* —
 ACULATED SWALLOW *Lath. Syn. v. 4. p. 583.*
- HIRUNDO BORBONICA. *Gmel. Syst. 1. p. 1017.*
 — L'HIRONDELLE à VENTRE TA-
 (725) CHETÉ, OU L'HIRONDELLE DES
 BLEDS d'isle de France *Buff. pl. 544. f. 2.*
 (Variété) — WHEAT SWALLOW *Lath. Syn. v. 4. p. 581.*
- HIRUNDO URBICA. *Gmel. Syst. 1. p. 1017.* —
 L'HIRONDELLE à CROUPION BLANC,
 (909) OU LE PETIT MARTINET d'Europe
Buff. pl. 542. f. 2. — THE MARTINET
Lath. Syn. v. 4. p. 564.
- HIRUNDO RIPARIA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 1019.* — L'HIRONDELLE DE

(910) RIVAGE d'Europe (Male et Femelle) *Buff.*
pl. 643. *f.* 2. — SAND MARTIN OR
 SHORE-BIRD *Lath. Syn. v.* 4. *p.* 568. —
Frisch T. 18.

HIRUNDO APUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.* 1.
p. 1020. — LE GRAND MARTINET

(911) d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.* 542. *f.*
 1. — BLACK MARTIN OR SWIFT
Lath. Syn. v. 4. *p.* 584. — *Frisch T.* 17.

HIRUNDO MELBA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
 1. *p.* 1023. — LE GRAND MARTI-

(951) NET à VENTRE BLANC d'Europe (Male
 et Femelle) *Edw. t.* 27. — *Buff. Oif.* —
 WHITE BELLIED SWIFT *Lath. Syn. v.*
 4. *p.* 586.

————— L'HIRONDELLE VERTE des
 Iles Sandwich — non decrit *Espèce nou-*
 (986*) *velle.*

GENUS CAPRIMULGUS. GENRE ENGOULE-
 VENT.

CAPRIMULGUS VIRGINIANUS. *Gmel. Syst.* 1.

(794) *p.* 1028. — L'ENGOULEVENT à GOR-
 GE BLANCHE, OU LE WHIP-POUR-
 WILL de Virginie *Buff. v.* 6. *page* 568. —
 VIRGINIAN GOATSUCKER *Lath. Syn.*
v. 4. *p.* 595.

CAPRIMULGUS EUROPÆUS. (Mas et Femina)

Gmel. Syst. 1. *p.* 1027. — L'ENGOU-
 LEVENT d'Europe (Male et Femelle) *Buff.*
pl.

- pl.* 193. — EUROPEAN GOATSUCKER
Lath. Syn. v. 4. p. 593. — Frisch T. 101.
- CAPRIMULGUS GRANDIS (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. i. p. 1029. — LE GRAND ENGOU-
(497) *LEVENT, OU GRAND IBIJAW de Cai-*
jenne (Male et Femelle) Buff. pl. 325. (le
Male) — GRAND GOATSUCKER Lath.
Syn. v. 4. p. 590.
- CAPRIMULGUS SEMITORQUATUS. *Gmel.*
Syst. i. p. 1031. — LE PETIT EN-
(603) *GOULEVENT TACHETÉ de Caijenne*
Buff. pl. 734. — WHITE-COLLARED
GOATSUCKER Lath. Syn. v. 4. p. 590.
- CAPRIMULGUS ASIATICUS. *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 588. — L'ENGOULEVENT à
(608) *COLIER d'Afrique Vaill. Ois. d' Af. v. 1.*
pl. 49. — BOMBAY GOATSUCKER Lath.
Syn. Supp. v. 2. p. 260.
-
- LE MOYEN EN-
GOULEVENT GRIVELÉ de la Guijane —
(621*) *non décrit.*
-
- LE PETIT EN-
GOULEVENT, OU L'ENGOULEVENT
(709*) *PIGNÉ de la Guijane — non décrit Es-*
pèce nouvelle.
- CAPRIMULGUS CAYANENSIS. *Gmel. Syst. i.*
p. 1031. — L'ENGOULEVENT VARIÉ
(65) *à QUEUE BLANCHE de Caijenne Buff. pl.*
760. — WHITE NECKED GOATSUC-
KER Lath. Syn. v. 4. p. 599.

- CAPRIMULGUS MEGACEPHALUS. (Mas) *Lath. Ind. Orn. Supp. page LVIII.* — LE GRAND ENGOULEVENT à GROSSE TÊTE, OU LE BENIT de la nouvelle Hollande (Male) — GREAT-HEADED GOATSUCKER *Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 263.*

GENUS MENURA.

GENRE MENURA.

- MENURA NOVÆ HOLLANDIÆ. (Mas et Femina) *Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. LXI.* — (255) LE MENURA à QUEUE EN LYRE, OU LE PARKINSON (Male et Femelle) de la nouvelle Hollande *Audebert Oif. Dorés pl. 14. à la suite des Oiseaux de Paradis* — NEW HOLLAND MENURA *Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 271. pl. 136.*

GENUS COLUMBA.

GENRE PIGEON.

- COLUMBA CORONATA. *Gmel. Syst. 1. p. 774.* — (626) LE GRAND PIGEON COURONNÉ, OU LE GOURA des Iles de l'Océan Indien *Buff. pl. 118.* — GREAT CROWNED PIGEON *Lath. Syn. v. 4. p. 620.* — *Edwards t. 338.*
- COLUMBA NICOBARICA (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 783.* — LE PIGEON RAMIER DE NICOBARE (Male) *Buff. pl. 491.* — NICOBAR PIGEON *Lath. Syn. v. 4. p. 642. N^o. 38.* — *Edwards t. 339.*

Co-

- COLUMBA PALUMBUS. *Gmel. Syst. 1. p. 776.* — *Frisch T. 138.* — LE PIGEON RAMIER
 (858) d'Europe *Buff. pl. 316.* — RING PIGEON
Lath. Syn. v. 4. p. 635.
- COLUMBA ÆNEA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 780.*
 — LE PIGEON RAMIER DES MOLU-
 (478) QUES (Male) *Buff. pl. 164.* — Le pigeon
 cuivré mangeur de Muscade *Sonnerat voy.*
pl. 102. — NUTMEG PIGEON *Lath.*
Syn. v. 4. p. 636. N^o. 30.
- COLUMBA CHALCOPTERA. (Mas) *Lath. Ind.*
Orn. v. 2. p. 604. — LE PIGEON RA-
 (490) MIER à AILES DORÉES, OU LE GOA-
 GANG des Iles Norfolk (Male) *Sonnini Edit.*
de Buff. v. 7. p. 309. — BRONZE WIN-
 GED PIGEON *Lath. Syn. to Supp. v. 2.*
p. 266.
- COLUMBA RUBRICAPILLA. *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 599. N^o. 19. — LE PIGEON
 (465) VIOLET à TÊTE ROUGE d'Antigue (Ma-
 le) *Sonnini Edit. de Buff. v. 7. p. 261.* —
Sonnerat voy. p. 112. pl. 67. — RED CROW-
 NED PIGEON *Lath. Syn. v. 4. p. 628.*
- COLUMBA SPECIOSA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 783. — LE PIGEON RAMI-
 (327) RET à COU ET POITRINE ECAILLÉE
 de Caijenne (Male et Femelle) *Buff. pl. 213.*
 — SCALLOP-NECKED PIGEON *Lath.*
Syn. v. 4. p. 643.

C o-

- COLUMBA AROMATICA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 778. — LE PIGEON VERD
- (323) D'ANBOINE (Male et Femelle) *Buff. pl.*
 163. (la Femelle) — AROMATIC PI-
 GEON *Lath. Syn.* v. 4. p. 631. N^o. 21.
- COLUMBA AROMATICA. *Varietas* (Mas) —
 LE PIGEON BRUN D'ANBOINE (Male)
- (161) — *Variété du Pigeon verd.*
- COLUMBA JAVANICA. *Gmel. Syst.* I. p. }
 781. N^o. 55. } LE
- COLUMBA INDICA. *Gmel. Syst.* I. p. 785. }
 N^o. 29. }
- TURVERT, OU TOURTERELLE VER-
 TE DORÉE des Indes *Buff. pl.* 177. —
 GREEN-WINGED PIGEON *Lath. Syn.*
 v. 4. p. 625. — *Edwards t.* 14.
- (329)
- COLUMBA GUINEA. *Gmel. Syst.* I. p. 774. —
 LE PIGEON RAMIER ROUX à TACHES
- (620) TRIANGULAIRES d'Afrique. *Edwards t.*
 75. — Tourterelle du Cap de Bonne Es-
 perance *Sonnerat voy.* v. 2. p. 179. —
 TRIANGULAR SPOTTED PIGEON *Lath.*
Syn. v. 4. p. 639.
- COLUMBA TURTUR. *Gmel. Syst.* I. p. 786. —
 LA TOURTERELLE d'Europe *Buff. pl.*
- (912) 394. — COMMON TURTLE *Lath.*
Syn. v. 4. p. 644. — *Frisch T.* 140.
- COLUMBA RISORIA. *Gmel. Syst.* I. p. 787. —
 LE TOURTERELLE à COLLIER d'Eu-

- (913) ropé *Buff. pl.* 244. — COLLARED
TURTLE *Lath. Syn. v.* 4. *p.* 648. —
Frisch T. 14.

- LA TOURTERELLE à NU-
QUE MOUCHETÉE de la Chine. —
(320) Tourterelle grise de la Chine *Sonnerat voy. v.*
2. *pl.* 102. *p.* 176. — CHINESE GREY
TURTLE *Lath. Syn. v.* 4. *p.* 649.

- COLUMBA CRUENTA. *Gmel. Syst. i.* *p.* 785. —
LA TOURTERELLE GRISE ENSAN-
(318) GLANTÉE de Ceylan *Sonnerat voy. v.* 2.
p. 52. *pl.* 21. — RED BREASTED
TURTLE *Lath. Syn. v.* 4. *p.* 657.

- COLUMBA CAYANOCEPHALA. (Mas) *Gmel. Syst.*
1. *p.* 781. — LA TOURTERELLE à
(656) CRAVATTE, de la Jamaïque (Male) *Buff. pl.*
174. — BLUE HEADED TURTLE *Lath.*
Syn. v. 4. *p.* 651.

- COLUMBA CAROLINENSIS (Mas et Femina) }
Gmel. Syst. i. p. 789. *Nº.* 37. }
COLUMBA CANADENSIS. *Gmel. Syst. i. p.* } LA
785. *Nº.* 30. }

- (491) TOURTE, OU TOURTERELLE à LON-
GUE-QUEUE de l'Amérique Septentrionale
(Male et Femelle) *Buff. pl.* 175 (la Femelle)
— CAROLINE TURTLE *Lath. Syn.*
v. 4. *p.* 663. *Nº.* 62.

- COLUMBA CAPENSIS. *Gmel. Syst. i. p.* 790. — LA
TOURTELETTE, OU TOURTERELLE
à CRA-

- (326) à CRAVATTE NOIRE d'Afrique *Buff. pl.*
140. — CAPE TURTLE *Lath. Syn. v.*
4. p. 666.

LE PIGEON RAMIER
BLEU à NUQUE ECAILLÉE de la Tri-
(750*) nité — *non décrit.*

LE PIGEON RAMIER
ECAILLÉ, OU LE RAMMERON d'Afri-
(526*) que pays Auteniquoi (Male) — *non décrit.*

LE PIGEON à CINTURON
NOIR des Iles de l'Océan Indien — *non*
(470*) *decrit.*

LE PIGEON à FRONT-
NUE ET EPAULETTES VIOLETTES
(776*) d'Afrique Côte d'Angôle — *non décrit*
Espèce nouvelle.

COLUMBA AFRA (Mas) *Gmel. Syst. i. p. 786.*

— LA TOURTERELLE à TACHES
(634) DORÉES de la Côte d'Angôle (Male) —
Tourterelle du Sénégal *Buff. pl. 160.* —
AFRICAN TURTLE *Lath. Syn. v. 4.*
p. 656.

COLUMBA LEUCOCAPILLA (Mas) *Mihi.* —

Columba Capite albo *Seligman Sam. Selt.*

(777) *Vög. v. i. pl. 50.* — LE PIGEON RA-
MIER à CALOTTE BLANCHE de la Tri-
nite (Male)

LA TOURTEREL-
LE VELOUTÉE des Iles Sandwich —
(956*) *non décrit Espèce nouvelle.*

— I. A

LA TOURTERELLE à CALOTTE VIOLETTE des Iles
(978*) Sandwich (Male) — *non décrit.*

LE GRAND PIGEON RAMIERECLATANT des Iles des
(659*) Amis (Male) — *non décrit.*

LE PIGEON RAMIER ARDOISÉ d'Otaïeti (Male) —
(570*) *non décrit.*

COLUMBA CAMBAYENSIS. *Gmel. Syst. 1. p. 779.* — LA TOURTERELLE GRISE
(324) DE SURATE *Sonnerat voy. v. 2. p. 180.* —
CABAYAN TURTLE *Lath. Syn. v. 4. p. 652.*

COLUMBA MALACCENSIS *Gmel. Syst. 1. p. 788.*
— LA PETITE TOURTERELLE
(322) RAYÉE de Queda *Sonnerat voy. v. 2. p. 177.*
— MALACCA TURTLE *Lath. Syn. v. 2. p. 661.*

LA PETITE TOURTERELLE VERTE à PLASTRON ROUGE de Java (Male) — *non décrit.*

COLUMBA PURPURATA. *Gmel. Syst. 1. p. 784.*
— LA TOURTERELLE à COURONNE
(472) POURPRE, OU LE KURUKURU d'Otaïeti
— PURPLE CROWNED PIGEON *Lath. Syn. v. 4. p. 626.*

COLUMBA PURPURATA. (*Varietas*) — LE
KURUKERU, OU TOURTERELLE à
COU-

(914) COURONNE POURPRE de Tongotaboo
— *Lath. Syn. v. 4. p. 626.* — *Varietas.*

————— LA TOURTERELLE
à VENTRE BLANC d'Afrique pays d'Au-
(325*) teniquoi — *non decrit.*

————— LA TOURTERELLE
POURPRÉE d'Afrique pays Auteniquoi (Ma-
(319*) le) — *non decrit.*

————— LE PIGEON CUI-
(658*) VREUX de Tongotaboo. (Male) — *non
decrit.*

COLUMBA PASSERINA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. i. p. 787.* — LA PETITE TOUR-
(915) TERELLE, OU LE COCOTZIN d'Ame-
rique (Male et Femelle) *Buff. pl. 243. f. 1.
et 2.* — GROUND DOVE *Lath. Syn.
v. 4. p. 659.*

COLUMBA MINUTA. (Femina) *Gmel. Syst. i. p.
788.* — TRÈS PETITE TOURTEREL-
(916) LE ROUSSE, OU LE TALPACOTI de
l'Amerique Meridionale (Femelle) *Brisf. v. 1.
p. 116.* — *Seligman v. 1. pl. 52.* — PASSE-
RINE TURTLE *Lath. Syn. v. 4. p. 660.*

COLUMBA MONTANA. (Mas) *Lath. Ind. Ornith.
v. 2. p. 594.* — *Gmel. Syst. i. p. 772.*
(1061) — LA TOURTERELLE à BALAFFRES
BLANCHES de la Jamaïque (Male) — Le
Pigeon roux *Brisf. Orn. v. 1. p. 131.* —
PARTRIDGE PIGEON *Lath. Syn. v. 4.
p. 615.* — *Edw. t. 119.*

Co.

COLUMBA ÆNAS. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2.*
p. 589. — Gmel. Syst. 1. p. 769. —
 (1064) *Frisch T. 139. — LE PIGEON VUL-*
 GAIRE, OU SAUVAGE d'Europe (Male)
 STOCK PIGEON, OR STOCK DOVE
Lath. Syn. v. 4. p. 604.

GENUS PAVO.

GENRE PAON.

PAVO CRISTATUS INDICUS. (Mas) *Temminck*
Gallinacés — LE PAON SAUVAGE, OU
 (660) PAON PRIMITIF des Iles de l'Archipel Indien
 (Male) *Temm. H. N. des Gall. v. 1. pl. Enl.*

GENUS GALLUS.

GENRE COQ.

GALLUS DOMESTICUS. (Mas) *Brisf. Orn. v. 1.*
— Temm. Gall. — LE COQ COM-
 (700) MUN, OU COQ à CRÊTE (Male) *Buff. pl.*
1. — Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. —
 DOMESTIC COCK *Lath. Syn. v. 4. p. 700.*

GALLUS CRISTATUS. (Mas) *Temm. Gall. —*
 LE COQ DOMESTIQUE HUPPÉ (Male)
 (952) *Buff. pl. 49. — Temm. Gall. v. 1. pl.*
Enl. — [CRESTED COCK Lath. Syn.
v. 4. p. 703.

GALLUS ECAUDATUS (*primus*) (Mas) *Temm.*
Gall. — LE COQ SANS CROUPION,
 (257) OU LE WALLIKIKILI de Ceylan (Male)

K

(Es-

(*Espèce primitive*) — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.*

GALLUS FURCATUS (Mas) *Temm. Gall.* —
LE COQ à QUEUE FOURCHUE, OU LE
(401) MALKOTORA (Male) des Iles de l'Archipel Indien (*Espèce primitive*) — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.*

GALLUS CRISPUS. (Mas) *Temm. Gall.* —
Brisf. Orn. v. 1. — LE COQ FRISÉ
(953) (Male) *Buff. Ois. v. 2.* — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — CRISPED COCK *Lath. Syn. v. 4. p. 704.*

GALLUS LANATUS. (Mas) *Temm. Gall.* —
LE COQ à DUVET du Japon (Male) *Buff.*
(1047) *Buff. pl. 98.* (la Femelle) — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — SILK COCK *Lath. Syn. v. 4. p. 708.*

DIVISION HOUPPIÈRE.

GALLUS IGNITUS. (Mas et Femina) *Temm. Gall.*
— Phasianus Ignitus *Lath. Ind. v. 2.* —
(470) LE MACARTNEY, OU HOUPPIÈRE à
CROUPION COULEUR DE FEU (Male
et Femelle) des Iles de l'Archipel Indien
Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — Le Faissant
Couleur de Feu *Sonnini Edit. de Buff. v. 6.
p. 247.* — Fire-Backed Pheasant *Embas. to
China v. 1. p. 246. pl. 13.* — *Lath. Syn.
Supp. v. 2. p. 274.*

GAL-

- GALLUS IGNITUS. (Mas) (*Varietas*) — *Temm. Gall.* — LE MACARTNEY, OU HOUPPIFÈRE à CROUPION COULEUR DE FEU (Male) (*Variété*) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.*
- (740)
- GALLUS IGNITUS. (Mas) (*Junior*) *Temm. Gall.* — LE MACARTNEY, OU HOUPPIFÈRE à CROUPION COULEUR DE FEU (*Jeune Male*) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.*
- (473)
- GENUS PHASIANUS. GENRE FAISAN.
- PHASIANUS MOMOUL. (Mas) *Temm. Gall.* — Phasianus Impejanus *Lath. Ind. Orn. v. 2.* — LE FAISAN MOMOUL de l'Indostan (Male) (*920*) *Sonnini Edit. de Buff. v. 6. p. 244.* — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — IMPEYAN PHE-SANT *Lath. Syn. Supp. v. 1. p. 208. N^o. II.*
- PHASIANUS SUPERBUS. *Gmel. Syst. 1. p. 744.* — LE FAISAN SUPERBE de la Chine (*954*) (*les deux longue plumes caudale*) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — *Sonnini v. 6. p. 242.* SUPERB PHE-SANT *Lath. Syn. v. 4. p. 709.*
- PHASIANUS COLCHICUS. (Mas et Femina) *Gmel. p. 741.* — LE FAISAN d'Europe (Male et Femelle) (*589*) *Buff. pl. 121 et 122.* — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — *Frisch T. 123.* — COMMON PHE-SANT *Lath. Syn. v. 4. p. 712.*

- PHASIANUS COLCHICUS *Varius* (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 742.* — *Frisch T. 124.* —
 (1070) LE FAISAN PANACHÉ *Variété* (Male)
Buff. Ois. v. 2. — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — VARIEGATED PHEASANT *Lath. Syn. v. 4. p. 267.*
- PHASIANUS TORQUATUS (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 742.* — LE FAISAN à COLLIER
 (376) de la Chine (Male) *Sonnini v. 6. p. 197.* —
Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — RING-PHEASANT *Lath. Syn. v. 4. p. 715. var. A.*
- PHASIANUS PICTUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 743.* — FAISAN DORÉ, OU LE
 (252) TRICOLOR HUPPÉ de la Chine (Male et Femelle) *Buff. pl. 217.* — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — PAINTED PHEASANT
Lath. Syn. v. 4. p. 717.
- PHASIANUS NYCTHEMERUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 743.* — FAISAN NOIR
 (253) ET BLANC, OU LE BICOLOR HUPPÉ de la Chine (Male et Femelle) *Buff. pl. 123 et 124.* — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — PENCILLED PHEASANT *Lath. Syn. v. 4. p. 719.*
- PHASIANUS PICTUS. (*Hijbrijdus*) (Mas) *Temm. Gall.* — LE FAISAN POURPRÉ de
 (1004) la Chine (Male) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.*

GENUS POLYPLECTRON. GENRE EPERON-
NIER.

POLYPLECTRON ARGUS. (Mas) *Temm. Gall.* —
Pavo Bicalcaratus *Gmel. Syst. 1. p. 730.* —
(384) *Lath. Ind. v. 2. p. 617.* — L'EPERON-
NIER ARGUS de la Chine (Male) *Temm.*
Gall. v. 1. pl. Enl. — l'Eperonnier *Buff.*
pl. 492. — *Edw. t. 67.* — Petit Paon
de Malacca *Sonnerat voy. v. 2. pl. 99.* —
Iris Peacock *Lath. Syn. v. 4. p. 673.*

GENUS MELEAGRIS. GENRE DINDON:

MELEAGRIS GALLOPAVO. *Gmel. Syst. 1. p.*
732. — LE DINDON DOMESTIQUE
(680) *Buff. pl. 97.* — *Temm. Gall. v. 1. pl.*
Enl. — DOMESTIC TURKEY *Lath. Syn.*
v. 4. p. 679. — *Frisch T. 122.*

GENUS ARGUS. GENRE ARGUS:

ARGUS GIGANTEUS. (Mas et Femina) *Temm.*
Gall. — Phasianus Argus *Lath. Ind. v.*
(502) *1. p. 629.* (Mas) — LE GRAND ARGUS,
OU LE LUEN des Iles de l'Archipel Indien
(Male et Femelle) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.*
— Le Luen *Buff. Ois. v. 2.* — Ar-
gus Phasant *Lath. Syn. v. 4. p. 710.*

GENUS NUMIDA.

GENRE PEINTADE.

- NUMIDA MELEAGRIS. *Gmel. Syst. 1. p. 744.* —
 LA PEINTADE à POITRINE BLEUE
 (288) d'Europe *Buff. pl. 108.* — *Temm. Gall.*
v. 1. pl. Enl. — GUINEA PINTADO
Lath. Syn. v. 4. p. 685. — *Frisch T. 126.*
- NUMIDA CRISTATA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v.*
2. p. 622. — *Pall. Spic. v. 4. p. 15. t.*
 (1071) 2. — LA PEINTADE HUPPÉE d'Afrique
 (Male) *Temm. Gall v. 1. pl. Enl.* —
 CRESTED PINTADO *Lath. Syn. v. 4. p.*
688. t. 62.

GENUS CRAX.

GENRE HOCCO.

- CRAX ALECTOR. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. } LE*
 735. *Linn. Syst. 1. p. 270.*
- CRAX MITU. *Linn. Syst. 1. p. 270.*
 HOCCO MITUPORANGA de la Guijane et
 (918) du Bresil (Male) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.*
 — Le Hocco de la Guijane *Buff. pl. 86.* —
 CRESTED CURASSOW *Lath. Syn. v. 4,*
p. 690.
- CRAX GALEATA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
624. — LE HOCCO à CASQUE de Cu-
 (645) rasfow (Male) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* —
 GALEATED CURASSOW *Lath. Supp. to*
Syn. v. 1. p. 206. N^o. 7.

CRAX

- CRAX RUBRA. (Mas) *Temm. Gall.* — *Gmel. p.*
736. — Crax Alector (Femina) *Lath.*
(336) *Ind. Orn. v. 2. p. 623.* — LE HOCCO
COXILITLI (Male) du Perou *Temm. Gall.*
v. 1. pl. Enl. — Le Hocco du Perou
Buff. pl. 125. (*Il suppose que c'est une va-*
riété) — CRESTED CURASSOW
Lath. Syn. v. 4. p. 693.
- CRAX GLOBICERA. *Gmel. Syst. 1. p. 736.* —
LE HOCCO TEUCHOLI de Surinam
(919) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — Le Hocco
de Curaçow *Brisf. Orn. v. 1. p. 300.* —
GLOBOSE CURASSOW *Lath. Syn. v. 4.*
p. 695. — *Edw. t. 295.*
- CRAX PAUXI. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 737.* —
LE HOCCO À PIERRE, OU LE PAUXI
(646) de Surinam (Male) *Temm. Gall. v. 1. pl.*
Enl. — Le pierre de Caienne *Buff. pl.*
78. — CUSHIEW CURASSOW *Lath.*
Syn. v. 4. p. 696. — *Edwards t. 295.*

GENUS PENELOPE.

GENRE PENELOPE.

- PENELOPE YACOU. (Mas et Femina) *Temminck*
Gall. — Penelope Cristata *Lath. Ind.*
(679) *Orn. v. 2. p. 619.* (Mas) — LE PENELOPE
YACOU du Bresil (Male et Femelle)
Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — Le Din-
don du Bresil *Brisf. Orn. v. 1. p. 162.* (le
Male) — l'Yacou *Buff. v. 2. p. 337.* (le
Male)

- Male) — GUAN, OR QUAN *Edw. t.*
13. — *Lath. Syn. v. 4. p. 680.*
- PENELOPE MARAIL. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v.*
2. p. 620. — *Gmel. Syst. 1. p. 734.* —
LE PENELÔPE MARAIL de la Guijane
(1072) (Male) *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — Le
Faïfan verdâtre de Caienne *Buff. pl. 338.* (la
Femelle) — MARAIL TURKEY *Lath.*
Syn. v. 4. p. 682.
- PENELOPE CUMANENSIS. (Mas) *Gmel. Syst. 1.*
p. 734. N^o. 3. — LE PENELÔPE
NOIR à HUPPE BLANCHE, OU LE ZA-
(648) ZIN de l'Orenoque (Male) *Temm. Gall. v.*
1. pl. Enl. — CUMANA CURASSOW
Lath. Supp. to Syn. v. 1. p. 205. N^o. 5. —
Yacou *Lath. Syn. v. 4. p. 681. t. 61.*
- PENELOPE MEXICANA. *Temm. Gall.* — Pha-
sianus Cristatus *Gmel. Syst. 1. p. 741.* —
(356) LE PENELÔPE HOATZIN du Mexique
Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — Le Faïfan
huppé de Caienne *Buff. pl. 337.* — Crested
Pheasant *Lath. Syn. v. 4. p. 720. t. 64.*
- PENELOPE MOTMOT. *Temm. Gall.* — Phasia-
nus Motmot *Gmel. Syst. 1. p. 740.* —
(571) LE PENELÔPE KATRACA de la Guijane
Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — Le Faïfan
de la Guijane, ou le Katraca *Buff. pl. 146.*
— Motmot Pheasant *Lath. Syn. v. 4. p. 721.*

GENUS TETRAO.

GENRE TÉTRAS.

TETRAO UROGALLUS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*

(747) *Syst.* 1. p. 746. — LE GRAND TÊTRAS d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.* 73. et 74. — *Temminck Gall. v. 1. pl. Enl.* — WOOD GROUS *Lath. Syn. v. 4. p.* 729. — *Frisch T.* 107.

TETRAO TETRIX. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*

(748) *Syst.* 1. p. 748. — LE COQ DE BRUYÈRE à QUEUE FORCHUE, OU PETIT TÊTRAS d'Europe (Male et Femelle) *Buff.* 172. et 173. — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — BLACK GROUS *Lath. Syn. v. 4. p.* 733. N^o. 3. — *Frisch T.* 109.

TETRAO UMBELLUS. *Gmel. Syst.* 1. p. 752. }
N^o. 6.

TETRAO TOGATUS. *Gmel. Syst.* 1. p. 752. } LA
N^o. 8.

(446) GRANDE GELINOTTE PANACHÉE du Canada *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — LA Grosfe Gelinotte du Canada *Buff. pl.* 104. — SHOULDER-KNOT GROUS *Lath. Syn. v. 4. p.* 737.

TETRAO BONASIA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*

(746) *Syst.* 1. p. 753. — LA GELINOTTE d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.* 474. et 475. — *Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.* — HAZEL GROUS *Lath. Syn. v. 4. p.* 744.

- TETRAO LAGOPUS. *Gmel. Syst. I. p. 749.* —
 LE LAGOPÈDE d'Europe *Buff. pl. 129.* —
 (431) *Temm. Gall. v. I. pl. Enl.* (en habit d'hiver)
 — PTARMIGAN GROUS *Lath. Syn. v. 4. p. 741.*
- TETRAO LAGOPUS. (*Varietas*) — LE LAGO-
 PÈDE (plumage d'été) *Buff. pl. 494.* —
 (444) *Temm. Gall. v. I. pl. Enl.*
- TETRAO ALCHATA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p. 754.* — LE GANGA, OU GÉLI-
 NOTTE DES PYRENNÉES (Male et Fe-
 melle) *Buff. pl. 105. et 106.* — *Temm. Gall. v. I. pl. Enl.* — PINTAILED
 GROUS *Lath. Syn. v. 4. p. 748.* —
Edw. t. 249.
- TETRAO NAMAQUA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p. 754.* — LE GANGA à CINTU-
 (262) RON BLANC d'Afrique pays de Namaquois
 (Male et Femelle) *Temm. Gall. v. I. pl. Enl.*
 — Gelinotte des Namaquois *Sonnini Edit. de Buff. v. 6. p. 80.* — NAMAQUA
 GROUS *Lath. Syn. v. 4. p. 750. N^o. 15.*
- TETRAO BICINCTUS. (Mas et Femina) *Temm. Gall.* — LA GÉLINOTTE à DOUBLE
 (263) COLLIER, OU LE BIBANDE d'Afrique
 (Male et Femelle) *Temm. Gall. v. I. pl. Enl.*
- TETRAO UNICINCTUS. (Mas) *Temm. Gall.* —
 LA GÉLINOTTE à COLIER NOIR, OU
 (609) L'UNIBANDE d'Afrique deserts du Zahara
 (Male) *Temm. Gall. v. I. pl. Enl.*

GE-

GENUS PERDIX.

GENRE PERDRIX.

- PERDIX SAXATILIS. *Meyer Deutsche Ornith. pl. Enl.* — Perdrix Rufa *Lath. Ind. Orn. v.*
 (649) *2. p. 647.* — Tetrao Rufus *Gmel. Syst. 1. p. 756.* — LA BARTAVELLE, OU
 PERDRIX GRÈQUE d'Europe *Buff. pl. 231.* — *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* —
 GREEK PARTRIDGE *Lath. Syn. v. 4. p. 767.*
- PERDIX RUBRA. *Brisf. Orn. v. 1. p. 236.* —
 LA PERDRIX ROUGE d'Europe *Buff. pl.*
 (598) *150.* — *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* —
 GUERNSEY PARTRIDGE *Lath. Syn. v. 4. p. 768. var. A.*
- PERDIX BARBARICA. *Temm. Gall.* — Per-
 dix rubra Barbarica *Brisf. Orn. v. 1. p.*
 (653) *239.* — LA PERDRIX BARBARES-
 QUE *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* — Per-
 drix rouge de Barbarie *Buff. Ois. v. 2. Edit.*
folio. — BARBARY PARTRIDGE *Lath.*
Syn. v. 4. p. 770. var. B. — *Edw. t. 70.*
- PERDIX CINEREA (Mas et Femina) *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 645. — LA PERDRIX GRISE
 (710) d'Europe (Male et Femelle) *Temm. Gall. v.*
2. pl. Enl. — *Buff. pl. 27.* (la Femelle)
 — COMMON PARTRIDGE *Lath. Syn.*
v. 4. p. 762. — *Frisch T. 114.*
- PERDIX MONTANA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
 646.

646. — Tetrao Montanus *Gmel. Syst.*
 (745) 1. p. 758. — LA PERDRIX DE MONTAGNE d'Europe *Buff. pl.* 136. — *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* — MOUNTAIN PARTRIDGE *Lath. Syn. v. 4. p. 765.* — *Frisch T.* 114.
- PERDIX CINEREA. (alba) *Brisf. Orn. v. 1. p.* 223. *var. A.* — LA PERDRIX GRISE-BLANCHE d'Europe (Male) *Buff. p.* 426. *Edit. folio* — *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* — *Frisch T.* 115. — *Lath. Syn. v. 4. p. 763. var. A.*
- PERDIX DAMASCENA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.* 646. — LA PETITE PERDRIX DE (1062) PASSAGE d'Europe *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* — La petite Perdrix grise *Buff. Ois. v. 2.* — DAMASCUS PARTRIDGE *Lath. Syn. v. 4. p. 764.*
- PERDIX CORONATA. (Mas et Femina) *Lath. Supp. Ind. Orn. v. 2. p. LXII.* — Columba Cristata *Gmel. p. 774.* (Mas) — Tetrao viridis *Gmel. p. 761.* (Femina) — LA PERDRIX à HUPPE DE CRAIN, OU LE ROULOUL des Iles de l'Archipel Indien (Male et Femelle) — *Sonnerat voy. Ind. v. 2. pl. 100. p. 174.* (le Male) — *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* — Lesser Crowned Pigeon *Lath. v. 4. p. 622.* (Mas) — Green Partridge *Lath. v. 4. p. 777.* (Femina)
- PER-

- PERDIX MACRORHYNCHA. *Temm. Gall.* — LA
 PERDRIX GROS-BEC d'Amerique *Temm.*
 (264) *Gall. v. 2. pl. Enl.*
- PERDIX FASCIATA. *Temm. Gall.* — LA PER-
 DRIX BANDÉE d'Isle de France (Male)
 (783) *Tmm. Gall. v. 2. pl. Enl.*
- PERDIX GYMNOPHTHALMOS. *Temm. Gall.* —
 LA PERDRIX JOUE NUE de Ternate
 (251) *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.*
- PERDIX TORQUATA. (Mas) *Temm. Gall.* —
 LA PERDRIX HAUSSE-COL des Iles de
 (1013) l'Archipel Indien (Male) *Temm. Gall. v. 2.*
pl. Enl.
- PERDIX AURITA. *Temm. Gall.* — LA PER-
 DRIX OREILLARDE d'Afrique Côte du
 (1036) Sénégal *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.*

DIVISION FRANCOLIN.

- PERDIX FRANCOLINUS. (Mas et Femina) *Lath.*
Ind. Orn. v. 2. p. 644. — Tetrao Franço-
 (247) linus *Gmel. Syst. 1. p. 756.* — LE FRAN-
 COLIN d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.*
147 et 148. — *Temm. Gall. v. 2. pl.*
Enl. — FRANCOLIN PARTRIDGE
Lath. Syn. v. 4. p. 759.
- PERDIX NUDICOLLIS. (Mas et Femina) *Lath.*
Ind. Orn. v. 2. p. 644. — Tetrao Nudi-
 (258) collis *Gmel. p. 759.* — LE FRANCOLIN
 GORGE-NUE d'Afrique (Male et Femelle)
Temm.

Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — Buff. pl. 180:
 (le Male) — BARE-NECKED PAR-
 TRIDGE *Lath. Syn. v. 4. p. 759.*

PERDIX CEYLONENSIS. (Mas) *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 644. — Tetrao Ceylonensis Gmel.

(260) *p. 759. — LE FRANCOLIN HABAN-*
KUKELLA de Ceylan (Male) Temm. Gall.
v. 2. pl. Enl. — CEYLON PARTRID-
GE Lath. Syn. v. 4. p. 758.

PERDIX PERLATA. *Temm. Gall. — Lath. Ind.*
v. 2. p. 648. — Tetrao Madagascariensis
Gmel. p. 756. — Tetrao Perlatus Gmel.
Syst. 1. p. 758. — LE FRANCOLIN

(447) *PERLÉ, OU LE TCHE-COU de la Chine*
Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — Perdrix
Perlée Buff. p. 452. v. 2. Edit. folio —
Francolin d'Isle de France Sonnerat voy. v. 2.
p. 166. pl. 97. — PEARLED PARTRID-
GE Lath. Syn. v. 2. p. 761. — Pintado
Partridge Lath. Syn. v. 4. p. 772.

PERDIX LONGIROSTRIS (Mas) *Temm. Gall. —*
LE FRANCOLIN LONG-BEC de Sumatra
 (445) (Male) *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.*

DIVISION CAILLE.

PERDIX CRISTATA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 652.*
 — *Tetrao Cristatus Gmel. Syst. 1. p. 765.*

(655) — *LA CAILLE HUPPÉE, OU LE ZE-*
NECOLIN du Mexique Buff. pl. 126. —
Temm.

- Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* — CRESTED
QUAIL *Lath. Syn. v. 4. p. 784.*
- PERDIX COTURNIX. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
651. — Tetrao Coturnix *Gmel. p. 765:*
(749) — LA CAILLE VULGAIRE d'Europe
Buff. pl. 170. — *Temm. Gall. v. 2. pl.*
Enl. — COMMON QUAIL *Lath. Syn.*
v. 4. 779. — *Frisch t. 117.*
- PERDIX MEXICANA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. —*
Tetrao Mexicanus *Gmel. p. 762.* — LE
(654) COLENICUI de Louisiane *Buff. pl. 149.* —
Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — LOUISIA-
NA QUAIL *Lath. Syn. v. 4. p. 785.* —
Frisch T. 113.
- PERDIX AUSTRALIS. *Lath. Ind. Orn. Supp. p.*
LXII. — LA CAILLE BLANCHE-RAI
(681) des Iles de l'Ocean Austral *Temm. Gall. v. 2.*
pl. Enl. — NEW HOLLAND QUAIL
Lath. Supp. Syn. v. 2. p. 283.
- PERDIX CHINENSIS. (Mas et Femina) *Lath. Ind.*
Orn. v. 2. p. 652. (Mas) — Tetrao Chi-
(975) nensis *Gmel. p. 765.* — LA FRAISE, OU
PETITE CAILLE de la Chine (Male et
Femelle) *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* —
Buff. pl. 126. f. 2. (le Male) — *Edwards*
t. 247. (Male) — CHINESE QUAIL
Lath. Syn. v. 4. p. 783.

pedibus tridactylis. à trois doigts.

DIVISION TURNIX.

PERDIX TUTURNIX. *Temm. Gall.* — LE TUR-
TURNIX du Cap de Bonne Esperance —

(265) *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.*

PERDIX GUTTURATA. (Mas) *Temm. Gall.* —
LE TURNIX à GORGE NOIRE des Iles

(391) de l'Océan Indien (Male) *Temm. Gall. v. 2.*
pl. Enl.

PERDIX MACULATA. *Temm. Gall.* — LE TUR-
NI-ROUX des Deserts du Zahara (Male)

(625) *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.*

GENUS TINAMUS.

GENRE TINAMOU.

TINAMUS BRASILIENSIS. *Lath. Ind. Orn. v. 2.*
p. 633. — Tetrao Major *Gmel. Syst. 1.*

(261) *p. 767.* — LE GRAND TINAMOU, OU
LE MAGOUA du Bresil *Buff. pl. 476.* —
Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — GREAT
TINAMOU *Lath. Syn. v. 4. p. 724.*

TINAMUS SOUI. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 634.* —
Tetrao Soui *Gmel. Syst. 1. p. 768.* —

(41) LE TINAMOU SOUI de la Guijane *Buff. pl.*
829. — *Temm. Gall. v. 2. pl.* — LITTLE
TINAMOU *Lath. Syn. v. 4. p. 727.*

GE-

GENUS PSOPHIA.

GENRE AGAMI.

- PSOPHIA CREPITANS. *Gmel. Syst. 1. p. 720.* —
 L'AGAMI à POITRINE DORÉE d'Ame-
 (266) rique (Male) *Buff. pl. 169.* — *Temm. Gall.*
v. 2. pl. Enl. — Le Caracara des Antilles
Buff. Oif. v. 2. — GOLD BREASTED
 TRUMPETTER *Lath. Syn. v. 4. p. 793.*
t. 68.

GENUS OTIS.

GENRE OUTARDE.

- OTIS TARDA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p. 722.*
Frisch T. 106. — L'OUTARDE d'Europe
 (Male et Femelle) *Buff. pl. 245.* (le Male) —
 (691) *Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.* — GREAT
 BUSTARD *Lath. Syn. v. 4. p. 796.* —
Edwards t. 79 et 80.
- OTIS TETRAX. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1.*
p. 723. — LA PETITE OUTARDE,
 (692) OU CANNEPITIERE d'Europe (Male et
 Femelle) *Buff. pl. 25 et 10.* — *Temm.*
Gall. v. 2. pl. Enl. — LITTLE BUS-
 TARD *Lath. Syn. v. 4. p. 799.* — *Ed-*
wards t. 251.
- OTIS AFRA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1. p.*
724. — LA CANNEPITIERE à OREIL-
 (224) LES BLANCHES, OU LE CORHAN
 d'Afrique (Male et Femelle) *Temm. Gall. v.*
2. pl. Enl. — WHITE EARED BUS-

L

TARD

- TARD *Lath. Syn. v. 4. p. 802.* — Le Korhaan *Kolbe voy. en Afrique v. 2. p. 139.*
- OTIS HOUBARA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 725.*
 — L'OUTARDE à FRAISE, OU LE
 (576) HOUBARA d'Afrique deserts du Zahara
 (Male) *Buff. pag. 133. v. 2. Edit. folio* —
Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — RUFFED
 BUSTARD *Lath. Syn. v. 4. 805.*
- OTIS COERULESCENS. *Temm. Gall.* — LA CAN-
 NEPETIÈRE BLEUATRE, OU L'AR-
 (225) DOISÉE d'Afrique pays des Caffres *Temm.*
Gall. v. 2. pl. Enl. — *Sonnini Edition de*
Buffon v. 5. p. 100.

GENUS CASUARIUS.

GENRE CASOAR.

- CASUARIUS EMEU. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
 664. — Struthio Casuarius *Gmel. Syst. 1.*
 (333) *p. 726.* — LE CASOAR, OU EMEU des
 Indes Orientales *Buff. pl. 313.* — *Temm.*
Gall. v. 2. — GALEATED CASSOWA-
 RY *Lath. Syn. v. 5. p. 10. pl. 72.* —
Frisch T. 105.
- CASUARIUS NOVÆ HOLLANDIÆ. (Mas) *Lath.*
Ind. Orn. v. 2. p. 665. — LE GRAND
 (559) CASOAR de la nouvelle Hollande (Male)
Sonnini Edition de Buffon v. 4. p. 333. —
Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — NEW HOL-
 LAND CASSOWARY *Lath. Supp. to Syn.*
v. 2. p. 290. — *White's Journ. p. 129.*
 AVES

AVÈS AQUATICÆ. OISEAUX D'EAU.

GENUS PLATALEA. GENRE SPATULE.

PLATALEA LEUCORODIA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 667.* — *Gmel. p. 613.* —

(826) LA SPATULE BLANCHE d'Europe (Male) *Buff. pl. 405.* — WHITE SPOONBILL *Lath. Syn. v. 5. p. 13.*

PLATALEA AJAJA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 668.* — *Gmel. p. 614.* — LA SPA-

(516) TULE COULEUR DE ROSE de l'Amerique Septentrionale (Male) *Buff. pl. 165.* — ROSEATED SPOONBILL *Lath. Syn. v. 5. p. 16.*

GENUS PALAMEDEA. GENRE KAMICHY.

PALAMEDEA CORNUTA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 669.* — *Gmel. p. 615.* — LE KA-

(501) MICHY CORNU d'Amerique, Rivière Orénoque *Buff. pl. 451.* — HORNEDSCREAMER *Lath. Syn. v. 5. p. 18.*

GENUS MYCTERIA. GENRE JABIRU.

MYCTERIA AMERICANA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 670.* — *Gmel. p. 616.* — LE

(197) JABIRU BLANC d'Amerique (Male) *Buff. pl. 817.* — Le Guacu *Buff. Oiseaux* —

AMERICAN JABIRU *Lath. Syn. v. 5.*
p. 22.

GENUS CANCROMA. GENRE SAVACOU.

CANCROMA COCHLEARIA. (Femina) *Lath. Ind.*
Orn. v. 2. p. 671. — *Gmel. p. 617.* — LE
 (199) SAVACOU HUPPÉ de la Guiane (Femelle)
Buff. pl. 33. (une Femelle) — CRESTED
 BOAT-BILL *Lath. Syn. v. 5. p. 26.*
t. 76.

GENUS SCOPUS. GENRE OMBRETTE.

SCOPUS UMBRETTA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2.*
p. 672. — *Gmel. p. 618.* — L'OMBRETTE
 (200) HUPPÉE d'Afrique (Male) *Buff. pl. 796.* (la
 Femelle) — TUFTED UMBRE *Lath. Syn.*
v. 5. p. 30. t. 77.

GENUS ARDEA. GENRE HERON.

ARDEA PAVONIA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 619. — L'OISEAU ROYAL d'Afri-
 (186) que (Male et Femelle) *Buff. pl. 265.* (le Ma-
 le) — CROWNED AFRICAN CRANE
Edw. t. 192. — *Lath. Syn. v. 5. p. 34.*

ARDEA VIRGO. *Gmel. Syst. I. p. 619.* — LA
 DEMOISELLE DE NUMIDIE *Buff. pl.*
 (732) 241. — NUMIDIAN CRANE *Lath. Syn.*
v. 5. p. 35. — *Edw. t. 134.*

AR-

- ARDEA ANTIGONE. *Gmel. Syst. I. p. 622.* —
 LA GRANDE GRUE GRISE DES INDES
 (185) ORIENTALES *Brisf. Orn. v. 5. p. 378.* —
 GREATER INDIAN CRANE *Lath. Syn.*
v. 5. p. 38. — *Edwards t. 45.*
- ARDEA CARONCULATA (Mas) *Gmel. Syst. I.*
p. 643. — LA GRANDE GRUE à PEN-
 (184) DELOQUES d'Afrique Côte de Guiné (Male)
 — Le Heron à caioncules *Sonnini v. 21.*
p. 178. — WATTLED HERON *Lath.*
Syn. v. 5. p. 82. pl. 78.
- ARDEA LEUCOCEPHALA. *Gmel. Syst. I. p.*
642. — LA CIGOGNE VIOLETTE
 (575) de la Côte de Coromandel — Le Heron
 violet de Coromandel *Buff. pl. 906.* —
 VIOLET HERON *Lath. Syn. v. 5. p. 97.*
- ARDEA CIONIA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 622.* —
 LA CIGOGNE NOIRE ET BLANCHE
 (574) d'Europe (Male) *Buff. pl. 866.* — WHITE
 STORK *Lath. Syn. v. 5. p. 47.*
- ARDEA CAYANENSIS. *Gmel. Syst. I. 626.* —
 LE BIHOREAU BLEUATRE de Caijenne
 (400) *Buff. pl. 899.* — CAYENNE NIGHT
 HERON *Lath. Syn. v. 5. p. 56.*
- ARDEA STELLARIS. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 635.*
 — LE GRAND BUTOR d'Europe (Male)
 (198) *Buff. pl. 789.* — COMMON BITTTERN
Lath. Syn. v. 5. p. 56.
- ARDEA MAJOR. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 627.* — LE
 HERON HUPPÉ d'Europe (Male) *Buff. pl.*

- (824) 755. — CRESTED HERON *Lath. Syn.*
v. 5. p. 83.
- ARDEA PURPUREA. *Gmel. Syst.* 1. p. 626. —
LE HERON POURPRÉ d'Europe *Buff. pl.*
- (614) 788. — CRESTED PURPLE HERON
Lath. Syn. v. 5. p. 95.
- ARDEA EGRETHA. (Mas) *Gmel. Syst.* 1. p. 629.
— LA GRANDE AIGRETTE d'Amerique
- (377) (Male) *Buff. pl.* 925. — GREAT EGRET
Lath. Syn. v. 5. p. 89.
- ARDEA GRAZETTA *Gmel. Syst.* 1. p. 628. —
LA PETITE AIGRETTE d'Amerique *Buff.*
- (419) *pl.* 901. — LITTLE EGRET *Lath. Syn.*
v. 5. p. 95.
- ARDEA AGAMI. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.* 1. p.
629. — LE HERON AGAMI de Caijen-
- (143) ne (Male et Femelle) *Buff. pl.* 859 (le Male)
— AGAMI HERON *Lath. Syn.* v. 5,
p. 97.
- ARDEA NOVÆ HOLLANDIÆ. (Mas) *Lath. Ind.*
Orn. v. 2. p. 701. — LE PETIT HERON à
- (64) FACE-BLANCHE de la nouvelle Hollande
(Male) — Heron de Nouv. Holl. *Sonnini*
v. 21. p. 181. — WHITE FRONTED
HERON *Phill. voy. Bot. Bay.* p. 163.
- ARDEA GRUS. *Gmel. Syst.* 1. p. 620. — LA GRUE
VULGAIRE d'Europe *Buff. pl.* 769. —
- (825) COMMON CRANE *Lath. Syn.* v. 5. p. 40.
- ARDEA NYCTICORAX. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. 1. p. 624. — LE BIHOREAU d'Eu-

- (354) rope (Male et Femelle) *Buff.* 758 et 759. —
NIGHT HERON *Lath. Syn. v. 5. p. 52.* ;
- ARDEA SOLONIENSIS. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. i. p. 637.* — LE PETIT BUTOR
- (359) ROUX d'Amérique (Male et Femelle) *Buff.* p. 252. *Edit. folio.* — RUFFOUS BITTERN *Lath. Syn. v. 5. p. 60.*
- ARDEA VIRESCENS. *Gmel. Syst. i. p. 635.* — LE CRABIER GRIS à TÊTE ET QUEUE
- (193) VERTE de la Guijane *Buff. pl. 908.* — GREEN HERON *Lath. Syn. v. 5. p. 68.*
- ARDEA LUDOVICIANA. *Gmel. Syst. i. p. 630.* — LE CRABIER ROUX à TÊTE ET
- (369) QUEUE VERTE de Louisiane *Buff. pl. 909.* — LOUISIANE HERON *Lath. Syn. v. 5. p. 81.*
- ARDEA CALEDONIA. (Mas) *Gmel. Syst. i. p. 626.* — LE BIHOREAU CANELLE de
- (357) la nouvelle Caledonie (Male) — CALEDONIAN NIGHT HERON *Lath. Syn. v. 5. p. 55.* — *Cook's voy. v. 3. part. 2. t. 50.*
-
- LE PETIT BLONJOIS
MANTEAU NOIR de Caijenne (Male) —
- (763*) *non décrit Espèce nouvelle.*
- ARDEA MINUTA. (Mas) *Gmel. Syst. i. p. 646.* — LE BLONJOIS d'Europe (Male) *Buff. pl. (1018) 323.* — LITTLE BITTERN *Lath. Syn. v. 5. p. 65.*
- ARDEA TIGRINA. *Gmel. Syst. i. p. 638.* —

L'ONORÉ TACHETÉ de la Guiane *Buff.*
 (988) *pl.* 790. — TIGER BITTERN *Lath.*
Syn. v. 5. *p.* 63.

LE HERON BULARAGAN
 (993*) de la nouvelle Hollande — *non décrit.*

LE CRABIER NOIR à COU
 TACHETÉ du Bengale (Male et Femelle)
 (352*) — *non décrit.*

ARDEA SCOLOPACEA. *Lath. Ind. Orn.* v. 2. *p.*
 701. — *Gmel.* *p.* 647. — LE COURLAN,
 (1037) OU COURLIRI d'Amérique *Buff.* *pl.* 848.
 SCOLOPACAEUS HERON *Lath. Syn.*
 v. 5. *p.* 102.

ARDEA COMATA. (Mas) *Lath. Ind. Orn.* v. 2. *p.*
 687. — *Gmel.* *p.* 632. — LE SGUACCO,
 (192) OU LE CRABIER HUPPÉ d'Europe *Buff.*
Oif. — Crabier huppé de Mahon *Buff.*
pl. 348. — SQUACCO HERON *Lath.*
Syn. v. 5. *p.* 74.

GENUS TANTALUS.

GENRE IBIS.

TANTALUS RUBER. (Mas) *Lath. Ind. Orn.* v. 2.
p. 703. — *Gmel.* *p.* 651. — L'IBIS
 (194) ECARLATE du Brésil (Male) — le Cour-
 lis rouge *Buff.* *pl.* 81. — SCARLATE
 IBIS *Lath. Syn.* v. 5. *p.* 106.

TANTALUS ALBICOLLIS. *Lath. Ind. Orn.* v. 2.
p. 704. — *Gmel. Syst.* 1. *p.* 653. —
 (770) LE GRAND IBIS à COU BLANC de Cai-
 jen-

jenne — Courlis à Cou blanc *Buff. pl.*
976. — WHITE-NECKED IBIS *Lath.*
Syn. v. 5. p. 109.

TANTALUS CALVUS. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v.*
2. p. 709. — *Gmel. Syst. 1. p. 649.* —

(196) L'IBIS CHAUVE (Male) d'Afrique —
Le Courlis à tête nue *Buff. pl. 867.* —
BALD IBIS *Lath. Syn. v. 5. p. 116.*

TANTALUS FALCINELLUS. (Femina) *Lath. Ind.*
Orn. v. 2. p. 707. — *Gmel. Syst. 1. p. 648.*

(922) — L'IBIS BRUN VERD d'Italie (Femelle)
— Le Courlis verd *Buff. pl. 819.* —
BAY IBIS *Lath. Ind. Syn. v. 5. p. 113.*

————— L'IBIS GRIS à AI-
LES CUIVRÉES d'Afrique pays Autoniqoui.

(191*) — *non decrit Espèce nouvelle.*

GENUS NUMENIUS.

GENRE COURLIS.

NUMENIUS ARQUATA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
710. — *Scolopax Arquata Gmel. Syst. 1. p.*

(733) 655. — LE GRAND COURLIS d'Europe
Buff. pl. 818. — COMMON CURLEW
Lath. Syn. v. 5. p. 119.

NUMENIUS GUARAUNA *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
712. — *Scolopax Guarauna Gmel. Syst. 1. p.*

(195) 654. — LE GOUARONA, OU LE COUR-
LIS MARON du Brésil *Buff. v. 8. p. 390.*
BRASILIAN WHIMBREL *Lath. Syn. v.*
5. p. 125.

NUMENIUS PHŒOPUS. *Lath. Ind. v. 2. p. 711.* —
 Scolopax Phœopus *Gmel. Syst. 1. p. 657.* —
 (762) LE PETIT COURLIS, OU LE CORLIEU
 d'Europe *Buff. pl. 842.* — WHIMBREL
Lath. Syn. v. 5. p. 123.

TRÈS PETIT COURLIS,
 OU LE COCORLIS du Sénégal — non
 (923*) *decrit.*

GENUS SCOLOPAX.

GENRE BECASSE.

SCOLOPAX RUSTICOLA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
 713. — *Gmel. p. 660.* — LA BECASSE
 (827) d'Europe *Buff. pl. 885.* — WOODCOCK
Lath. v. 5. p. 129. — *Frisch T. 226.*

SCOLOPAX GALLINAGO. *Lath. Ind. v. 2. p. 715.*
 — *Gmel. p. 662.* — LA BECASSINE
 (828) d'Europe *Buff. pl. 883.* — SNIPE, OR
 SNITE *Lath. Syn. v. 5. p. 134.* — *Frisch*
T. 229.

SCOLOPAX GALLINULA. *Lath. Ind. v. 2. p. 715.*
 — *Gmel. Syst. 1. p. 662.* — LA PETITE
 (829) BECASSINE d'Europe *Buff. pl. 884.* —
 JACK-SNIPE *Lath. Syn. v. 5. p. 136.* —
 — *Frisch T. 231.*

SCOLOPAX LIMOSA. *Lath. Ind. v. 2. p. 719.* —
Gmel. p. 666. — LA GRANDE BARGE
 (615) d'Europe *Buff. pl. 874.* — JADREKA
 SNIPE *Lath. Syn. v. 5. p. 146.*

SCOLOPAX CALIDRIS. *Lath. Ind. v. p. 722.* —
 — *Gmel.*

Gmel. p. 664. — LE CHEVALIER
 (668) *AUX PIEDS ROUGES, OU LA GAMBETTE*
d'Europe Buff. pl. 845. — RED-
SHNAKE Lath. Syn. v. 5. p. 150. — Frisch
T. 240. — Albin. v. 3. pl. Enl.

SCOLOPAX MAJOR. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p.
714. — Gmel. p. 661. — LA GRANDE BE-

(1024) *CASSINE de Sibérie (Male) — Frisch T.*
228. — GREAT SNIPE Lath. Syn. v. 5.
p. 133.

GENUS TRINGA.

GENRE BÉCASSEAU.

TRINGA PUGNAX. (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn.
p. 725. — Gmel. p. 669. — Tringa Grenovi-

(830) *ensis Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 731. (Femina)*
— LE COMBATTANT, OU PAON DE
MER d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl.
305 et 306. — Frisch. T. 232 et 235.
— RUFF Lath. Syn. v. 5. p. 139.

TRINGA ARENARIA. Gmel. Syst. 1. p. 680. —

LA MAUBÈCHE SANDERLING d'Europe
 (924) *Buff. v. 8. p. 338. Edit. folio — SAN-*
DERLING Lath. Syn. v. 5. p. 197.

TRINGA HYPOLEUCOS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p.

734. — Gmel. p. 678. — LE GUIGNETTE,
 (711) *OU PETITE ALOUETTE DE MER d'Eu-*
rope Buff. pl. 850. — COMMON SAND-
PIPER Lath. Syn. p. 178.

TRINGA ALPINA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 736. —

Gmel.

- Gmel. p. 680. — LA BRUNETTE, OÙ
 (819) LE CINCLE d'Europe *Buff. pl.* 852. —
 DUNLIN *Lath. Syn. v.* 5. p. 185. —
Frisch T. 241.

LA MAUBÈCHE à POITRI-
 (239*) NE ROUSSE de la Guijane — *non décrit.*

DIVISION VANNEAU.

LE VANNEAU à QUEUE
 BLANCHE, OU VANNEAU ECHASSIER
 (592*) d'Egypte — *non décrit.*

TRINGA VANELLUS. *Gmel. Syst. i.* p. 670. —
 LE VANNEAU d'Europe (Male) *Buff. pl.*
 (677) 242. — LAPWING *Lath. Syn. v.* 5. p.
 161. — *Frisch T.* 213.

TRINGA CAYANENSIS. (Mas) *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 727. — Para Cayanensis *Gmel. Syst.*
 (765) 1. p. 706. — LE GRAND VANNEAU
 ARMÉ de Caljenne (Male) *Buff. pl.* 836. —
 CAYENNE SANDPIPER *Lath. Syn. v.*
 5. p. 164.

LE GRAND VANNEAU
 ARMÉ à LAMBEAUX ROUGES de Terna-
 (249*) te — *non décrit Espèce nouvelle.*

LE VANNEAU NAIN
 (979*) de la nouvelle Galle Meridionale — *non*
décrit Espèce nouvelle.

TRINGA HELVETICA. *Gmel. Syst. i.* p. 676.
 — I. E.

- LE VANNEAU SUISSE d'Europe
 (925) *Buff. pl.* 853. — SWISS SANDPIPER
Lath. Syn. v. 5. p. 167.

GENUS CHARADRIUS. GENRE PLUVIER.

- CHARADRIUS CORONATUS. *Gmel. Syst. 1. p.*
 691. — LE PLUVIER COURONNÉ
 (227) d'Afrique Cap de B. E. *Buff. pl.* 800. —
 WHREATED PLOVER *Lath. Syn. v. 5.*
p. 216.

- CHARADRIUS LEUCOGASTER. *Gmel. Syst. 1.*
p. 687. — LE PLUVIER à VENTRE
 (226) ET FRONT-BLANC d'Afrique pays Au-
 teniquoi — WHITE-BELLIED PLO-
 VER *Lath. Syn. v. 5. p.* 212.

- CHARADRIUS HYATICULA. *Gmel. Syst. 1. p.*
 683. — LE PETIT PLUVIER à COL-
 (1030) LIER d'Europe *Buff. pl.* 921. — RINGED
 PLOVER *Lath. Syn. v. 5. p.* 201. —
Frisch T. 214.

-
- LE PETIT PLU-
 VIER à POITRINE ROUSSE d'Afrique
 (230*) pays des Namaquois — *non décrit.*

-
- LE PETIT PLU-
 VIER à DOUBLE COLLIER d'Afrique
 (229*) pays Auteniquoi — *non décrit.*

- CHARADRIUS PLUVIALIS. (Mas) *Gmel. Syst. 1.*
p. 688. — LE PLUVIER DORÉ d'Europe
 (926) (Male) *Buff. pl.* 904. — GOLDEN, OR
 GREEN

GREEN PLOVER *Lath. Syn. v. 5. p. 193.*

— *Frisch T. 217.*

CHARADRIUS HYMANTOPUS. *Gmel. Syst. 1. p. 690.* — LE PLUVIER ECHASSE
(927) d'Europe *Buff. pl. 878.* — LONG-LEGGED PLOVER *Lath. Syn. v. 5. p. 195.*

CHARADRIUS MORINELLUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 686.* — LE PETIT PLUVIER, OU LE GUIGNARD d'Europe (Male) *Buff. pl. 832.* — DOTTEREL *Lath. Syn. v. 5. p. 208.*

CHARADRIUS SPINOSUS. *Gmel. Syst. 1. p. 690.* — LE PLUVIER ARMÉ à PLASTRON
(593) NOIR d'Afrique *Buff. pl. 801.* — BLACK-BREASTED INDIAN PLOVER *Edw. t. 47.*

CHARADRIUS CAYANUS. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 749. N^o. 25.* — LE PLUVIER
(766) ARMÉ à COLLIER NOIR de Caienne *Buff. pl. 833.* — SPUR-WINGED PLOVER *Lath. Syn. v. 5. p. 215.*

CHARADRIUS BILOBUS. *Gmel. Syst. 1. p. 691.* — LE PLUVIER à LAMBEAUX
(578) de la Côte de Malabar *Buff. pl. 880.* — WATTLED PLOVER *Lath. Syn. v. 5. p. 216.*

CHARADRIUS PLUVIALIS. (*Varius*) *Mihi* — *Charadrius Apricarius Gmel. p. 687.* — *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 742.* — LE PLUVIER DORÉ à GORGE NOIRE *Buff. Ois.* — SPOT-

TED

- TED PLOVER *Edw. t.* 140. — ALWAR-
GRIM PLOVER *Lath. Syn. v. 5. p. 198.*
- CHARADRIUS ALEXANDRINUS. *Lath. Ind.*
Orn. v. 2. p. 744. — Gmel. p. 683. — LE
(942) PLUVIER à COLLIER d'Égypte (*Il se*
trouve aussi en Europe) *Buff. pl. 920. —*
ALEXANDRINE PLOVER *Lath. Syn. v. 5.*
p. 203.
- CHARADRIUS CURONICUS. (Mas) *Lath. Ind.*
Orn. v. 2. p. 750. — Gmel. p. 692. — LE
(675) PLUVIER DE LA CURONIE (Male)
- GENUS CURSORIUS. GENRE COURE-VITE.
- CURSORIUS AFRICANUS. (Mas) *Mihi.* — LE
COURE-VITE à DOUBLE COLLIER
(228*) d'Afrique pays des Namaquois (Male) —
non décrit Espèce nouvelle.
- GENUS HÆMATOPUS. GENRE HUITERIER.
- HÆMATOPUS OSTRALEGUS. *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 752. — Gmel. Syst. 1. p. 694. —
(676) L'HUITERIER d'Europe *Buff. pl. 929. —*
SEA PIE, PIED OISTER-CATCHER
Lath. Syn. v. 5. p. 219.
- GENUS GLAREOLA. GENRE GLAREOLE.
- GLAREOLA AUSTRIACA. *Lath. Ind. Orn. v. 1.*
p. 753. — Hirundo Patrincola Gmel. Syst. 1.
p. 695.

- p. 695. — LA PERDRIX DE MER
 (231) d'Europe *Buff. pl.* 882. — AUSTRIAN
 PATRINCOLE *Lath. Syn. v. 5. p. 222.*
t. 85.

GENUS CINCLUS. GENRE MERLE D'EAU.

- CINCLUS AQUATICUS. (Mas et Femina) *Bech-*
stein Orn. Tafsch. — Turdus Cinclus *Lath.*
 (995) *Ind. Orn. v. 1. p. 343.* — LE MERLE
 D'EAU d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.*
 940. (le Male) — WATER OUZEL *Lath.*
Syn. v. 3. p. 48.

GENUS RALLUS. GENRE RALE.

- RALLUS TORQUATUS. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p.*
 714. N^o. 6. — LE TIKLIN à COL-
 (764) LIER, OU RALE à CINTURON ROUX
 des Philippines (Male) *Buff. p. 73 v. 9. Edit.*
folio — BANDED RAIL *Lath. Syn. v.*
5. p. 233. N^o. 5.
- RALLUS HELIAS. *Mihi* — Ardea Helias *Gmel.*
Syst. 1. p. 640. — LE CURALE, OU
 (421) PETIT PAON DES ROSES de Caijenne
 (Male) *Buff. pl. 782.* — CURALE
 SNIPE *Lath. Syn. v. 5. 156.*
- RALLUS CREX. *Gmel. Syst. 1. p. 711.* — LE
 RALE DE GENET, OU LE ROI DES
 (812) CAILLES d'Europe *Buff. pl. 750.* — CRA-
 KE GALLINULE *Lath. Syn. v. 5. p. 250.*
 — LE

RALLUS PUSILLUS. (Femina) *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 761. — *Gmel. Syst.* 1. p. 719. —

(1045) *Pallas Reise* v. 3. p. 700. — LE TRÈS
PETIT RALE à BEC ET PIEDS VERDS
de la Daourie (Femelle)

————— LE RALE D'EAU à GORGE
BLANCHE d'Afrique Cap de Bonne Espe-
(246*) rance — *non décrit.*

RALLUS AQUATICUS. *Gmel. Syst.* 1. p. 712. —
LE RALE D'EAU d'Europe *Buff. pl.* 749.

(1012) — THE WATER-RAIL *Lath. Syn.* v.
5. p. 227.

————— LE RALE D'EAU FAU-
(772*) VE de St. Domingue — *non décrit.*

GENUS PARRA.

GENRE JACANA.

PARRA AFRICANA. *Gmel. Syst.* 1. p. 709. —

(243) LE JACANA à GORGE BLANCHE de
Mofambique. — Le Jacana Canelle *Sonnini*
Edit. de Buff. v. 23. p. 222. — AFRICAN
JACANA *Lath. Syn.* v. 5. p. 246.

PARRA JACANA. *Gmel. Syst.* 1. p. 707. — LE
JACANA du Bresil et du Mexique *Buff. pl.*

(244) 322. — CHESNUT JACANA *Lath. Syn.*
v. 5. p. 241. — *Edw. t.* 357.

————— LE GRAND JACANA VERD
à CRÈTE, OU LE JACANA BRILLANT
(403*) de Ceylan — *non décrit* *Espèce nouvelle.*

GENUS GALLINULA. GENRE POULE D'EAU.

GALLINULA CAYANENSIS. *Lath. Ind. Orn.*

v. 2. p. 767. — *Fulica Caijanensis Gmel.*

(242) *Syst.* 1. p. 700. — LA GRANDE POULE
D'EAU ROUSSE de Caijenne *Buff. pl.* 352.

— CAYENNE GALLINULE *Lath. Syn.*
v. 5. p. 252.

GALLINULA PORPHIRIO. (Mas) *Lath. Ind. Orn.*

v. 2. p. 768. — *Fulica Porphirio Gmel. Syst.*

(627) 1. p. 699. — TALÈVE, OU LE PORPHI-
RION de Madagascar (Male) *Buff. pl.* 810.

— PURPLE GALLINULE *Lath. Syn.*
v. 5. p. 254.

GALLINULA MARTINICA. *Lath. Ind. Orn.* v.

2. p. 769. — *Fulica Martinica Gmel. Syst.*

(241) 1. p. 700. — LA PETITE POULE SUL-
TANE de Caijenne *Buff. v. 9. p. III. Edit.*
folio. — MARTINICO GALLINULE

Lath. Syn. v. 5. p. 255. *pl.* 83.

GALLINULA CHLOROPUS. (Mas) *Lath. Ind. Orn.*

v. 2. p. 770. — *Fulica Chloropus Gmel. Syst.*

(811) 1. p. 698. — LA POULE D'EAU d'Eu-
rope (Male) *Buff. pl.* 877. — COMMON

GALLINULE *Lath. Syn.* v. 5. p. 258.

GALLINULA CHLOROPUS *Africana.* — LA

POULE D'EAU à PLAQUE ROUGE d'A-

(767) frique. (*Variété de la poule d'Eau d'Eu-*
rope.)

LA TRÈS PETITE

POU

POULE D'EAU À PIEDS ROUGES, OU
(768*) LA NOIRETTE d'Afrique Côte d'Angôle
— non décrit.

GALLINULA PHŒNICURA. *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 770. — *Fulica Phœnicura Gmel.*
(390) *Syst. 1. p. 715.* — LA POULE D'EAU À
VENTRE BLANC, OU LE KARUKA
des Iles de l'Océan Indien *Sonnini Edit. de*
Buff. v. 23. p. 262. — RED-TAILED
GALLINULE *Lath. Syn. v. 5. p. 259.*

LE MAROUE-
TE PIQUETÉ d'Afrique pays Auteniquoi
(248*) (Male et Femelle) — non décrit *Espèce*
nuovelle.

GALLINULA PORZANA. *Lath. Ind. Orn. v. 2.*
p. 772. — *Rallus Porzana Gmel. Syst. 1.*
(1011) p. 712. — LE MAROQUETTE d'Europe
Buff. pl. 751. — *Frisch T. 211.* —
SPOTTED GALLINULE *Lath. Syn. v. 5.*
p. 264.

GENUS PHALAROPUS. GENRE PHALAROPE.

PHALAROPUS HYPERBOREUS. (Mas). *Lath.*
Ind. Orn. v. 2. p. 775. — *Tringa Hyper-*
(932) *borea Gmel. Syst. 1. p. 675.* — LE PHA-
LAROPE CENDRÉ des mers Australes
(Male) *Buff. pl. 766.* — RED PHALA-
ROPE *Lath. Syn. v. 5. p. 270.*

GENUS FULICA.

GENRE FOULQUE.

- FULICA ATRA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 777.* —
Gmel. Syst. 1. p. 702. — LA FOULQUE,
 (813) OU MORELLE d'Europe *Buff. pl. 197.* —
 COMMON COOT *Lath. Syn. v. 5. p. 275.* —
Frisch T. 208.

GENUS PODICEPS.

GENRE GRÈBE.

- PODICEPS CRISTATUS. (Mas et Femina) *Lath.*
Ind. Orn. v. 2. p. 780. — Colymbus Cris-
 (831) tatus *Gmel. Syst. 1. p. 589.* — LE GRÈBE
 CORNU d'Europe (Male et Femelle) *Buff.*
pl. 400. (le Male) — CRESTED GREBE
Lath. Syn. v. 5. p. 281. — *Frisch. T.*
183.

- PODICEPS SURINAMENSIS. *Mihi* — Plotus
 Surinamensis *Gmel. Syst. 1. p. 581.* — *Lath.*
 (237) *Ind. Orn. v. 2. p. 896.* — LE GRÈBE
 FOULQUE de Caienne (Male) *Buff. pl.*
893. — Surinam Darter *Lath. Syn. v. 6.*
p. 626.

-
- LE CASTAGNEUX
 à COURoux du Cap de B. E. pays Au-
 (250*) teniquoi — *non décrit.*

- PODICEPS MINOR. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
784. — Colymbus Minor *Gmel. Syst. 1. p.*
 (982) *591.* — LE GRÈBE DE RIVIÈRE,
 OU LE CASTAGNEUX d'Europe *Buff. pl.*
905.

905. — *Frisch T.* 184. — LITTLE GRE-
BE *Lath. Syn. v. 5. p. 289.*

GENUS RECURVIROSTRA. GENRE AVO-
CETTE.

RECURVIROSTRA AVOCETTA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 693.* — *Lath. Syn. v. 2. p. 786.*
(820) — L'AVOCETTE d'Europe (Male) *Buff. pl. 353.* — SCOPING AVOCET *Lath. Syn. v. 5. p. 293.*

GENUS PHOENICOPTERUS. GENRE PHOENI-
COPTÈRE.

PHOENICOPTERUS RUBER (Mas) *Gmel. Syst 1. p. 612.* — *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 788.* —
(561) LE GRAND FLAMANT, OU PHOENI-
COPTÈRE ROUGE de la Côte de Guinée
— RED FLAMINGO *Lath. Syn. v. 5. p. 299. pl. 93.* — Le Flamant *Buff. pl. 63. (un jeun oiseau)*

GENUS RHYNCHOPS. GENRE BEC EN CISEAUX.

RHYNCHOPS NIGRA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 802.*
— *Gmel. Syst. 1. p. 611.* — LE COUPEUR
(930) D'EAU, OU BEC EN CISEAUX d'Europe
Buff. pl. 357. — BLACK SKIMMER
Lath. Syn. v. 6. p. 347.

GENUS ALCA.

GENRE PINGOIN,

- ALCA ARCTICA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 549.* —
LE MACAREUX du Spitzberg (Male) *Buff.*
(597) *pl. 275.* — PUFFIN AUK *Lath. Syn. v.*
5. p. 314. — *Frisch T. 192.*
- ALCA TORDA. (Mas) *Gmel. Syst. 1. p. 551.* —
LE PINGOIN des mers du Nord (Male) *Buff.*
(934) *pl. 1003.* — RAZOR-BILL AUK *Lath.*
Syn. v. 6, p. 319.
- ALCA ALLE. *Gmel. Syst. 1. p. 554.* — LE PE-
TIT GUILLEMOT, OU COLOMBE DE
(935) GROENLANDE *Buff. pl. 917.* — LITTLE
AUK *Lath. Syn. v. 5. p. 327.* — *Edw.*
t. 91.

GENUS URIA.

GENRE GUILLEMOT.

- URIA TROILE. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 796.* —
Colymbus Troile *Gmel. Syst. 1. p. 585.* — LE
(936) GUILLEMOT des mers du Nord *Buff. pl.*
903. — FOOLISH GUILLEMOT *Lath.*
Syn. v. 6. p. 329. — *Frisch T. 185.*
- URIA TROILE. (Junior) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
797. B. — Colymbus Minor *Gmel. Syst. 1. p.*
(1039) *585.* — LE PETIT GUILLEMOT à VEN-
TRET ET COU BLANC — Le Guillemot
Jeun age — LESSER GUILLEMOT
Lath. Syn. v. 6. p. 332.

GE-

GENUS COLYMBUS. GENRE PLONGEON.

- COLYMBUS SEPTENTRIONALIS. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 586.* — LE LUMME, OU
 (233) PLONGEON à GORGE ROUGE de Sibérie (Male) *Buff. pl. 308.* — RED-THROATED DIVER *Lath. Syn. v. 6. p. 344.*
- COLYMBUS GLACIALIS. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 588.* — L'IMBRIM, OU GRAND PLONGEON des mers du Nord (Male) *Buff. pl. 952.* — NORTHERN DIVER *Lath. Syn. v. 6. p. 337.* — *Frisch T. 185.*
- COLYMBUS STELLATUS. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 587.* — LE PETIT PLONGON, OU LE CAT-MARIN d'Europe (Male) *Buff. pl. 992.* — SPECKLED DIVER, OR LOON *Lath. Syn. v. 6. p. 341.*
- COLYMBUS IMMER. *Lath. Ind. Orn v. 2. p. 800.* — *Gmel. Syst. I. p. 588.* — LE GRAND PLONGEON, OU L'IMMER d'Europe *Buff. pl. 914.* — IMMER DIVER *Lath. v. 6. p. 340.*
- COLYMBUS ARCTICUS. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 800.* — *Gmel. Syst. I. p. 587.* — (1038) LE PLONGEON à GORGE NOIRE des regions Arctiques *Brisf. Orn. v. 6. p. 115.* — Le Lumme, ou petit Plongeon de la mer du Nord *Buff. Ois. v. 9. p. 153 et 154. Edit. folio.* — BLACK-THROATED

TED DIVER *Lath. Syn. v. 6. p. 343.* —
 — *Edw. t. 146.*

GENUS STERNA. GENRE HIRONDELLE DE
 MER.

STERNA HIRUNDO. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 807.*
 — *Gmel. p. 606.* — L'HIRONDELLE DE
 (673) MER PIERRE-CARIN d'Europe *Buff. pl.*
987. — COMMON TERN *Lath. Syn.*
v. 6. p. 631.

STERNA HIRUNDO. (*Hornotinus*) — L'HI-
 RONDELLE DE MER PIERRE GAZ-
 (1053) RIN (*premier Age*).

STERNA CAYANA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 804.*
 — *Sterna Caijanensis Gmel. p. 60.* —
 (235) LA GRANDE HIRONDELLE DE MER à
 BEC JAUNE de Caienne *Buff. pl. 988.*
 — CAIJENNE TERN *Lath. Syn. v. 6.*
p. 352.

STERNA BOYSII. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 806.* —
Sterna Cantiaca Gmel. Syst. 1. p. 606. — LE
 (1029) CAUGEK, OU L'HIRONDELLE DE MER
 à BEC ET PIEDS NOIRS d'Europe —
 SANDWICH TERN *Lath. Syn. v. 6. p. 356.*

STERNA STOLIDA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 805.*
 — *Gmel. p. 605.* — LE NODDI, OU HI-
 (236) RONDELLE DE MER BRUNE de Loui-
 siane — La mouette brune *Buff. pl. 997.*
 — THI.

— THE NODDY *Lath. Syn. v. 6. p.*
354.

STERNA FISSIPES. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2.*
p. 810. — Gmel. Syst. 1. p. 610. —

(998) L'HIRONDELLE DE MER NOIRE, OU
L'EPOUVENTAIL d'Europe (Male) *Buff.*
pl. 333. — BLACK TERN Lath. Syn.
v. 6. p. 366.

STERNA MINUTA. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
809. — *Gmel. Syst. 1. p. 608. — LA*

(674) PETITE HIRONDELLE DE MER d'Eu-
rope *Buff. pl. 996. — LESSER TERN*
Lath. Syn. v. 6. p. 364.

GENUS LARUS.

GENRE GOELAND.

LARUS MARINUS. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2.*
p. 813. — Gmel. p. 598. — LE GRAND

(671) GOELAND MANTEAU NOIR d'Europe
(Male) *Buff. pl. 990. — Frisch T. 218.*
(un Jeun Oiseau) — BLACK-BACKED
GULL *Lath. Syn. v. 6. p. 371.*

LARUS NAEVIUS. (Mas) *Gmel. p. 598. — La-*
rus Naevius var. ij. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*

(695) 814. — LE GOELAND GRISARD d'Eu-
rope *Buff. pl. 266. — WAGEL GULL*
Lath. Syn. v. 6. p. 375.

LARUS NAEVIUS. (*Albidus*) (Varietas) — LE
GOELAND GRISARD BLANCHATRE

(1041) (*un Oiseau dans son extrême vieillesse*).

- LARUS GLAUCUS. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
814. (Mas)
- LARUS FUSCUS. *Lath. Ind. Orn. p. 815.* } LE
(Femina seu Junior)
- (672) GOELAND à MANTEAU BLEU d'Europe
— Le Goeland Cendré *Buff. pl. 253.* —
GLAUCOUS GULL *Lath. Syn. v. 6. p. 372.*
- LARUS GLAUCUS. (*triennis*) — Larus Argentatus
Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 814. B. — *Gmel.*
(1052) *p. 600.* — LE GOELAND à MANTEAU
BLEU (*à l'age de trois Ans après sa mue*) —
SILVERY GULL *Lath. Syn. v. 6. p. 375.*
- LARUS FLAVIPES. *Meyer Deut. Ornith.* —
LE PETIT GOELAND MANTEAU NOIR
(1043) des mers du Nord — LE GOELAND à
PIEDS JAUNES *Meyer pl. Enl.*
- LARUS FLAVIPES. (*Hornotinus*) — LE PETIT
GOELAND MANTEAU NOIR, OU LE
(1051) GOELAND à PIEDS JAUNES des Mers
du Nord — *dans son premier age.*
- LARUS CYANORHINCHUS. (Mas) *Meyer Deut.*
Ornith. — LA MOUETTE à BEC ET
(117) PIEDS BLEUS d'Europe (Male) *Meyer*
pl. Enl. — La grande Mouette Cendrée
à pieds bleus *Buff. pl. 977.*
- LARUS CYANORHINCHUS. *Albus* (Mas) *Mihi* —
Larus Eburneus *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 816.*
(1059) — LA MOUETTE à BEC ET PIEDS
BLEUS *Variété toute blanche* (Male) —
La Mouette blanche *Buff. pl. 994.* —
Ivory Gull *Lath. Syn. v. 6. p. 377.*

L A *

LARUS CYANORHINCHUS. *Annus* (Mas) —

LA MOUETTE à BEC ET PIEDS
(1063) BLEUS *passant du Jeun age à l'age fait*
(Male)

LARUS TRYDACTYLUS. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*

817. — *Larus Ristà Gmel. p. 594.* — LA
(980) MOUETTE à TROIS DOIGTS, OU LE
KUTGEGHEF d'Europe — Mouette Cen-
drée tachetée *Buff. pl. 387.* — Tarrock
Gull (*young bird*) — KITTIWAKE GULL
Lath. Syn. v. 6. p. 393.

LARUS RIDIBUNDUS. (Femina) *Lath. Ind. Orn.*

v. 2. p. 811. — *Gmel. p. 601.* — LA MOU-
(662) ETTE RIEUSE à PATTES ROUGES
d'Europe (Femelle) *Buff. pl. 970.* —
BLACK HEADED GULL *Lath. Syn. v. 6.*
p. 380.

LARUS RIDIBUNDUS (*Junior seu Annus*) (Mas)

— *Larus Canus Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 815.*
(1042) — *Gmel. p. 596.* — LA MOUETTE RIEU-
SE à PATTES ROUGES, DANS SON
JEUN AGE (Male) — Common Gull
Lath. Syn. v. 6. p. 378.

LARUS CATARACTES. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*

818. — *Gmel. p. 603.* — *Larus Fuscus Brisf.*
(1023) *Orn. v. 6. p. 165.* — LE GOELAND
BRUN, OU LE CATARACTE des mers
Australes *Buff. v. 9. Edit. folio.* — Port
Egmon Hen *Cooks voy. 1. p. 44.* — *Forst.*
voy.

voy. v. 1. p. 109—118. — SKUA GULL
Lath. Syn. v. 6. p. 385.

GENUS PROCELLARIA. GENRE PETREL.

PROCELLARIA CAPENSIS. (Mas) *Lath. Ind. Orn.*

v. 2. p. 822. — *Gmel. Syst. 1. p. 565.* — LE

(773) PETREL TACHETÉ, OU LE DAMIER
 des mers Australes (Male) *Buff. pl. 964.* —
 PINTADO PETREL *Lath. Syn. v. 6. p. 401.*

PROCELLARIA PELLAGICA. *Lath. Ind. Orn. v.*

2. p. 826. — *Gmel. Syst. 1. p. 561.* — L'OI-

(832) SEAU DE TEMPÊTE des mers Australes
Buff. pl. 993. — STORMY PETREL
Lath. Syn. v. 6. p. 411.

PROCELLARIA ALBA. B. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*

822. — LE PETREL à VENTRE BLANC

(104) des Iles Norfolk — NORFOLK-ISLAND PE-
 TREL *Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 334.* —
Phill. voy. pl. — p. 161.

GENUS MERGUS. GENRE HARLE.

MERGUS MERGANSER. (Mas) *Lath. Ind.*

Orn. v. 2. p. 828.

MERGUS CASTOR. (Femina seu Junior) *Lath.*

Ind. Orn. v. 2. p. 829.

(814) HARLE VULGAIRE d'Europe (Male et
 Femelle) *Buff. pl. 951 et 953.* — GOO-
 SAN-

- SANDER, OR MERGANSER (Mas) —
 Dun Diver (Femina) *Lath. Syn. v. 6. p. 418*
et 420.
- MERGUS ALBELLUS. (Mas et Femina) *Lath.*
Ind. Orn. v. 2. p. 831. — Gmel. Syst. 1.
 (983) *p. 209.* — LE PETIT HARLE HUP-
 PÉ, OU LA PIETTE d'Europe (Male et
 Femelle) *Buff. pl. 449.* (le Male) — *Frisch*
T. 172. — SMEW, OR WHITE NUN
Lath. Syn. v. 6. p. 428.
- MERGUS MINITUS. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 832.*
 — LE HARLE PIGMÉ, OU LE HARLE
 (1005) à TÊTE ROUSSE d'Europe — La piette
 (Femelle) *Buff. pl. 450.* — MINUTE
 MERGANSER *Lath. Syn. v. 6. p. 429.*
- MERGUS SERRATOR. (Mas) *Lath. Ind. Orn.*
v. 2. p. 829. — *Mergus Cristatus Brisf.*
 (1055) *Orn. v. 6. p. 237. t. 23.* — LE HARLE
 HUPPÉ d'Europe (Male) *Buff. pl. 207.* —
 RED BREASTED MERGANSER *Lath.*
Syn. v. 6. p. 423.

GENUS ANAS.

GENRE CANARD

- ANAS ATRATA. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2. p.*
 834. — LE CYGNE NOIR à AILES
 BLANCHES de la terre de Diemen (Male)
 (572) *d'Entercasteaux voy. — Sonnini Edit. de*
Buff. v. 25. p. 108. — BLACK SWAN
Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 343.

ANAS

- ANAS ALBIFRONS.** *Lath. Ind. Orn.* v. 2. p. 842. — *Gmel. Syst.* 1. p. 509. —
 (1065) L'OIE RIEUSE, OU L'OIE à FRONT BLANC des terres Septentrionales *Buff.* v. 9. p. 399. *Edit. in folo* — Laughing Goose *Edw.* t. 153. — WHITE-FRONTED GOOSE *Lath. Syn.* v. 6. p. 463.
- ANAS BERNICLA.** *Gmel. Syst.* 1. p. 513. — LE CRAVANT d'Europe *Buff. pl.* 342. —
 (833) THE BRENT GOOSE *Lath. Syn.* v. 6. p. 467. — *Frisch T.* 156.
- ANAS ERYTHROPUS.** *Gmel. Syst.* 1. p. 512. — LA BERNACHE d'Europe *Buff. pl.* 855. —
 (834) BERNACLE DUCK *Lath. Syn.* v. 6. p. 466. — *Frisch T.* 189.
- ANAS MOSCHATA.** (Mas) *Gmel. Syst.* 1. p. 515. — LE CANARD MUSQUÉ d'Amérique
 (835) (Male) *Buff. pl.* 989. — MUSCOVY DUCK *Lath. Syn.* v. 6. p. 476. — *Frisch T.* 180.
- ANAS TADORNA.** (Mas) *Gmel. Syst.* 1. p. 506. — LE TADORNE, OU CANARD DE
 (223) MER d'Europe (Male) *Buff. pl.* 53. — SHELDRAKE *Lath. Syn.* v. 6. p. 504. — *Frisch T.* 166.
- ANAS MOLISSIMA.** (Mas et Femina) *Gmel. Syst.* 1. p. 514. — L'EIDER, OU L'OYE à DU-
 (245) VET d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.* 208 et 209. — EIDER DUCK *Lath. Syn.* v. 6. p. 470.

ANAS

- ANAS BAHAMENSIS.** *Gmel. Syst. 1. p. 516.* —
 LE CANARD MAREC, OU MARÈCA
 (666) du Brésil *Buff. v. 10. p. 107. Edit. folio* —
 Le Canard de Bahama *Catesby* — ILA-
 TERA DUCK *Lath. Syn. v. 6. p. 507.*
Nº. 53.
- ANAS AUTUMNALIS.** *Gmel. Syst. 1. p. 537.* —
 LE CANARD SIFFLEUR à BEC ROU-
 (665) GE ET NARINES JAUNES de Caienne
Buff. pl. 826. — RED-BILLED WHIST-
 LING DUCK *Lath. Syn. v. 6. p. 498.*
- ANAS RUFINA.** (Mas et Femina) *Gmel. Syst. 1.*
p. 541. — LE CANARD SIFFLEUR
 (216) HUPPÉ d’Amerique (Male et Femelle) *Buff.*
pl. 928. — RED CRESTED DUCK
Lath. Syn. v. 6. p. 544.
- ANAS BOSCHAS.** *Gmel. Syst. 1. p. 538.* — LE
 CANARD SAUVAGE d’Europe *Buff. pl.*
 (933) 776. — WILD DUCK *Lath. Syn. v. 6,*
p. 489. — *Frisch T. 158.*
- ANAS MARILA.** *Gmel. Syst. 1. p. 509.* — LE
 PETIT MORILLON RAYÉ des terres
 (937) Septentrionales *Brisson Orn. v. 6. p. 416.* —
 LE CANARD MILOUINAN *Buff. pl. 1002.*
 — SCAUP DUCK *Lath. Syn. v. 6. p. 500.*
 — *Frisch T. 193.*
- ANAS FERINA.** *Gmel. Syst. 1. p. 530.* —
 LE CANARD MILOUIN des terres Sep-
 (938) tentrionales *Buff. pl. 803.* — POCHARD
 DUCK

- DUCK *Lath. Syn. v. 6. p. 523.* — *Frisch T. 171.*
- ANAS SPONSA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 539.* —
LE BEAU CANARD HUPPÉ de la Caro-
(218) line (Male) *Buff. pl. 980.* — SUMMER
DUCK *Lath. Syn. v. 6. p. 546.*
- ANAS GLARICULATA. (Mas et Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 539. — LA SARCELLE
(217) DE LA CHINE (Male et Femelle) *Buff. pl.*
805 et 806. — CHINESE DUCK *Lath.*
Syn. v. 6. p. 548. — *Edwards t. 102.*
- ANAS CRECCA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p. 532.* —
LA PETITE SARCELLE d'Europe (Male)
(989) *Buffon pl. 947.* — COMMON TEAL
Lath. Syn. v. 6. p. 551.
- ANAS DISCORS. *Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 854.* }
ANAS VIRGINIANA. *Brisf. Orn. v. 4. p. 455.* } LA
SARCELLE SOUCROURETTE du Por
(771) Jackson *Buff. pl. 403.* (de Caienne) —
BLUE-WINGED TEAL *Lath. Syn. v. 6.*
p. 503.
- ANAS CLANGULA. *Gmel. Syst. I. p. 523.* —
LE GARROT d'Europe *Buff. pl. 802.* —
(941) GOLD-EYE *Lath. Syn. v. 6. p. 535.* —
Frisch T. 183 et 184.
- ANAS CASARCA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p.*
511. — L'OIE ROUSSE, OULE KASAR-
(945) KA de Sibérie (Male et Femelle) *Sommini Edit.*
de Buff. v. 25. p. 229. — RUDDY GOOSE
Lath. Syn. v. 6. p. 456.

ANAS

- ANAS LEUCOPHTALMOS. (Mas) *Bechet. Orn. Tafsch. v. 2. p. 450.* — LE CANARD à
 (215) IRIS BLANC de l'Europe Septentrionale
 (Male) — WEISAUGIGE ENTE *Borkhaus Deutf. Orn. pl. Enl.*
- ANAS NIGRA. *Gmel. Syst. I. p. 508.* — LE
 CANARD MACREUSE des mers du nord
 (990) *Buff. pl. 978.* — SCOTER BLACK DI-
 VER *Lath. Syn. v. 6. p. 480.*
- ANAS FUSCA. *Gmel. Syst. I. p. 507.* — LA
 GRANDE, OU DOUBLE MACREUSE
 (991) des mers du nord *Buff. pl. 956.* — VEL-
 VET DUCK *Lath. Syn. v. 6. p. 482.*
- ANAS QUERQUEDULA. (Mas) *Gmel. Syst. I. p.*
 531. — LA SARCELLE d'Europe (Male)
 (992) *Buff. pl. 946.* — GARGANEY *Lath.*
Syn. v. 6. p. 550.
- ANAS PENELOPE. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 527. — LE CANARD SIFFLEUR
 (1006) d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl. 325.* (le
 Male) — WIGEON DUCK *Lath. Syn.*
v. 6. p. 518.
- ANAS CLYPEATA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 518. — LE CANARD SOUCHET,
 (939) OU LE ROUGE d'Europe (Male et Femelle)
Buff. pl. 971 et 972. — SCHOVERLER
 DUCK *Lath. Syn. v. 6. p. 509.*
- ANAS ACUTA. (Mas et Femina) *Gmel. Syst. I. p.*
 528. — LE CANARD à LONGUE
 (940) QUEUE d'Europe (Male et Femelle) *Buff.*
 N pl.

pl. 954. (le Male) — PINTAIL DUCK
Lath. Syn. v. 6. p. 526.

ANAS CYGNOIDES. (Mas) *Lath. Ind. Orn. v. 2.*
p. 837. — Gmel. p. 502. — L'OIE à
 (974) GOITRE de Guinée (Male) *Buff. pl. 347.*
Frisch T. 153 et 154. — CHINESE GOO-
 SE *Lath. Syn. v. 6. p. 447.*

GENUS APTENODYTES. GENRE MANCHOT.

APTENODYTES CRYSOCOME. (Mas) *Gmel. Syst.*
I. p. 555. — LE MANCHOT SAUTEUR,
 (221) OU MANCHOT HUPPÉ des Iles Falkland
 (Male) *Buff. pl. 984. — CRESTED*
 PINGUIN *Lath. Syn. v. 6. p. 561.*

APTENODYTES DEMERSA (Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 557. — LE MANCHOT à BEC
 (222) TRONQUÉ des terres Magellaniques (Femelle)
Buff. pl. 1005. — BLACK-FOOTED
 PINGUIN *Edwards t. 94. — Lath.*
Syn. v. 6. p. 567.

GENUS PELECANUS. GENRE PÉLICAN.

PELECANUS ONOCROTALUS (Mas) *Gmel. Syst.*
I. p. 596. — LE TRÈS GRAND PÉLICAN
 (560) ROSÉ d'Egipte (Male) (*variété du pélican*
commun) *Buff. pl. 87. — GREAT WHI-*
 TE PELICAN *Lath. Syn. v. 6. p. 575.*

PELECANUS AQUILUS. (Femina) *Gmel. Syst. I.*
p. 572.

p. 572. — LA GRANDE FREGATTE
 (611) des Tropiques (Femelle) *Buff. pl.* 961. (le
 Male) — FRIGATE PELICAN *Lath.*
Syn. v. 6. p. 587.

PELECANUS CARBO. (Mas et Femina) *Gmel. Syst.*
I. p. 573. — LE GRAND CORMORAN
 (815) d'Europe (Male et Femelle) *Buff. pl.* 927.
 — GREANT CORVORANT *Lath. Syn.*
v. 6. p. 593. — *Frisch T.* 187.

PELECANUS GRACULUS. (Maset Femina) *Gmel.*
Syst. I. p. 574. — LE PETIT CORMO-
 (769) RAN, OU LE NIGAUD des terres Austra-
 les *Buff. v. 9. p. 197. Edit. folio.* — COM-
 MON SHAG, OR CRANE *Lath. Syn. v. 6.*
p. 598. N^o. 14.

PELECANUS BASSANUS. *Gmel. Syst. I. p. 577.*
 — LE FOU BLANC, OU LE FOU DE
 (661) BASSAN des mers du Nord *Buff. pl.* 278.
 GANNET *Lath. Syn. v. 6. p. 608.*

PELECANUS SULA. *Gmel. Syst. I. p. 578.* —
 LE FOU BRUN, OU LE FOU COMMUN
 (367) d'Amerique *Buff. v. 10. p. 236. Edit. folio*
 — THE BOBY *Lath. Syn. v. 6. p. 612.*

GENUS PHAËTON.

GENRE PAILLE-EN-
 QUEUE.

PHAËTON ÆTHEREUS. *Gmel. Syst. I. p. 581.*
 — LE GRAND PAILLE-EN-QUEUE
 (375) des Tropiques (Male) *Buff. pl.* 998. —

COMMON TROPIC BIRD *Lath. Syn. v. 6. p. 615.*

- PHAËTON PHOENICUROS. *Gmel. Syst. 1. p. 583.* — LE PAILLE-EN-QUEUE à
 (234) BRINS ROUGES d'Isle de France *Buff. pl. 979.* — RED-TAILED TROPIC-BIRD
Lath. Syn. v. 6. p. 619.

GENUS PLOTUS.

GENRE ANHINGA.

- PLOTUS NIGER. (Mas et Femina) *Mihi* }
 PLOTUS MELANOGASTER. *Gmel. p. 580.* (Femina) } L'AN-
- (219) HINGA NOIR de Caienne (Male et Femelle) *Buff. pl. 959.* (la Femelle) *pl. 960.* (le Male) — BLACK BELLIED DARTER *Lath. Syn. v. 6. p. 624.*
- PLOTUS LEVAILLANTI. (Mas et Femina) *Mihi* —
 L'ANHINGA à COU ISABELLE d'Afrique
 (220*) pays Auteniquoi (Male et Femelle) — *Vaill. voy. en Afriq. pl. Enl. N^o. 3. Edit. in Quarto.*
- PLOTUS RUFUS. (Mas) *Mihi* — L'ANHINGA à COLLIER MARON du Sénégal (Male)
 (977) — l'Anhinga Roux *Buff. pl. 107.* (Femelle) *Lath. Syn. v. 6. p. 626. var. C.*



CARACTÈRES PHYSIQUES
DES
OISEAUX NON-DECRITS.

N 3.

CARACTÈRES PHYSIQUES

D E S

OISEAUX NON-DECRITS.

GENRE VAUTOUR.

(818) LE PETIT VAUTOUR NOIR à CALESON
BLANC.

Longueur 21 Pouces , Ailes atteignant aux trois quart de la Queue , Pieds rouges , Ongles noires , Gorge et Joues denuées de plumes , la Peau de ces parties est d'un rouge incarnat , Plumage generalement noir , Cuisfes et Abdomen blancs.

GENRE AIGLE.

(8) LE FAUCON GRIS-RAYÉ.

Longueur 18 Pouces , Bec noir , Cire et Pieds jaunes , Ongles noires , Plumage de toutes les parties supérieures gris plombé , rayé transversalement d'obscur , parties inférieures , gris blanchatre , également rayé de gris foncé , Queue noire , traversée vers son origine , d'une étroite bande blanche , aux trois quarts de sa

N 4

lon-

longueur par une autre bande, large d'un Pouce et de la même couleur.

GENRE ROLLIER.

(957) LE ROLLIER à CALOTTE AIGUEMARRIN.

Taille et formes en tout semblables au *Cuit*, ou *Rollier varié d'Afrique*, Bec plus fort, plus robuste et plus long. Le haut de la Tête jusque derrière l'Occiput est couverte d'une ample calotte d'un aigue-marin éclatant, toutes les penes des Ailes et de la Queue sont d'un bleu de roi brillant, les epaulettes des premières d'une teinte plus claire, le Cou, la Gorge et toutes les parties inférieures d'un beau gris bleuâtre, le Dos, les Scapulaires, et les grandes couvertures Ailaires verd olive foncé, enfin les plumes du Croupion verd de Mer éclatant.

GENRE TROUPIALE.

(157) LE CAROUGE GORGE-ROUSSE.

Taille du *Carouge du Mexique*, Plumage noir luisant, Front, Gorge et une partie du Cou chatain.

(423) LE CASSIQUE CUIVRÉ. (*Male et Femelle*)

Taille du *Casfique à Dos rouge*, Longueur totale 11 Pouces, Bec 1 Pouce 2 lignes, des-
fus

fus de la Tête, Cou et Poitrine verd-cuivré changeant, Dos, Scapulaires et parties inférieures couleur de bronze, moyennes et grandes couvertures des Ailes frangées de violet pourpré, grandes pennes des Ailes violet foncé, Queue noire changeante en violet. — *La Femelle* à en general le Plumage moins brillant.

(152) LE TROUPIALE MASQUE NOIR. (*) (*Male et Femelle*)

Taille du *Troupiale d'Afrique*, décrit par BUFFON, sous le nom de *Cap-More*, Bec conformé de même. — *Le Male* à le Front, la région des Yeux et des Oreilles, ainsi que toute la Gorge d'un noir velouté, haut de la Tête, Cou, Poitrine, Ventre et Abdomen jaune brillant, haut du Dos jaune olivatre, cette couleur borde également les grandes couvertures, et les pennes Ailaires, Queue et Croupion olive. — *La Femelle* à en général les couleurs moins vives, elle n'a pas cette espèce de Masque, la base du Bec, étant seulement engagé dans un cercle noir, très étroit.

(612) LE CASSIQUE VIOLET à FRAISE.

Longueur 15 Pouces, Bec $1\frac{1}{2}$ Pouces, Nuque et cotés du Cou pourvus de longues plumes très ferrées, que l'Oiseau paroît avoir la
fa-

(*) Mr. LE VAILLANT à trouvé ce *Troupiale* en Afrique, il en donnera l'Histoire en décrivant les Oiseaux de ce genre.

faculté de relever, en forme d'une large fraise ou canail, Plumage généralement d'un violet foncé à reflets pourprés, Ailes et Queue noires, ainsi que le Bec et les Pieds,

GENRE LORIOT.

(596) LE LORIOT BICOLOR, OU L'OISEAU D'OR.

Taille de notre *Loriot*, Bec plus long et plus fort que ce dernier, Plumage d'un jaune d'or éclatant, Yeux entourés d'une espace noire, qui se termine en pointe vers l'Occiput, Ailes noires, largement frangées d'un jaune étincelant, les deux penes du milieu de la Queue noires, terminées de jaune, Laterales a mi-partie jaunes, extérieures seulement noires à leur origine.

(475) LE LORIOT GRIVELÉ.

Taille du *Loriot d'Europe*, Bec brun, Ailes et Queue bruns noirâtres, les premières frangées de jaune tendre et la dernière ayant toutes les penes terminées de cette couleur, le reste du Plumage d'un jaune de paille clair, relevé sur la Gorge et la Poitrine, par de petites taches longitudinales, rependues sur le milieu de chaque plume le long des baguettes.

(Je soupçonne cet Oiseau être une Femelle, de quelque espèce inconnue, il m'a été adressé de Batavia sans aucune Notice.)

L.E

(141) LE LORIOT MASQUE NOIR(*). (*Male et Femelle*)

Taille du *Précédent*. — *Le Male* à toute la Tête, les Joues, la Gorge, et une partie du Cou engagé dans une espèce de capuchon ou masque noir, cotés du Cou, Ventre et couvertures du desfus de la Queue, du même jaune, que celui qui revêt notre *Loriot*, mais paraissant plus sombre, par la couleur foncée, répandue sur la partie des baguettes la plus adhérente au Corps, Manteau, Dos et Croupion olivatre, Ailes noires, Couvertures frangés d'olivatre clair, pennes Ailaires frangées de blanc, petites plumes du poignet de l'Aile blanches vers le bout, les quatres plumes du milieu de la Queue olive foncé, les suivantes olive jusqu'à moitié, puis noires, et terminées de jaune, les extérieures moitié jaunes. — *La Femelle* à la plumage généralement plus sale, l'extrémité du Bec noir, la partie noire du Cou frangé de jaune, et la Poitrine marquée de taches longitudinales noires.

D I.

(*) Mr. LE VAILLANT donnera dans son *Ornithologie d'Afrique* une description de cette espèce.

DIVISION MAINATTE.

(320) LE PETIT MAINATTE VERD à CAPUCHON NOIR.

Longueur $9\frac{1}{2}$ Pouces , Bec 6 lignes , noir , Mandibule supérieure courbée , echancrée vers la pointe , region des Yeux et Joués nues , d'un jaune d'ocre orangé , Piéds robustes verdâtres , Tête et haut de la Nuque couvertes d'une calotte noire , Gorge , Poitrine , Dos , grandes et petites couvertures Ailâires verd olive , Ventre jaunatre , Queue sombre frangée de verd olive à sa partie supérieure , et grisé en desfous. — l'iris dans cette espèce est rouge.

(600) LE MAINATTE VERD , à GORGE ET VENTRE TACHETÉS. (*Male et Femelle*).

Le Male , Longueur , 12 Pouces , Bec 1 Pouce 2 lignes , jaune , Mandibule supérieure echancrée à la pointe , Tarsé 1 Pouce 6 lignes , cette partie et les Doigts bruns , chaque ecaille bordée de jaune blanchatre , les Ailes aboutissent à la moitié de la Queue , Plumage sur toutes les parties supérieures d'un beau verd , parties inférieures verd jaunatre , sur le milieu de chaque plume une tache blanche longitudinale , de forme ovale , Gorge blanchatre.

La Femelle , constamment plus grande que le *Male* , à le Bec noir , plumage supérieur verd-brun foncé , Ailes et Queue brun verdoyant , toutes les parties inférieures gris sale , sur chaque plu-

plume deux raies d'un verd'obscur. *Le Mâle* ainsi que *la Femelle* ont les couvertures adherantes au Corps, terminées de blanc. L'Ongle postérieure la plus forte de toutes, et la Queue non etagée.

DIVISION MARTIN,

(588) LE MARTIN à JOUES ROUGES.

Longueur totale 11 Pouces, Bec $1\frac{1}{2}$ Pouces, brun, arête de la Mandibule supérieure, enfoncée entre les Plumes du front, qui s'avancent jusque sur l'orifice des Narines, Joux couvertes d'une Peau d'un rouge incarnat, toute la tête jusque derrière les Oeilles, de même que la Gorge d'un blanc pur, partagé tout à l'entour du Cou par un large collier noir, et terminé vers le Manteau par un autre collier blanc, Poitrine, Ventre et Cuisse de cette couleur, Dos, Scapulaires et Ailes bruns noirâtres, petites, grandes et moyennes couvertures des Ailes, terminées d'un demi cercle blanc, Queue noire, jusqu'au trois quarts, de la longueur, et terminée de blanc, Pieds robustes et longs, d'un beau jaune, Ongles brunes.

GENRE COUROUCOU.

(436) GRAND COUROUCOU à VENTRE BLANC.

Plus fort de taille que le *Couroucou à Ventre rouge*

ge de Caienne , Bec jaune , Ventre et Abdomen blanc , Tête , Poitrine , Dos , et couvertures de la Queue d'un beau verd doré à reflets , couvertures Alaires rajées transversalement de zigzags noirs et blancs , grandes plumes noires bordées de blanc , Queue carrée , les deux plumes extérieures seulement plus courtes que les intermédiaires , toutes de couleur verte bronzée , et terminées de noir.

(755) LE PETIT COUROUCOU à VENTRE ROUGE.

Longueur 9 Pouces ; Bec tant soit peu comprimé vers le bout , et d'un jaune blanchâtre , Manteau , Poitrine et Dos verd doré à reflets bleus , cette couleur est terminée sur la Poitrine , par une étroite bande blanche , Ventre et couvertures du dessous de la Queue , rouge cramoisi , Plumes caudales intermédiaires verts , à reflets bleus , au bout une raie noire , qui les traverse toutes , les quatre plumes latérales de chaque côté rajées à égale distance de noir et de blanc , et terminées de cette dernière couleur , les deux extérieures plus courtes que les autres.

(29) LE COUROUCOU NARINA (*) *Male et Femelle*)

Taille égalant à peu près celle du *Couroucou à Ventre jaune de Caienne* , Bec plus court
et

(*) VAILLANT en fait mention dans son voyage à la Côte d'Afrique.

et moins large , à sa base d'un jaune clair. *Le Male* à toutes les parties supérieures , y compris la Gorge et la Poitrine , d'un beau verd, velouté á reflets métalliques. Ventre et Abdomen , d'un beau rouge carmin tendre , Epauettes et petites couvertures des Ailes verd-doré , les grandes, parsemées de zigzags et frangées de verd doré. Plumes caudales intermédiaires verds à reflets, Latérales mi-partie intérieurement de cette couleur , le reste vers le bout blanc.

La Femelle à les mêmes couleurs que le *Male* , sur les parties supérieures, à l'exception des zigzags sur les couvertures Ailaires, qui sont d'un brun plus ou moins mélangé , la partie de la Gorge et de la Poitrine, qui dans le Male sont d'un beau verd, sont d'un brun clair dans la Femelle , le haut du Ventre gris foiblement rosé , Abdomen et couvertures du dessous de la Queue rosé.

GENRE COUCOU.

(781) LE COUCOU GRIS BRONZÉ. (*)

Taille du *Coucou d'Europe* , mais plus svelte, Bec plus arqué , d'un jaune citron, Mandi-

(*) Ce *Coucou* et les suivants, vont être décrits et figurés dans la magnifique *Ornithologie Africaine* de mon ami Mr. F. LE VAILLANT, dont la science se rejouit de voir continuer la publication, et que les

dibulè supérieure large enboitant l'inférieure ; Ailes depassant tant soit peu l'origine de la Queue , toutes les parties supérieures du plumage d'un beau verd bronzé , bleuâtre sur la Queue , moins éclatant et grifillant vers le Cou et le haut de la Tête , parties inférieures gris foncé , Abdomen gris verdoijant , Pieds noirs.

(380) LE COUCOU ROUX à BEC ROUGE. (*Male*)

Longueur totale 15 Pouces , Bec $1\frac{1}{2}$ Pouces , rouge foncé , Queue longue , fortement etagée , Ailes depassant son origine d'un Pouce , Paupières garnies de cils , toute la Tête couverte d'une calotte bleu de plomb , le Plumage supérieur , y compris les pennes Ailaires et Caudales roux de rouille , les dernières noires à leur extrémités , et terminées de blanc , Gorge et Poitrine roux clair , Ventre , Cuisse et couvertures inférieures de la Queue noires.

(562) LE COUCAL-GEANT.

Longueur totale $23\frac{1}{2}$ Pouces , Bec 1 Pouce 5 lignes , arqué dans toute sa longueur , et incliné vers la pointe , Langue pointue , Paupières supérieures pourvues de long cils , Ailes 9 Pouces , Queue 13 Pouces fortement etagée , Pieds robustes , verd sombre , des deux Doigts antérieurs ,

Amateurs attendent avec l'impatience et l'intérêt que cet ouvrage inspire à de si justes titres.

rieurs , l'intérieur le plus court , celui-ci porte une Ongle tant soit peu arquée et très longue ; Tête , Cou et haut du Dos , roux foncé marqué de zigzags noirs , Gorge , Poitrine et Ventre blanc sale , maculé de roux clair , toutes les plumes qui recouvrent ces parties , ont les barbes déliées , les Baguettes sont fortes , larges , piquantes vers le bout , et d'un blanc pur , grandes et petites couvertures des Ailes barrées transversalement de blanc sale , de roux et de noir , grandes pennes des Ailes en dedans roux éclatant , barrées de noir ; Barbes extérieures d'un jaune rousâtre , barrées de roux foncé et entourées de noir , Croupion et Flancs couverts d'un duvet brun noirâtre , Queue de cette couleur , rajée et terminée de blanc sale.

(469) LE MALKOHA ROUVERDIN.

Plus grand de taille que le *Coucou Malkoha* , décrit par SONNINI ; Bec large à sa base , convexe , sur les cotés fortement arqué , long d'un Pouce et demi , Mandibule supérieure verte , inférieure noire , pointe verte , Narines placées vers le bord inférieur , à la base de la Mandibule supérieure , surmontées de long poils redressés , Joues couvertes d'une espèce de velours , d'un rouge incarnat , Tête gris foncé , devant du Cou et Poitrine couleur de rouille , Nuque , Ailes , Dos , et Queue verd sombre , à reflets cuivrées , cette dernière étagée , et les pennes qui la composent terminées de roux foncés.

O

L.

(483) LE TRÈS PETIT COUCOU DORÉ.

D'un quart plus petit que le *Didric*, longueur six Pouces, Queue etagée, Plumage sur tout le Corps verd, doré à reflets métalliques, parties inférieures blanches, chaque plume rajée à égale distance de trois bandes, d'un beau verd doré, Pennes extérieures de la Queue rajées alternativement de verd doré, et de blanc.

(395) LE COUCOU à QUEUE FRANGÉE.

Longueur 10 Pouces, Bec noir, large à sa base, comprimé vers la pointe, Queue faiblement etagée, Plumage supérieur de couleur grise uniforme, inférieur, blanc rousâtre, faiblement marqué d'étroites rajées sombres, Queue gris bleuâtre, élégamment frangée à l'entour de chaque plume de blanc pur; Pieds bruns.

G E N R E P I C.

(724) LE PIC à VENTRE ENSANGLANTÉ.

Longueur 9 Pouces; Front et tour des Yeux blanc, Tête, Cou, Manteau, Ailes et Queue noires, Croupion blanc, Gorge et Poitrine rouge, Ventre brun, sur le milieu de cette partie une tache longitudinale d'un rouge sanguin, qui s'étend depuis la Poitrine jusques sur les couvertures inférieures de la Queue.

(480) LE PIC BRUN RAYÉ DE NOIR.

Taille plus petite que l'*Epeiche d'Europe*,
Bec

Bec moins large , à sa base surmonté d'une arête , et comprimé vers la pointe , Pennes et couvertures Ailaires d'égale longueur , Queue foiblement etagée ; tout le Plumage d'un brun chocolat , rayé sur le Dos , les Ailes , et la Queue de larges bandes noirs , et par d'étroites sur le Ventre , et les couvertures inférieures de la Queue.

(481) LE PIC TACHETÉ À DOS ROUGE.

Taille de l'*Epeiche* , Bec plus long , orifices des Narines non recouvertes , haut de la Tête et Gorge noire , pointillée de blanc , plumes de l'Occiput allongées en forme de huppe pendante , d'un rouge vif ; une ligne blanche de chaque coté du Cou , Poitrine et Ventre noirs , sur chaque une des plumes une tache blanche oblongue , haut du Dos rouge incarnat , grandes couvertures Ailaires , d'un rouge brun sur leurs Barbes extérieures , noires en dedans et marquées de grandes taches blanches , Croupion maculé de noir et de rouge sale , Queue fortement etagée et noire.

(631) LE PIC BARBARESQUE (*).

Taille mitojienne entre le *Pic noir* et le *Pic verd d'Europe*. Longueur $13\frac{1}{2}$ Pouce ; Bec 1 Pouce 6 lignes , surmonté d'une arête ; Haut de la Tête
gri-

(*) Cè Pic ainsi que quelques autres paroîtront dans l'*Ornithologie Afriquaine* de Mr. F. LE VAILLANT.

grise , aijant chaque plume terminée de jaune verdâtre. De la base du Bec part une espèce de moustache d'un gris foncé , Cou , Poitrine et Ventre blanc , rayé de verd clair , Dos ainsi que toutes les couvertures des Ailes d'un beau verd jaunâtre , rayé foiblement de blanc sale ; penes Ailaires sombres , marquées en dehors , de taches blanches , Croupion jaune verdâtre. — *La femelle* ne diffère du *Male* qu'en ce que la moustache est moins foncée et très peu apparente.

(83) LE PETIT PIC ROUGEÂTRE.

Longueur totale à peu près de 6 Pouces. Tête , Cou , Dos , et barbes extérieures des plumes Ailaires d'un rouge plus ou moins foncé , Barbes intérieures des Ailes marquées de grandes taches blanches. Toutes les parties inférieures du Plumage d'un brun bistre , rayé transversalement de blanc sale , Bec , Queue et Pieds bruns noirâtres.

(78) LE PETIT PIC à BAGUETTES D'OR.

Taille du *petit Pic noir* de BUFFON *pl. Enl. 694. fig. 2.* Front brunnoisette , haut de la Tête et Occiput rouge , Gorge et cotés du Cou blanc , séparé des deux cotés par un raye couleur de noisette qui prend naissance vers la Mandibule inférieure et se prolonge le long du Cou ; Dos rayé de blanc et de brun et melangé de verd , Poitrine d'un gris blanc sale , chaque plume

plume rayée dans sa longueur de noir ; Ailes sombres rayées de blanc , toutes les Baguettes de ces dernières ainsi que celles de la Queue d'un beau jaune d'or.

(1054) LE PIC à MOUSTACHES NOIRES.

Taille du *Pic moyen de Loraine* , Bec pareillement conformé , d'un brun noirâtre , des deux angles de la mandibule inférieure , partent deux moustaches noires , qui s'étendant en se largissant sur toute la longueur du Cou , jusques à la Poitrine , derrière les Yeux une grande tache noire , Occiput de cette couleur , haut de la Tête couronnée d'une belle plaque d'un rouge foncé , Front noir , pointillé de blanc , la Gorge et les côtes du Cou , blanc maculé de fauve , tout le reste des parties supérieures du plumage , y compris la Queue , teintes d'un olive grisâtre rayé transversalement de blanc , Ventre rayé alternativement de brun et de gris , toutes les Baguettes des grandes pennes Ailaires et caudales , d'un blanc jaunâtre.

GENRE MARTIN PÊCHEUR.

(466) LE PETIT MARTIN PÊCHEUR AIGUE-MARIN.

Ce *petit Martin Pêcheur* long de 5 Pouces , dont le Bec seul à plus d'un Pouce et demi , est presque entièrement d'un bleu d'aigue marin

rin éclatant , cette couleur forme un large collier sur la Poitrine , s'étendent sur les flancs , ou elle est agréablement tranchée par le blanc pur de la Gorge , du milieu du Ventre , et de l'Abdomen. Une tache longitudinale de cette couleur , sur les cotés du Cou orne encore ce bel Oiseau dont le Bec et les Pieds sont noirs.

(210) LE MARTIN CHASSEUR (*) (*Male et Femelle*)

Taille à peu près du *Martin Pêcheur à Tête grise du Sénégal*. Longueur totale 9 Pouces , Bec 2 Pouces 2 lignes , rouge à la base , noir vers la pointe. — *Le Male* à la Tête couverte de plumes allongées d'un brun , mêlé de noir , petites couvertures Ailaires et manteau de la dernière couleur , parties inférieures blanc bistre , plumes du Ventre rayées longitudinalement de noir , Croupion , Queue et grandes couvertures des Ailes bleues , pennes Ailaires , de la même couleur jusqu'à la moitié de leur longueur , noires sur le reste , Barbes intérieures de toutes les plumes Ailaires d'un beau jaune d'ocre. — *La Femelle* ne diffère du *Male* qu'en ce que les plumes de la Tête sont d'une teinte moins foncée ,

(*) Découvert par LE VAILLANT qui nous donnera dans son intéressant ouvrage , des renseignements sur sa manière de vivre et de se nourrir.

cée, les Couvertures et le Manteau gris terreux, et le bleu du Croupion ainsi que des Ailes moins brillant.

(731) LE MARTIN PÊCHEUR à VENTRE SABLÉ.

Taille du Prédent, Mandibule supérieure rouge vif, pointe noire ainsi que toute la Mandibule inférieure, Pieds noirs, une ligne noire part de l'angle du Bec, et passe sous les Yeux, une autre blanche part de l'orifice des Narines, et aboutit aux Yeux, Tête, Cou, Dos, Queue et Ailes bleu d'aigue marin, petites et moyennes couvertures de ces dernières d'un beau noir; Gorge blanche, cotés du Cou, Poitrine et Ventre de cette couleur, de petites rajés, et des taches presque imperceptibles sont repandues sur ces parties.

(787) LE MARTIN PÊCHEUR à PLASTRON, OU LE VERDEROUX.

Longueur totale 12 Pouces, Bec plus de trois Pouces, noir, ainsi que les Pieds; Tout le Plumage supérieur verd foncé à reflets métalliques, cette couleur est coupée sur la Nuque par un cercle blanc, Gorge, cotés du Cou et Ventre d'un blanc pur, sur la Poitrine un large plastron roux clair, les Flancs mouchetés de verd foncé à reflets. — *La Femelle* n'a point de plastron, du reste elle ressemble au *Male*.

GENRE GUËPIER.

(1046) LE PETIT GUEPIER à HAUSSECOL-
NOIR.

La longueur totale de cet joli *Guépier* est de six Pouces, son Bec est peu arqué, long d'environ un Pouce et noir, la couleur dominante sur la Tête, le Dos, les plumes sub-ailaires et les petites couvertures est d'un verd indécis et renbruni, la Gorge est d'un beau jaune citron, terminé par un large Hausfecol-noir, derrière les Yeux une taché oblongue de cette couleur, la Poitrine et le Ventre sont d'un brun olivatre; l'origine des plumes Ailaires et Caudales est ronsse, vers le bout de celle-ci une large tache noire, les deux plumes intermediaires de la Queue sont vertes.

Ce *Guépier* à beaucoup de rapports avec le *Guépier varié* de SONNINI v. 18. p. 278, mais il est d'un tiers plus petit.

GENRE PROMÈROPS.

(525) LE PROMÉFIL.

Longueur totale 12 Pouces 2 lignes, Bec $2\frac{1}{2}$ Pouces, moins arqué et plus renflé vers sa pointe, que ne l'ont ordinairement les Oiseaux de ce genre. Narins couvertes de Plumes, arête de la Mandibule supérieure, relevée et engagée dans leur centre; De la Gorge part une espèce de plastron s'élargissant en triangle sur la Poitrine, les Plumes qui le compose sont couchées

en

en forme d'écailles, d'un bleu émaillé à reflets argentés, ce plastron est terminé par un ceinturon verd bronzé, haut de la Tête et nuque à reflets pourpres, cotés du Cou, Dos et Ailes d'un beau noir velouté, marqué sur les couvertures des Ailes d'un croissant pourpre, toutes les plumes Ailaires larges et coupées carent; Queue non etagée, Pennes intermédiaires, et laterales d'un verd pourpre velouté, les premières sur toute leur longueur, les secondes sur les Barbes extérieures seulement, Pennes extérieures noir de velours; Ventre et Flancs violets, les plumes des Flancs allongés en filets à barbes clair semées, ces plumes que l'Oiseau peut étaler ont jusqu'à sept Pouces et demi de longueur.

(100) LE PROMÊROPS NAMAQUOI. (*)

Longueur totale 10 Pouces 2 lignes, Bec tres arqué long, mince délié et de couleur brune, Queue etagée, Pieds noirs, Plumage supérieur violet, Ailes et Queue verd foncé luisant, chaque penne des Ailes à vers le milieu une grande tache carrée à la Barbe intérieure, et les deux pennes intérieures de la Queue, ont une tache de la même couleur vers le bout. — *La Femelle* à toute la Gorge et la Poitrine d'un brun noifette.

GEN-

(*) Découvert par LE VAILLANT.

GENRE GRIMPEREAU.

(115) LE SOUIMANGA à BEC DROIT , OU
LE MIGNON. (*Male et Femelle*)

Mr. AUDEBERT décrit *la Femelle* de cette espèce dans son bel ouvrage des Oiseaux dorés, mais il ne parle pas *du Male*, qui diffère de la première en ce que tout le Cou et le haut de la Poitrine font du même verd doré, qui recouvre les parties supérieures, cette couleur est terminée par un ceinturon d'un beau bleu, Plumage en general plus brillant.

(622) LE SOUIMANGA VIOLET à VENTRE
JAUNE. (*Male et Femelle*)

Longueur 5 Pouces, Bec 6 lignes tant soit peu courbé, et pareil à celui du *Mignon*, Queue carrée, Ailes atteignant à peu près son extrémité, Plumage supérieur violet, pur sur le Croupion, et à reflets métalliques, sur la Tête et le Cou, Gorge brun chatain bordé de violet, reste des parties inférieures jaune citron, Ailes et Queue brunes, les six pennes intermédiaires de cette dernière plus sombres et bordés de violet, — *La Femelle* est d'un verd olive plus ou moins lavé de gris, sur toutes les parties supérieures, jaune sale en dessous.

(623) LE SOUIMANGA VENTRE AURÔRE.

Longueur totale 4 Pouces, Bec noir, arqué,
menm

menu , et très effilé à la pointe ; Queue ronde , Gorge violet , bordé de verd métallique , Front et base du Bec de cette couleur , Cou et Dos olive , cette couleur borde aussi toutes les plumes Ailaires , Queue noire , les deux Plumes extérieures terminées de gris , Ventre et Poitrine couleur de feu brillant , couvertures du dessous de la Queue , et bas Ventre orangés , Flancs d'un jaune étincelant ,

(708) LE SOUIMANGA JACINTHE.

Longueur à peu près 5 Pouces , Bec arqué , Queue ronde ; Deux couleur ornent ce magnifique *Sucrier* , le pourpre violet à reflets d'or , couvre la Tête , le Cou , la Poitrine et tout le Dos , un beau noir revet toutes les autres parties inférieures , la Queue et les Ailes , ces dernières ont les epaulettes d'un beau violet.

(130) LE SOUIMANGA à FLANCS SOUCI. (*)

Longueur $4\frac{1}{2}$ Pouces , Bec arqué , à peu près un Pouce de long ; Gorge , poitrine et haut du Dos aijant toutes les plumes frangées de violet , Ailes gris foncé , Queue noire , cette couleur plus rembrunie revet le Ventre , Abdomen , et Couvertures inférieures de la Queue blanches , deux belles touffes de couleur de feu ,

ou

(*) Mr. LE VAILLANT à trouvé ce *Souimanga* en Afrique , dans les pays des Namaquois.

ou fouci , qui partent des Flancs , empêchent de confondre cette espèce.

(984) LE HEOROTAIRE GRI-GRACULE.

Taille du *Heorotaire Graculé* , décrit par AUDEBERT *Vol. 2. pl. 87.* Bec plus court , jaune citron de même que les Pieds , Langue terminée en brosse , les Joues denuées de plumes font d'un beau jaune citron , Front blanc , haut de la Tête noire , tout le Plumage supérieur , gris , maculé de blanc sur le Cou ; couvertures des Ailes largement frangées de verd olive , les deux penes intérieures adherantes au corps entièrement grises , les Plumes qui recouvrent les Oreilles font d'un gris à reflets argentés et bordées de noir , parties inférieures blanches , Poitrine légèrement rayée de gris foncé , Queue ronde terminée de blanc , penes Ailaires bordées de cette couleur.

(985) LE HEOROTAIRE VELOUTÉ.

Taille du *Heorotaire Foulihaïo* , décrit par AUDEBERT *pl. 69.* — longueur 7 Pouces ; Bec 5 lignes , jaune , ainsi que les Pieds ; Plumage sur tout le corps verd olive , plus clair en dessous ; Ce *Heorotaire* est remarquable par de petites plumes veloutées qui prennent leur origine de chaque côté , sous l'Oeil se dirigent sur les Narines , garnissent l'espace entre la Mandibule supérieure et l'Oeil , et recouvrent l'angle du Bec , cette espèce de velours est jaune , d'autres plumes grises , fort ferrées , forment au Bec inférieur une courte moustache.

La

La Femelle n'a pas cet ornement en partage, tout son plumage étant uniforme, de couleur verd olive.

(670) LE HEOROTAIRE ALBICAPIL.

Taille du *Heorotaire Fuscalbin* décrit par AUDEBERT v. 2. pl. 61, Pieds et forme du Bec semblables à ceux de ce dernier, région des Yeux entourées de plumes, toute la Tête est recouverte d'une calotte noire, qui engage aussi les côtés en descendant en pointe le long du Cou, le milieu du Crane est traversé par une bande blanche, qui aboutit de chaque côté un peu au dessus du coin de l'Oeil, la partie antérieure du Cou, le Manteau, ainsi que toutes les autres parties supérieures font d'une belle couleur verte olive, toutes les plumes Ailaires et caudales frangées de la même couleur, à l'exception des extrémités, des grandes plumes Ailaires qui sont bordées de blanc, cette dernière couleur revet tout l'Oiseau depuis la Gorge jusqu'à l'Abdomen.

GENRE OISEAU-MOUCHE.

(555) L'OISEAU-MOUCHE VERD-DE MER.

Longueur à peu près 4 Pouces, Bec 6 lignes, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche à son origine et noire vers le bout, Tête, Dos, et couvertures verd doré avec une légère teinte brune, toutes les parties inférieures jusqu'à l'Abdomen d'un beau verd de mer,

mer , clair à reflets dorés , Abdomen blanc , couvertures du desfous de la Queue largement bordées de verd très clair , toute la Queue à fa partie supérieure d'un beau verd lustré , Ailes fombres à reflets de violet clair.

GENRE GRIVÉ.

(901) LE MERLE GUTTURAL.

Taille furpafant Inotre *Merle* , Longueur $11\frac{1}{2}$ Pouces , Bec 1 Pouce 1 ligne , noir , plus comprimé vers le bout que celui du *Merle* , echancreure comme ce dernier , Pieds jaunes , Ongles brunes , Queue tant foit peu arrondie , les Ailes depafsent fon origine d'un Pouce et demi ; Plumage du Dos et du Croupion brun lavé , fur chaque plume une tache noire le long de la Baguette , haut de la Tête brun noiratre , une raie blanche part de la Mandibule supérieure , pafse au defus des Yeux , et aboutit a l'Occiput , l'Oeil est entouré d'un cercle noir , qui fe prolonge en entourant la Mandibule inférieure , et defendant en une large raie fur le haut du Cou , aijant des deux cotés une grande tache blanche , Poitrail plastronné d'un gris foncé terminé d'un ceinturon noir , Ventre blanc , fur les Flancs et l'Abdomen de grandes taches noires en forme de larmes , Poignet et petites couvertures des Ailes noires , chaque plume de ces parties porte une

pe-

petite tache blanche à sa pointe, Pennes caudales terminées de blanc.

(968) LE MERLE GRIMPEUR.

Je donne le nom de *Grimpeur* à cet Oiseau nouveau, que j'ai cru devoir placer à la suite des *Merles*, par rapport à la construction du Bec, en attendant que des observations faites sur les lieux nous instruisent de ses habitudes, qui certainement doivent différer à beaucoup d'égards de ceux de nos *Merles*. J'ajoute ici les caractères physiques de cette espèce dont deux individus m'ont été adressés.

Longueur totale huit Pouces trois lignes, envergure six Pouces et demi, Bec 6 lignes, noir, courbé vers la pointe et échancé, Narines non recouvertes, Pieds noirs, Ongles brunes très longues, peu arquées, une raizure profonde de chaque côté, jusqu'aux trois quarts de leur longueur, Pointe effilée; Queue 3 Pouces, 5 lignes, ronde, les deux plumes du milieu les plus longues, toutes les Baguettes fortes et presque depourvus de barbes à leur extrémités, plumes de la Tête et du Cou antérieur brunes, une tache noire sur le côté de chaque barbe, Dos et Croupion très emplumé d'un roux ardent, petites et moijennes couvertures des Ailes noires, terminés de gris, ce qui produit deux rajés de cette couleur sur l'Aile, Gorge, Poitrine et Ventre blancs, un croisfant noir renversé passé sur la Poitrine. — Cette

de-

description convient à l'un de ces Oiseaux, le second à la Gorge et le Cou roux sans collier.

(1000) LE MERLE à CROISSANTS.

Longueur 6 Pouces et demi, Mandibule supérieure recourbée vers la pointe, Narines non recouvertes, Queue ronde, Ailes dépassant tant soit peu son origine, Plumage d'un noir luisant, petites plumes du Poignet des Ailes blanches, petites couvertures de ces dernières, terminées d'un croisfant étroit, de cette couleur, plumes du Manteau, depuis leur origine jusqu'au trois quart de leur longueur, d'un blanc pur, et terminées d'un large croisfant noir (*), Bec et Pieds de cette couleur.

GENRE FOURMILLIER.

(966) LE GRAND FOURMILLIER RAYÉ.

Taille de l'*Etourneau*, Bec conformé comme celui de l'*Azurin*, échancré vers la pointe, Narines non recouvertes, Tarse long, bleu, ainsi que les Doigts, Ailes courtes, Queue longue et ronde, haut de la Tête roux foncé, les petites couvertures des Ailes ont une zone noire, vers le bout de chaque plume, suit une au-

(*) Ce n'est qu'en relevant les plumes du Manteau, que l'on aperçoit le blanc, l'Oiseau paraissant entièrement noir, lorsqu'elles sont couchées les unes sur les autres.

autre de roux clair, terminée d'une troisième qui est noire, toutes les parties inférieures y compris les cotés du Cou, d'un blanc sale, rayé transversalement de noir, Queue grise rayée de noir.

(967) LE FOURMILLIER à COUTTIPENNES.

Longueur totale 7 Pouces 2 lignes, Bec 1 Pouce 2 lignes, droit depuis son origine et courbé vers la pointe, ou il est échancré, Mandibule supérieure brune, inférieure blanche à son origine, tout le Plumage d'un roux verdoijant, plus clair sous la Gorge, Queue ronde, de couleur brune, Baguettes fortes, piquantes et usées vers le bout.

(987) LE FOURMILLIER GRIS-NOIR.

Taille du *Tetma*, Bec noir, Tarfe alongé, Tête et Gorge noires, tout le reste du Plumage d'un gris plombé uniforme, petites couvertures Ailaires noires, chaque plume terminée d'un croisfant blanc.

(793) LE FOURMILLIER à CALOTTE NOIRE.

Taille du *Précédent*, une ample calotte noire formée de plumes longues, que l'Oiseau paroît avoir la faculté de relever en huppe, couvre la Tête; Gorge et devant du Cou noir, cette couleur, se prolonge sur le Ventre, ou elle est terminée en forme de fer de lance, Dos brun jaunatre, Ailes et Queue noires, les premières ont toutes les couvertures tachetées de blanc,

et la dernière est terminée par un cercle de cette couleur.

(1008) LE FOURMILLIER SOURCI-BLANC.

Tant soit peu plus petit que le *Bambla*, Queue longue, Gorge et cotés du Cou ainsi que le milieu du Ventre noirs, Ailes et Queue de cette couleur, la dernière terminée de blanc pur, petites couvertures noires, aussi terminées de blanc, cotés du Ventre et une bande au dessus des Yeux de la même couleur, le reste du Plumage supérieur gris terreux.

(726) LE PETIT FOURMILLIER GRIVELÉ.

Longueur totale trois Pouces et demi, Bec long, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche, Queue courte, le Plumage supérieur, y compris les Ailes et la Queue noir, toutes les plumes frangées légèrement de blanc pur, sur l'Aile deux étroites rayés blanches, tout le Plumage inférieur blanc, avec des mouchetures longitudinales, sur chaque plume.

GENRE COTINGA.

(716) LE COTINGA FLAROU.

Taille du *Guereiva*, Plumage d'un gris foncé; verdissant légèrement sur le haut du Dos et le bord extérieur des pennes caudales, Plumage des parties inférieures, gris clair, petites couvertures des Ailes, ainsi que la Queue terminées de
roux

roux clair, deux larges touffes d'un roux brillant, ornent les Flancs, cette couleur est aussi repandue sur les petites Plumes du haut de l'Aile.

(493) LE COTINGA à FLANCS VIOLETS.

Ce joli *Petit Cotinga* qui n'a guère plus de 5 Pouces de long, est d'un brun noirâtre uniforme sur tout le dessus du corps, le dessous brun noisette, une raie longitudinale d'un blanc pur commence sous la Poitrine, et paroit partager le Ventre en deux parties, une pareille zone large de deux lignes, traverse tout le Croupion dans sa largeur, et vient se terminer sur les Cuisse, Abdomen et Couvertures inférieures de la Queue blanches, les Flancs sont ornés d'une belle touffe d'un Violet pur.

GENRE COLIOU.

(162) LE COLIOU JOUR-NUÉ (*).

Longeur 13 Pouces. Mandibule supérieure blanche a son origine, noire vers le bout, inférieure entièrement noire, région des Yeux dénuée de plumes et d'un rouge vif, Plumage en dessus gris verdâtre, en dessous gris vineux, Couvertures sous-Ailaires ainsi qu'une partie des grandes plumes, rousses, plumes de la Queue à bar-

(*) Cette espèce et la suivante paroîtront dans l'*Ornithologie Africaine* de Mr. LE VAILLANT.

à barbes étroites, les intermédiaires les plus longues, Pieds gris, Ongles noires.

(780) LE COLIOU à GORGE NOIRE.

Taille du *Précédent*, Bec tant soit peu plus fort, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche, tour des Yeux nue, Front et Gorge noires. Plumes de la Tête allongées en huppe et à barbes déliées, couleur de tout le Plumage supérieur d'un bistre plus ou moins foncé, Ventre, Cuisse et Abdomen gris rousfates, dessous des Ailes couleur de rouille, Pieds d'un rouge vif, Ongles noires.

GENRE GROS-BEC.

(797) LE GROS-BEC MANGEUR DE RIZ, OU LE PADDA-GRI.

Taille du *Padda de la Chine*, Bec et Pieds conformés comme ceux de cet Oiseau, mais d'un blanc pur, plumage supérieur gris, Queue et Ailes plus sombres, une petite couronne noire, sur le haut de la Tête, parties inférieures blanches, plus ou moins grisâillées.

(641) LE GROS-BEC COL-COUPÉ.

Longueur $4\frac{1}{2}$ Pouces, Bec et Pieds blancs, une bande, large de deux lignes d'un rouge sanguin prend son origine derrière les Yeux et environne entièrement le haut du Cou, ce qui à une certaine distance, produit l'effet comme si l'Oiseau avoit été blesé à cette partie ;
le

le reste du Plumage gris vineux rayé de noir sur les parties supérieures , et tacheté de blanc sur le Ventre , Queue foncée , les deux plumes extérieures bordées de blanc , les autres ont une tache de cette couleur sur leur extrémité.

(703) LE GROS-BEC à VENTRE PERLÉ.

Taille du *Moineau* , Bec plus épais , d'un bleu foncé , les bords des Mandibules grises , Tête , Cou postérieur , Dos et Ailes gris foncé , Queue noire , Cou antérieur , Poitrine , parties latérales du Ventre , ainsi que les couvertures caudales , d'un rouge cramoisi , milieu du Ventre noir verdâtre , sur chaque plume deux taches rondes d'un blanc pur.

(606) LE CARDINALIN.

Longueur 4 Pouces , Tête , région des Yeux , Ventre et Abdomen d'un beau noir velouté , Cou , Poitrine , Dos et couvertures du dessus de la Queue d'un rouge cramoisi pur et brillant , les plumes du Croupion sont allongées , elles recouvrent la Queue dans presque toute sa longueur , Ailes et Pennes caudales brunes , frangées de blanc sale.

(437) LE PETIT GROS-BEC à COURONNE ET
PLASTRON COULEUR DE FEU.

Taille du *Précédent* , Queue longue arrondie , Ailes atteignant au quart de sa longueur , Bec rouge , Pieds noirs ; depuis la Gorge jusque sous la Poitrine s'étend un large plastron couleur de feu brillant , sur le haut de la Tête

une couronne de la même couleur, celle-ci est entourée d'un cercle noir, qui prend son origine à la base du Bec supérieur et passe sur les Yeux, origine des plumes Ailaires noires, orangées au milieu et noires sur le reste de leur longueur; Queue orangée depuis son origine, jusqu'aux trois quarts de sa longueur et noire à l'extrémité, les deux plumes extérieures entièrement de cette couleur, cotés de la Tête ainsi que le Manteau, fauve tacheté de noir, Ventre et Abdomen blanc sale.

(286) LE VERDIER à VENTRE JAUNE.

Bec et Pieds couleur de corne, pareils à ceux du *Verdier d'Europe*, toutes les parties supérieures sont d'un brun verdoissant, plumes de la Gorge et du haut du Cou, grises à leur origine, raillées transversalement vers leur extrémité de brun et terminées de jaune, tout le reste des parties inférieures d'un beau jaune doré, petites couvertures sous-Ailaires blanches.

DIVISION BOUVREUIL.

(331) LE BOUVREUIL GRIS:

Ce *petit Bouvreuil* qui n'a guères plus de 4 Ponces dans sa longueur totale, à le Bec épais et noir, tout le Plumage composé de diverses teintes de gris, plus foncé sur les parties supérieures et blanchâtres en dessous, depuis la troisième jusqu'à la septième des grandes plumes Ai-

Aïlares , une tache blanche sur [les barbes extérieures, les grandes couvertures frangées de gris clair.

DIVISION ANGROYAN.

La Nature qui ne s'arrête pas aux classifications méthodiques, et qui dans sa marche toujours admirable, embrasse toute l'étendue des êtres, sans leur fixer les bornes étroites que nos savans à systêmes, se mettent à tache de lui assigner, cette nature qui par une conformation sublime lie toutes les espèces même les plus éloignées de climats, nous offre de nouveau dans ce genre d'Oiseaux, une preuve irrévocable contre tous nos systêmes, chaque jour, chaque nouvelle découverte nous en démontre la futilité.

En effet ce genre d'Oiseaux que l'on a nommé **ANGROYAN**, tient à la fois à plusieurs espèces, il participe du *Troupiale*, du *Gros-bec*, du *Tangara*, et du *Guèpier*, l'Oiseau avec lequel il a le plus d'analogie, quand à la conformation du Bec, est le *Malimbe*, découvert par Mr. **FERRIN** de Bourdeaux, et décrit par **SONNINI**; je le place donc à la suite des *Loxies*, en indiquant les caractères qui m'ont paru distinguer cette nouvelle espèce, dont trois divers individus ont été trouvés dans les parages de l'Océan pacifique.

Bec alongé et effilé vers la pointe, Mandibule supérieure tant soit peu arquée, base s'avancant sur le Crane laissant l'espace entre les narines à nu, pointe du Bec échancrée, Mandibule inférieure s'adaptant dans l'échancrure supérieure, base du Bec environné de poils, Doigt extérieur uni jusqu'à la première phalange au Doigt du milieu, Ailes longues, Queue tant soit peu fourchue, les deux plumes du milieu dépassent les Latérales de deux ou de trois lignes.

(166) L'ANGROYAN GRIS.

Longueur totale $8\frac{1}{2}$ Pouces, Bec 1 Pouce, Gris bleu depuis la base, jusqu'au trois quarts de sa longueur, noir vers la pointe; de l'orifice de chaque Narine, part une raie noire qui s'élargit vers l'Oeil et l'enclasse, Tête, Cou et Poitrine gris de perle, Manteau et couvertures des Ailes d'un gris foncé, Queue noire terminée de blanc sur toutes les pennes Latérales, celles du milieu sont entièrement noires, les Ailes pliées, atteignent à un demi Pouce près l'extrémité de la Queue, Pieds noirs, Iris jaune.

(1009) L'ANGROYAN LONGIBANDE.

Taille 7 Pouces, Bec 6 lignes, bleu foncé à sa base, noire vers la Pointe; tout le Plumage supérieur brun foncé, tant soit peu plus clair, sur le Cou et la Poitrine, Ailes noires, la seconde, troisième et quatrième des grandes pennes Alaires ont les Barbes extérieures blanches, sur

fur toute leur longueur ; ce qui produit une bande longitudinale fur chaque Aile, la Queue d'un beau noir, est tant foit peu plus fourchue que dans l'espèce precedente, toutes les pennes Laterales, font blanches vers la pointe, celles du milieu ainsi que la Barbe extérieure des penes de chaque coté, font entièrement noires, Pieds et Ongles de cette couleur.

DIVISION REPUBLICAIN.

Les Oiseaux qui composent cette division, font ceux, qui quoique appartenants à la grande tribu des *Loxies* en diffèrent néanmoins par quelques légères modifications physiques, ainsi que par l'instinct tout particulier qu'ils ont de se construire une demeure ou nid commun à un grand nombre d'individus. Les voyageurs PATERSON (*) et LE VAILLANT †) en ont fait mention, ce dernier se réserve de nous en communiquer les détails plus circonstanciés dans son *Ornithologie Africaine*.

(313) LE REPUBLICAIN NAMAQUOI.

Longueur 5 Pouces, Bec et Pieds couleur de corne, Plumage en general d'un gris terreux, plus

(*) PATERSON, *travels in Africa* pl.

†) LE VAILLANT, *second voyage en Afrique*, Vol. 2. pag. 15 et 322, Edition in 4to.

plus foncé sur les parties supérieures et rembruni sur les plumes Laterales de la Queue , sur les Flancs quelques taches noires , l'espace entre la base supérieur et l'Oeil noir , cette couleur entoure aussi la Mandibule inférieure et se dirige sur la Gorge qu'elle recouvre en partie.

(702) LE REPUBLICAIN à CAPUCHON ECARLATE. (*Male*)

Longueur Totale $6\frac{1}{2}$ Pouces , Bec et Pieds noirs , Ailes longues , atteignant aux deux tiers de la longueur de la Queue , un Capuchon d'un beau rouge ecarlate , recouvre toute la Tête , ainsi que la Nuque , et se dirige tant soit peu sur les cotés du Cou , le reste du Plumage d'un noir uniforme et luisant. — *La Femelle* est entièrement d'un noir rembruni.

(754) LE REPUBLICAIN à VENTRE ET GORGE JAUNES.

Longueur $5\frac{1}{2}$ Pouces , Bec noir , Pieds bruns , Ailes plus courtes que dans l'espèce précédente , Queue arrondie , haut de la Tête tirant sur le noir verdâtre , cette couleur se nuance en olive foncé sur la Nuque , et s'eclaircit sur les autres parties supérieures ; de la base du Bec supérieur part une large bande jaune , qui passe au dessus des Yeux , et aboutit sur les cotés de la Tête , un beau jaune de citron , couvre en general toutes les parties inférieures de cet Oiseau.

GEN.

GENRE BRUANT,

(294) LE BRUANT à COLLIER.

Cette espèce de *Bruant* à un tant soit peu plus de 4 Pouces, depuis le bout du Bec à l'extrémité de la Queue, celle-ci est courte, de même que les Ailes qui atteignent au quart de sa longueur, Bec noir, Mandibule inférieure blanche à sa base, Pieds jaunes, Ongles brunes; les principales couleurs de ce bel et rare Oiseau, sont le jaune vif, et le noir velouté, la première, couleur est repandue sur la Tête, le Cou, le Dos, la Poitrine, les Flancs et les couvertures de la Queue; la Gorge jusque desous les Yeux est d'un beau noir, vers le milieu du Cou un collier très étroit, qui aboutit aux angles, ce Collier ainsi que le Ventre, est du même noir velouté, Ailes et Queue brun bistre, toutes les couvertures des premières, frangées de jaune d'ocre foncé, les grandes pennes Ailaires et Caudales seulement bordées de cette couleur.

GENRE TANGARA,

(307) L'ARCHEVÊQUE à EPAULETTES BLEUES.

Beaucoup de Ressemblance dans les couleurs avec le *Bluet*, ou *Tangara Evêque*, *Buffon pl.* 178. Taille moins grande, Ailes, et Queue plus courtes, Plumage généralement d'un bleu plus décidé, avec des tintes d'aigue-marin cette couleur borde aussi toutes les plumes Ailaires et Caudales.

dales ; Epaulettes et poignet de l'Aile, d'un beau bleu d'azur foncé.

(798) LE TANGARA NÈGRIN. (*Male et Femelle*)

Ce *Tangara* quoique aijant la même longueur que le *Tangara Nègre*, est cependant beaucoup plus petit de corps, et diffère totalement de cet Oiseau par le Bec, qui quoique fortement échan-cré, est plus menue, la Queue de beaucoup plus longue et les Ailes plus courtes, ceux-ci ne dépassent guère le Croupion; L'on pourroit lui donner la denomination *d'unicolor*, tout son Plumage etant d'un noir uniforme.

La Femelle à les Ailes et la Queue noires, le reste des parties supérieures, ainsi que les bordures des couvertures Aillaires brunes, Cou et Ventre blanc sale, mélangé de brun clair sur les Flancs, et tacheté longitudinalement sur la Poitrine et le haut du Ventre, Bec et Pieds bruns.

(604) LE TANGARA BLEU à VENTRE JAUNE.

Ce beau *Tangara* long de 7 Pouces, se rapproche par la conformation du Bec au *Tangara du Mississipe*, figuré par BUFFON *pl. 741*, il en à la taille et les formes à l'exception de ses Ailes, qui sont un peu plus courtes, la Tête, le Cou, le Dos, les couvertures des Ailes et la Queue sont d'un beau bleu d'azur, à reflets verdâtres sur le Dos, pur sur les autres parties, brillant sur le devant du Cou et sur la Poitrine, ou cette couleur est terminée en forme de demi cercle, de chaque Flanc part une bande, qui paroît prendre la direction d'un ceintu-

ron,

ron , mais dont les extrémités ne se touchent point , tout le reste des parties inférieures du corps font d'un jaune citron éclatant , grandes plumes des Ailes noires , les Pieds font d'un jaune d'ocre clair.

(994) LE TANGARA ISABELLE. (*Male et Femelle*)

Longueur totale 6 Pouce, Queue $2\frac{1}{2}$ Pouce, Ailes depasant tant soit peu le Croupion; Cette espèce se rapproche le plus dans sa conformation au *Tangara noir*, figuré par BUFFON *pl. 179. fig. 2.* — *Le Male* à la Tête et la Nuque gris foncé, sur le milieu du Crane, une petite couronne de verd d'olive, cette couleur entoure aussi les Yeux et forme la nuance principale du Plumage supérieur, toutes les parties inférieures font de couleur isabelle, tirant au roux clair sur les couvertures du dessous de la Queue, Bec et Pieds couleur de corne. — *La Femelle* à tout le Plumage supérieur roux de rouille, sans couronne ni cercle à l'entour des Yeux, plumage inférieur comme *le Male*. L'Iris dans cette espèce est de couleur brune orangée.

GENRE MOINEAU.

(292) LE CAPI à CROUPION ROUGE. (*)

Lon-

(*) LE VAILLANT à trouvé cette espèce dans le Cañarie.

Longueur totale 4 Pouces , Ailes courtes ,
 Queue ronde , Bec supérieur noir , inférieur ,
 blanc , Tête et Nuque gris foncé , Manteau et
 Couvertures verd d'olive , Croupion et couvertu-
 res supérieures de la Queue rouge sale , parties
 inférieures blanches , ondées de gris clair ,
 Queue et Gorge noires.

(601) LE CAPI à FRAISE JAUNE.

Ce charmant Oiseau, encore fort rare dans
 les collections , est tant soit peu plus petit que
 le précédent, une cravatte ou fraise formée par
 de longues plumes d'un beau jaune, prend nais-
 sance derrière les Oreilles, et tombe elegamment
 sur le haut de la Poitrine, en recouvrant une par-
 tie de cette dernière qui est noire, cette fraise
 est encore relevée, par le noir de toute la Face
 et de la Gorge, une raie jaune passe sur les
 Yeux et vient aboutir aux extrémités de la Frai-
 se, le haut de la Tête est gris foncé, le Man-
 teau, les Ailes et la Queue sont verd olive, le
 Ventre est gris, les Pieds sont blancs.

(796) LE CAPI à GORGE ET SOURCILS
 ORANGÉS (*Male et Femelle*)

Longueur totale $4\frac{1}{2}$ Pouces. — *Le Male* à
 le Plumage supérieur, entièrement d'un beau
 verd d'olive, le Ventre gris verdoijant; imme-
 diatement au desous de chaque angle de la Man-
 dibule inférieure, parroit être attaché un petit ra-
 bat de couleur orange eclatant, qui est encore

re-

relevé par le noir de toute la Poitrine et des cotés du Cou , une bande d'un orange vif , pasée au desfus des Yeux en forme de fourcils , et aboutit à la Mandibule supérieure ; une autre petite tache de la même couleur au desfous des Yeux , sert encore à embéilir cette rare espèce. — *La Femelle* dont les couleurs se réduisent principalement au verd sale sur le Dos et les Ailes , et au noir uniforme sur le Cou , la Poitrine et une partie du Ventre , n'a rien en partage des belles couleurs du Male.

(211) LE BENGALI NOIR à EPAULETTES
BLANCHES.

Le nom donné à cet Oiseau , indique déjà assez ses couleurs , le noir à reflets bleus est entièrement repandu sur tout le corps , de petites epaulettes blanches , sur le haut de l'Aile et les couvertures du desfous de la même couleur , font reconnoitre cette espèce , dont la longueur totale est de 4 Pouces.

Mr. VEILLOT vient de figurer cette nouvelle espèce de *Bengali* dans son ouvrage des OISEAUX CHANTEURS pl. 38 , il lui donne le nom de *Jacarini* , et cite comme SYNONIMIE , le *Tanager Jacarini* de LATHAM *Synopsis* v. 3. p. 238. N° 34. Si Mr. VEILLOT eut consulté le texte de cet Auteur , il n'auroit certainement point commis une pareille erreur. Le véritable *Jacarini*
aijant

ajant la taille du *Bouvreuil* et la Queue four-
chue; tandis, que le *Bengali à Epaulettes*
blanches, à la taille de l'*Amandava* et la Queue
très arondie. Ces seule caractères suffiront pour
justifier cette disgresion.

GENRE GOBE-MOUCHES.

(865) LE GOBE-MOUCHES SOURCILS BLANCS.

Longueur totale 8 Pouces, Queue ronde
ajant seule 4 Pouces, 2 lignes, Ailes pliées at-
teignant à la moitié de la Queue, Bec noir,
long d'apeu près un Pouce, base entourée de
poils très ferrés, tout le Plumage supérieur
generalement noir, à l'exception des Ailes qui
sont brunes, Ventre et Abdomen blancs, une
raije de la même couleur pasé au desfus des
Yeux en forme de sourcils.

(969) L'ECHENILLEUR LONG-BEC.

Taille entre l'*Echenilleur gris*, et l'*Eche-
nilleur jaune*, décrits par LE VAILLANT
dans son *Ornithologie d'Afrique pl. 162. et*
164; — Longueur totale 11 Pouces, Bec $1\frac{1}{2}$
Pouce, Queue $4\frac{1}{2}$ Pouces, arrondie et large à
sa base, Croupion très emplumé, à baguet-
tes piquantes, parties supérieures y com-
pris les Ailes et la Queue d'un brun bistre,
cette dernière à les Barbes intérieures de cha-
que plume rajés à distances d'un brun plus fon-
cé,

cé , pennes Aillaires bordées, et couvertures terminées de jaune d'ocre, les autres plumes du Cou et du Dos terminées d'un croisfant noir, Gorge et Poitrine couleur d'ocre clair, sur chaque plume un croisfant noir, Ventre blanc, ayant aussi toutes les plumes terminées d'un large croisfant noir, — (cet Oiseau m'étant parvenu après que les *Echenilleurs d'Afrique* avoient parus, mon ami LE VAILLANT n'a pu le placer à leur suite.)

(1002) LE GOBE MOUCHES BICOLOR.

Deux couleurs principales distinguent cet Oiseau, le noir plus ou moins à reflets verdâtres sur la Tête, le Cou postérieur, et le haut du Dos, le noir pur sur les Ailes et la Queue, toutes les parties inférieures d'un blanc pur, de cette couleur sur le haut de l'Aile et sur les bords de ses Couvertures; Dos et Croupion d'un blanc grisâtre, les deux plumes extérieures de chaque côté de la Queue terminés de blanc, Bec et Pieds noir.

(1010) LE GOBE-MOUCHES MILITAIRE.

Longueur 6 Pouces, Queue seule moitié de la longueur totale, Ailes $3\frac{1}{2}$ Pouces, Bec très long, fortement échancré, large à sa base et entouré de poils longs et roides, origine des deux Mandibules bleues, d'un verdâtre clair à leur pointe, de dessus les Narines et immédiatement sur le Front s'élèvent de petites plumes veloutées d'un noir éclatant qui entourent aussi la Man-

Q

di-

dibule inférieure , tout le reste du Plumage supérieur ainsi que le devant du Cou gris foncé , Ventre , Cuisse et Abdomen d'un roux étincelant.

(719) LE TYRANAIN.

Ce petit *Tyrannin* long seulement de 3 $\frac{1}{2}$ Pouces , est le vrai *Pygmé* de son espèce , il a le haut de la Tête ornée d'une huppe d'un jaune citron , Cou , Dos et Queue verts d'olive , Ailes noires , Couvertures bordées de jaune clair , Gorge grise , Poitrine d'un gris verdoissant , Ventre jaune tendre , Pieds et Bec noirs , ce dernier est entouré de poils à sa base.

GENRE ALOUETTE.

(872) L'ALOUETTE STRIÉE.

Taille de l'*Alouette vulgaire* ; Bec brun , Pieds noirs , Ongle postérieure trois fois plus longue que les autres et fortement arqué , Queue arrondie , haut de la Tête gris terreux , toutes les autres parties d'une belle couleur de terre d'ombre clair , grandes Couvertures intermédiaires , ainsi qu'une partie des plumes Ailaires brun foncé à leur origine , jaune d'ocre au milieu , de la première couleur vers la pointe et terminées d'ombre , ce qui fait que l'Oiseau en déployant les Ailes , laisse appercevoir , quatre larges bandes transversales sur la partie intermédiaire de l'Aile , dont on ne remarque aucune trace quand elles sont dans l'état de

re-

repos, la Queue étalée laissée aussi appercevoir vers sa pointe un large cercle; les deux plumes intermédiaires n'ayant qu'une petite tache de forme ovale; ce cercle paraît interrompu et n'est pas visible quand la Queue est pliée, la Gorge qui est blanche à les plumes inférieures bordées de roux, la Poitrine est grise, les plumes du Ventre et de l'Abdomen ont une large raie blanche sur leur milieu le long de la Baguette, cette raie est entourée de brun foncé et chaque plume est frangée de gris rousfatre, Couvertures inférieures de la Queue rayés à distances de brun foncé.

GENRE BEC-FIN.

(8co) LE FIGUIER GRIS-ALBIN.

Longueur totale 3 Pouces 2 lignes, Bec 4 lignes, un peu arqué, effilé à la pointe, de couleur brune, tout le plumage supérieur est d'un beau gris, Gorge et Ventre d'un blanc pur, grisonnant sur la Poitrine, Flancs d'un gris rousfatre. — Cette espèce doit être rangée à la suite du *Figuiier Crombec d'Afrique*, décrit par Mr. LE VAILLANT *Hist. Nat. des Ois. d'Afrique Tom. 3. pl. 135.*

(996) LE FIGUIER CERCLE-EN-QUEUE.

Longueur 4 Pouces, Bec 4 lignes, Mandibule supérieure brune, inférieure jaune, Tarses longs d'un Pouce, cette partie ainsi que les

Q 2

Doigts

Doigts jaune d'ocre, Ongles brunes; la Tête et le haut du Dos, sont tachetés de brun et de roux, Ailes de la première couleur, grandes Couvertures de celles ci entièrement entourées de blanc, pennes et petites Couvertures bordées extérieurement de roux, cette couleur regne aussi sur le Croupion, Queue courte arrondie, extrémités de toutes les Pennes d'un blanc pur, parties inférieures blanc sale, quelques taches brunes sont irrégulièrement semées sur la Poitrine et le Ventre.

(997) LE FIGUIER LANCIFER.

Longueur totale $4\frac{1}{2}$ Pouces, Queue non étagée, plus longue que dans l'espèce précédente, Tarse beaucoup plus court, cette partie ainsi que les Doigts et le Bec bruns, les plumes qui recouvrent la Tête allongées, de couleur bistres, chaque une d'elles à une tache plus claire vers le bout, du roux éclatant passé en forme de sourcils au dessus des Yeux, tout le Dos est verd olive, maculé et tacheté de brun, Gorge, Cou, Poitrine et Ventre d'un blanc jaunissant, sur l'extrémité de chaque Plume de ces parties est une tache en forme de fer de lance, dont la pointe se dirige le long de la Baguette.

GENRE MANAKIN.

(46) LE MANAKIN COTIMANAK.

Longueur totale 6 Pouces 1 ligne, Bec et Pieds conformés comme ceux du *Cotimanak gris à calotte noire*, BUFFON *pl. enl.* 687. *fig. 1.* — La base du Bec est entouré de petite poils, la Tête couverte de plumes allongées en huppe pendante, de couleur noire à reflets de bleu foncé, Cou, haut du Dos, Ailes et Queue d'un noir terne, petites couvertures des Ailes terminées de blanc, moyennes et grandes bordées de cette couleur, la Queue qui est arrondie à les pennes latérales terminées de blanc, les extérieures ont une grande espace de cette couleur, diminuant graduellement sur les Plumes qui se rapprochent du centre, intermédiaires entièrement noires, Croupion et parties inférieures gris de plomb, plus obscur sous la Gorge et le devant du Cou.

GENRE HIRONDELLE.

(986) L'HIRONDELLE VERTE.

Taille de notre *Hirondelle* de cheminée, longueur 6 Pouces, Bec très large à sa base et court, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche à son origine, base de tout le Bec ainsi que le tour des Yeux et la Gorge cou-

vertes de petites plumes très ferrées, noires à leur origine, et terminées de blanc sale, Tête cotés du Cou, Dos et Croupion, d'un beau verd de Perroquet, toutes les plumes Ailaires et Caudales noires, bordées du même verd, grandes et petites Couvertures des premières largement frangées de cette couleur, devant du Cou, Poitrine et Flancs d'un verd éclatant rajé foiblement de verd plus clair, milieu du Ventre, Abdomen et couvertures inférieures de la Queue d'un jaune verdoijant; les Pieds dont le Doigt intermédiaire est le plus long, font bruns, Queue tant soit peu fourchue.

GENRE ENGOULEVENT.

(621) LE MOYEN ENGOULEVENT GRIVELÉ.

Longueur totale 14 Ponces, longueur de l'ouverture du Bec 2 Ponces, largeur à sa base $1\frac{1}{2}$ Pouce, Mandibule supérieure entièrement recouverte de plumes, jusque par dessus l'orifice des Narines qui se trouvent placées vers la pointe, cette partie est surmontée d'une arête fortement recourbée; Queue longue et carrée, Ailes atteignantes à un Pouce près son extrémité, Tête large et aplatie, Plumage généralement brun noirâtre, maculé sur la Tête et le Dos de brun plus clair mélangé de roux, du blanc sale sur les grandes couvertures des Ailes, et de petites taches de cette couleur sur

sur le Croupion ainsi que sur les Barbes extérieures des Ailes, Queue rayée irrégulièrement de brun foncé et de blanc sale, et maculée de brun, sur la Poitrine et le Cou quelques grandes taches noires semées irrégulièrement, toutes les plumes du Ventre ont une raye noire le long de la Baguette.

(709) L'ENGOULEVENT PYGMÉ.

Longueur totale 7 Pouces, les Ailes longues de 5 Pouces 2 lignes dépassent tant soit peu l'extrémité de la Queue, dont les plumes sont d'égale longueur, Bec menu, ouverture longue d'un Pouce, base entourée de long poils roides qui atteignent jusqu'à son extrémité, Plumage sur tout le corps d'un brun foncé noirâtre, taché irrégulièrement sur la Tête et le Dos de roux, les petites couvertures Ailaires ont vers leur extrémité deux taches rondes d'un roux ardent, Queue faiblement rayée de gris terreux, sous la Gorge une espèce de zone, tout le reste des parties inférieures rayées transversalement de roux sur fond brun noirâtre, Tarfes garnis de plumes jusqu'à l'origine des Doigts qui sont jaunes, l'Iris est de cette dernière couleur.

GENRE PIGEON.

(750) LE RAMIER BLEU à NUQUE ECAILLÉE.

Taille tant soit peu moins forte que celle du *Ramier d'Europe.*, longueur totale $14\frac{1}{2}$ Pouces, Ailes aboutissant à la moitié de la longueur des pennes caudales, les Yeux placés dans une espace nue d'un rouge carmin, Plumage des parties supérieures, du Ventre, et de l'Abdomen, d'un bleu plombé uniforme, s'obscurcissant sur les grandes pennes des Ailes, et de la Queue, haut de la Tête, partie antérieure du Cou et Poitrine, à reflets rouges, Cou postérieur, ainsi qu'une partie du Mantéau changeant en reflets de rouge carmin, et de pourpre éclatant, toutes les plumes de ces parties bordées de rouge mordoré, les Pieds ainsi que la peau qui recouvre les Narines d'un rouge sanguin, Bec et Ongles jaunes, Iris rouge.

(659) LE RAMIER ECLATANT.

Longueur totale à peu près 19 Pouces, Bec 1 Pouce et demi, Queue longue, parfaitement carrée, pennes qui la composent au nombre de huit, chacune d'elles large d'un Pouce, six lignes; la Queue est en dessus d'un brun bistre à reflets de verd et de pourpre foncé, extrémité de toutes les Pennes couleur d'ocre, en dessous d'un gris sale, changeant légèrement en verd clair, vers son extrémité une large ban-

bande d'un brun bistre ; les Ailes qui aboutissent à la moitié de la longueur de la Queue ont toutes les grandes pennes de couleur gris de lin foncé à reflets de verd éclatant, grandes Couvertures gris de lin clair verdoijant ; moyennes pennes et plumes du Poignet vertes dorées, petites Couvertures mordorées à reflets de verd doré. Tête, Cou et Poitrine verts à reflets métalliques, Ventre, Cuisse et Abdomen d'un blanc pur, Pieds et Bec rouges, Ongles bruns.

(526) LE RAMIER ECAILLÉ, OU LE RAMMERON.

Taille du *Ramier d'Europe*, longueur totale a peu près 15 Pouces, la couleur dominante de ce *Ramier* est le bleu plombé, plus ou moins foncé, et le rouge vineux, cette dernière couleur se remarque sur le Front, sur le haut du Dos, et sur toutes les parties inférieures, plus claire sur le Cou et la Poitrine, où elle borde toutes les plumes, haut de la Tête et Occiput gris bleuâtre ; l'on remarqué sur le haut des Ailes quelques taches blanches arrondies, des taches triangulaires de la même couleur sont semées irrégulièrement sur le Ventre, une partie du Tarse est emplumée, le reste est nu d'un jaune clair, de même que les Doigts et les Ongles, Bec jaune foncé.

(470) LE PIGEON à CEINTURON NOIR.

Longueur totale 13 Pouces, taille élancée,

Q 5

Ai-

Ailes courtes , Queue alongée , un camail d'un beau blanc jaunissant , couvre la Tête et le Cou , et se dirige le long de la Poitrine , ou cette couleur est agréablement coupée par un large ceinturon noir , dont les angles supérieures remontent sur le Manteau , haut du Dos d'un bleu noirâtre changeant en reflets de verd foncé sur les Ailes et la partie supérieure de la Queue , toutes les plumes caudales sont terminées en dessus de gris à reflets verts , en dessous de blanc pur , Croupion verdoijant , Ventre , Cuisse et Abdomen d'un jaune verdâtre , Tarses garnis de plumes jusques vers l'origine des Doigts , lesquels de même que le Bec sont jaunes , Ongles noires.

(776) LE PIGEON à FRONT-NU.

Longueur totale 11 Pouces , Queue courte , Ailes ne dépassant guère le Croupion , Bec six lignes , Front entièrement dénué de plumes , couvert d'une Peau orangée , quelle s'étend jusque sur les trois quarts des deux Mandibules , extrémités de celle-ci argentées , région des Yeux nue , Plumage de presque toutes les parties inférieures de la Tête et du Cou , d'un beau verd tant soit peu jaunissant , Dos , couvertures des Ailes et Croupion verd mat , epaulettes violettes , plumes Ailaires noires , ainsi que plusieurs des couvertures adhérentes , ces dernières bordées de jaune clair , Queue grise en dessus , noire en dessous sur les trois quarts de

fa

la longueur, le reste gris, le Tarse emplumé, jusqu'à la moitié de sa longueur, jaune ainsi que les Cuissees, partie nue de la Jambe et Doigts d'un jaune rougeatre, Ongles brunes.

(956) LA TOURTERELLE VELOUTÉE.

Longueur totale 9 Pouces et demi, Queue 3 Pouces, très large, Ailes 6 Pouces, dépassant tant soit peu l'extrémité des pennes Caudales, les grandes couvertures atteignent à peu près l'extrémité des grandes pennes Ailaires, les pennes extérieures de ces dernières les plus courtes, toutes sont courbées en dedans de façon que l'Aile qui est très large décrit une parabole, Bec long de six lignes couleur de corne; tout le Plumage supérieur ainsi que le Cou, la Poitrine et les Flancs, sont d'un beau verd velouté changeant aux diverses inflexions de la lumière, de la Mandibule inférieure se prolonge sur la Gorge et sur une partie du Cou une bande longitudinale d'un blanc pur, un croisant noir ceint le bas de la Poitrine, le milieu du Ventre est jaune verdâtre, les Cuissees et les Plumes qui revêtent le Tarse sont blancs, enfin l'Abdomen ainsi que les Couvertures du dessous de la Queue sont d'un beau jaune d'or, celle-ci, de même que les Couvertures supérieures atteignent à peu près l'extrémité des pennes caudales, les Doigts et les Ongles brunes, le tour des Yeux rouge vif.

LA

(978) LA TOURTERELLE à CALOTTE VIOLETTE.

Longueur totale 9 Pouces deux lignes, taille tant soit peu plus élancée que celle de la *Tourterelle Kurukuru*, toute la Tête jusques derrière l'Occiput couverte d'une calotte d'un violet foncé, Gorge et Poitrine grises, tachetées irrégulièrement de pourpre clair, Nuque rougeatre, Manteau, Dos et couvertures des Ailes d'un verd foncé, chaque plume de ces dernières à une grande tache ovale de bleu très foncé vers son extrémité. Grandes pennes Ailaires noires bordées de blanc jaunatre, quelques unes des petites et grandes Couvertures de celle-ci bordées de jaune foncé, Barbes extérieures de la Queue d'un verd foncé, intérieures, noires, extrémité de toutes les pennes caudales blanches sur leur Barbes intérieures et d'un gris verdoijant sur les Barbes extérieures, Ventre, Cuisse et couvertures du dessous de la Queue blanches, Pieds et Ongles brunes, Bec couleur de corne.

(658) LE PIGEON CUIVREUX.

Taille de notre *Bisfet*, longueur totale 13 Pouces 2 lignes, Bec 1 Pouce, fortement courbé vers la pointe, Queue longue et quadrée, Tête, Cou, Poitrine et Ventre d'un gris plus ou moins nuancée, changeant en pourpre clair, à reflets métalliques sur la Poitrine
et

et le Cou, sous les Yeux de même que sur la Gorge une grande tache jaune d'ocre, haut du Dos et petites Couvertures des Ailes d'un beau pourpre foncé et luisant, grandes Couvertures, Croupion, Queue, ainsi que les Couvertures inférieures de cette dernière d'un noir changeant en violet foncé, grandes penes Aillaires d'un roux rougeâtre ardent, plumes sous-Aillaires et Cuisfes de cette couleur, Tarses et Doigts rouge sanguin, Ongles brunes.

(471) LA TOURTERELLE VERTE à PLASTRON ROUGE.

Longueur totale, $8\frac{1}{2}$ Pouces, Queue étagée, les Ailes courtes ne dépassant guères le Croupion, Bec jaune, Pieds rouges, le Front, les Tempes ainsi qu'une partie des cotés de la Gorge sont d'un rouge cramoisi vif, la Gorge en devant noire, le reste du Cou antérieur et toutes les parties inférieures sont blanches, sur la Poitrine un grand plastron rouge rosé, de forme ovale, les parties supérieures du Plumage y compris les Ailes et la Queue, sont d'un beau verd olivacé.

(325) LA TOURTERELLE à VENTRE BLANC.

Longueur totale $9\frac{1}{2}$ Pouces, plus grande que la *Tourterelle du Sénégal*, avec la quelle elle à dureste plusieurs traits de ressemblance, le blanc pur domine sur toutes les parties inférieures, sur le Front, ainsi que derrière les Yeux, le bistre olivacé sur la Tête, le Cou, le Dos

et

et les couvertures Ailaires, ces dernières ont quelques grandes taches vertes dorées, du roux sur les plumes sous-Ailaires ainsi que sur les grandes pennes, Queue ronde, Pennes intermédiaires brunes, les trois Laterales de chaque côté sont barrées de noir vers leur extrémité.

(319) LA TOURTERELLE POURPRÉE: (Male)

Longueur totale 10 Ponces 6 lignes, Bec et Pieds bruns, l'Occiput, le Cou, le haut du Dos, ainsi que toutes les parties inférieures de cet Oiseau sont d'un brun roux, changeant en verd doré et en pourpre rongéatre, Gorge et Front blancs, Ailes, Dos, et Croupion brun olivacé, Queue tant soit peu arrondie, les deux pennes intermédiaires brunes, les autres noires sur les deux tiers de leur longueur, grises foncées sur le reste.

(570) LE PIGEON RAMIER ARDOISÉ.

Cet Oiseau modelle sur les formes de notre *Ramier d'Europe*, à tout le Plumage supérieur, le Cou, ainsi qu'une espèce de ceinturon interrompu, d'un beau bleu d'ardoise tant soit peu tirant au noir sur les grandes pennes des Ailes, la Gorge et le Front blancs, une espèce de hausfecol part des deux cotés du Cou et descent sur la Poitrine, Ventre blanc marqué de grandes taches noires, toutes les plumes des Flancs, ont de grandes taches noires en forme de fer de lance et sont entourées de

de blanc pur , la Queue qui est un peu arrondie , à quelques plumes latérales terminées de blanc , les Pieds sont rouges ainsi que la peau nue qui recouvre les Narines.

GENRE HERON.

(993) LE HERON BULARAGNAN.

Longueur depuis le bout du Bec aux Ongles , 3 Pieds , $2\frac{1}{2}$ Pouces , Vol 3 Pieds 7 Pouces , longueur du Bec , 4 Pouces 2 lignes , Mandibule supérieure noire , inférieure blanche en dessous , Tête , ainsi que tout le Cou blanc , légèrement ondé de pourpre clair , sur le devant quelques grandes taches noires semées irrégulièrement , sur les angles de la Poitrine un faisceau de plumes d'un brun pourpré , Scapulaires longues , et de la même couleur , Manteau , Queue et Ailes d'un bleu d'ardoise foncé , cette couleur change en reflets verdâtres sur les couvertures Ailaires , Poignet et bord de l'Aile blanc pur , les plumes qui recouvrent le Ventre et toutes les autres parties inférieures sont allongées , blanches sur toute leur longueur et frangées de gris de lin pourpré , Pieds et Ongles noirs.

(763) LE PETIT BLONJOIS MANTEAU NOIR.

Ce petit *Blonjois* , n'a pas plus que 10 Pouces , depuis le Bec jusqu'à l'extrémité de la Queue , sa hauteur est de 7 Pouces 5 lignes ,
le

le Bec long de 2 Pouces 3 lignes , l'arête de la partie supérieure noire , cotés ainsi que la Mandibule inférieure blanche , une Calotte d'un noir luisant revêt la Tête , et se prolonge sur une partie de la Nuque , cette couleur revêt aussi tout le Dos ainsi que la Queue , et recouvre le haut des Ailes en forme de Manteau , grandes pennes Ailaires d'un gris foncé , Epaulettes et extrémités des grandes Couvertures d'un brun maron , milieu de l'Aile d'un brun ocracé , parties inférieures du Plumage blanc sale mélangé d'ocre , Pieds couleur d'ocre foncé , Ongles brunes.

(352) LE CRABIER NOIR à COU TACHETÉ
(*Male et Femelle*)

Longueur depuis le bout du Bec à l'extrémité de la Queue 21 Pouces , jusques à l'extrémité des Ongles 25½ Pouces , Bec 3 Pouces 6 lignes. — *Le Male* de cette espèce à tout le Manteau , les Ailes et la Queue d'un noir bleuâtre à reflets verdâtres , le Ventre ainsi que les autres parties inférieures d'un noir grisâtre , la Tête ainsi que les Yeux sont engagés dans une espèce de Calotte noire qui se prolonge sur toute la partie postérieure du Cou , la Gorge est d'un blanc pur à taches triangulaires couleur de rouille , une large bande jaune prend naissance au dessous des Oreilles , et s'étend jusques aux trois quarts de la longueur du Cou , le reste du Plumage qui recouvre cette partie est longitudinalement tacheré de

d: blanc, de roux et de noir, la Poitrine est égajée de blanc sur fond noir.

La Femelle à toutes ces couleurs moins prononcées et moins vives elle n'a point de noir dans son Plumage, ce qui est de cette couleur dans *le Male*, est brun foncé dans celle-ci, le Ventre et l'Abdomen sont gris, et les Ailes ainsi que la Queue d'un gris noirâtre; *le Male* et *la Femelle* ont les Pieds et le Bec bruns.

GENRE IBIS (*).

(191) LE COURLIS GRIS, à AILES CUIVRÉES.

Longueur totale 2 Pieds 4 Pouces, longueur du Bec, 4 Pouces, 5 lignes, Pieds courts, Queue quarrée, les Ailes atteignent son extrémité, le Bec est peu arqué, plus court que ne l'est d'ordinaire ces Oiseaux, large à sa base, Mandibule supérieure surmontée d'une arête, et bordée dans toute sa longueur d'une rainure profonde, Yeux entourés d'une Peau nue qui se dirige sur les cotés du Bec, cette Peau et l'arête de la Mandibule supérieure sont d'un rouge sanguin, un gris uniforme revêt la Tête, le Cou, la Poitrine et le Ventre, toutes les plumes de ces parties sont bordées légèrement de

(*) Decouvert par Mr. F. LE VAILLANT.

de gris moins foncé, une étroite raie blanche part de desfous l'orifice des Oreilles et se prolonge sur une partie du Cou jusque proche de la Mandibule inférieure du Bec, Dos et grandes couvertures des Ailes gris brun bronzé, Poignet, ainsi que toutes les petites Couvertures d'un verd lustré changeant en violet clair, Barbes extérieures des moyennes Couvertures, d'une belle couleur de cuivre bronzé, Croupion et Couvertures inférieures de la Queue d'un gris à reflets verdoijant, grandes pennes Ailaires et Caudales, d'un beau bleu changeant en violet foncé, partie nue du haut de la Jambe brune, Tarses et Doigts rouges.

GENRE COURLIS.

(923) LE COCORLIS.

Longueur 9 Pouces, hauteur depuis le plan des Pieds au sommet de la Tête 6 Pouces, Ailes 5 Pouces depasfant l'extrémité de la Queue, Bec 1 Pouce 6 lignes, foiblement arqué, entièrement noir ainsi que les Pieds et les Ongles, haut de la Tête, Cou antérieur et Poitrine gris clair, lavé et foiblement ondé de gris plus foncé, Manteau et couvertures Ailaires d'un gris foncé, Queue de cette couleur, chaque penne est entourée de blanc, grandes pennes Ailaires noirâtres à Baguettes blanches, Gorge, Ventre, Abdomen, Cuisfes et Couvertures du desfus et du desfous de la Queue d'un blanc pur.

GEN-

GENRE BECASSEAU.

(239) LE MAUBÈCHE à POITRINE ROUSSE.

Longueur totale 10 Pouces 2 lignes, Bec 1 Pouce 2 lignes, Queue quarrée, les Ailes pliées atteignent à son extrémité, Plumage de la Tête et du Cou postérieur d'un gris clair rayé et moucheté longitudinalement de gris brun, Manteau et Ailes gris foncé, sur quelques plumes du haut du Dos et des couvertures Ailaires des taches noires et rousses, ces dernières de forme arrondie, plumes du Croupion et couvertures du dessus de la Queue blanchâtres, rayées transversalement de noirâtres, Queue grise, grandes plumes des Ailes noirâtres, Baguettes de celles-ci, de même que celles des Pennes caudales blanches, toutes les parties inférieures depuis la Gorge, jusqu'aux Cuissees d'un roux clair, Abdomen blanc, moucheté légèrement de noir, Bec, Pieds et Ongles noirs.

DIVISION VANNEAU.

(979) LE VANNEAU NAIN.

Cet Oiseau vrai *Pigme* de son Genre, n'a pas le Corps aussi gros qu'une *Alouette*, et est cependant presque aussi haut monté que le *Vanneau d'Europe*, dont il partage du reste tous les autres caractères; sa longueur depuis le bout du Bec à l'extrémité de la Queue est de

R 2

6½ Pou.

6 $\frac{1}{2}$ Pouces , et depuis le bout du Bec jusques aux Ongles 9 $\frac{1}{2}$ Pouces , Bec 7 lignes , d'un jaune fauve depuis sa base jusques vers son extrémité qui est noire ; du noir olivacé couvre la Tête , entoure les Yeux et se dirige le long de tout le Cou postérieur , Manteau , Ailes et desfus de la Queue d'un verd d'olive à reflets bronzés , Queue en desfous , Ventre et Cuisfés d'un blanc sale , Cou et haut de la Poitrine blanc pur , un large ceinturon noir traverse la Poitrine dans sa partie inférieure et deux touffes d'un roux marron , couvrent les Flancs.

(249) LE GRAND VANNEAU ARMÉ à LAMBEAUX ROUGES.

Ce bœu *Vanneau* dont la hauteur est de 12 Pouces , mesuré depuis le plan des Pieds au sommet de la Tête , se distingue de tous ces congénères par deux lambeaux placés de chaque côté de la Tête , a la racine du Bec , ils s'élèvent en crête au desfus de sa base , se dirigent sur la paupière supérieure , et desfendent en forme de barbillons des deux cotés du Bec , ces lambeaux sont longs 1 Pouce 2 lignes d'un cramoisi pur , la Tête , ainsi qu'une partie du Cou est noire , cette couleur regne aussi sur les grandes pennes Ailaires de même que sur les Cuisfes et le bas Ventre , la Queue qui est blanche depuis son origine jusqu'a la moitié de sa longueur , est noire sur le reste , toutes les Plumes latérales sont terminées de

de blanc, le reste du Plumage est d'un gris brun terreux, les Ailes sont armées de puissants éperons, la base du Bec est jaune, le reste est noir, les Pieds de beaucoup plus longs que ceux de notre *Vanneau* sont d'un jaune d'ocre, les Doigts sont d'un verd renbruni.

(592) LE VANNEAU ECHASSIER.

Cette espèce est remarquable par la longueur de ses Pieds excessivement minces et grêles, ils ont 5 Pouces sans y comprendre les Doigts, qui sont très courts, celui de derrière est le moins long, les Ongles sont petites et effilées, le Bec long d'un Pouce 2 lignes est noir, le Front et la Gorge blanchâtres, la Tête et le Cou sont d'un gris foncé, le Manteau et le Dos vineux, grandes plumes des Ailes noires, les grandes Couvertures atteignent à peu près à l'extrémité de celle-ci et recouvrent entièrement les moyennes, qui sont blanches, quelques unes de ces dernières ont une bande noire à leur Barbe extérieure, ce qui produit une espèce de zone sur toute la longueur de l'Aile, la Poitrine est d'un gris bleuâtre, les Cuisse et le Ventre d'un blanc rougeâtre, enfin la Queue à plumes d'égale longueur est d'un blanc pur.

GENRE PLUVIER.

(230) LE PLUVIER à POITRINE ROUSSE.

Taille moins grande et plus svelte, que le *Pluvier à Collier d'Europe*, longueur depuis le Bec à l'extrémité de la Queue $8\frac{1}{2}$ Pouces, hauteur depuis le plan des Pieds au sommet de la Tête $5\frac{1}{2}$ Pouces, les Ailes aboutissent à l'extrémité de la Queue, les Pieds munis seulement de trois Doigts sont noirs, une large raie blanche part de la Mandibule supérieure du Bec, se dirige de chaque côté des Yeux et entoure la Tête, la Gorge et le bas Ventre sont blanchâtres, haut de la Tête, Dos et couvertures Ailaires d'un gris terreux, les dernières sont terminées de roux sale, grandes penes des Ailes noires, l'extérieure de chaque côtés ont les Baguettes blanches, tout le bas du Cou, ainsi que la Poitrine sont d'un roux de rouille clair.

(229) LE PETIT PLUVIER à DOUBLE COL-
LIER (*).

Taille plus forte qu'une *Alouette*, Queue longue tant soit peu arondie, les Ailes pliées atteignent environ à son extrémité, Bec conformé comme celui de notre *Pluvier*, rouge depuis

(*) Ce *Pluvier* et le précédent ont été trouvés en Afrique par le Voyageur LE VAILLANT.

puis sa base jusqu'aux deux tiers de sa longueur, noir à la pointe, le Front est blanc, une raie de cette couleur passe au dessus de chaque Oeil et entoure la Tête en forme de couronne, le Cou est gris terminé sur le haut de la Poitrine par un cercle noir, au dessous de celui-ci un ceinturon blanc, dont les deux extrémités remontent sur le Dos ou elles se terminent en pointe, ce ceinturon est suivi d'un second qui est noir, celui-ci ne fait que traverser la Poitrine et ne remonte pas en forme de collier, tout le Manteau ainsi que les penes intermédiaires de la Queue, sont d'un brun verdoijant, les Pennes latérales sont blanches, et ont une tache noire sur leur barbe intérieures, le Ventre et les parties inférieures sont d'un blanc pur, les Pieds munis des trois Doigts sont jaunes, Ongles noires.

GENRE COURE-VITE (*).

(228) LE COURE-VITE à DOUBLE COLLIER.

Cette nouvelle espèce longue d'environ 10 Pouces, se distingue principalement par deux colliers noirs, dont l'un fort étroit, termine la partie inférieure du Cou, l'autre large d'un demi

(*) Mr. LE VAILLANT a trouvé cette rare Espèce de *Coure-Vite*, dans le pays des grand Namaquois.

mi Pouce traverse la Poitrine , tous les deux remontent sur le Dos , mais les deux extrémités ne se touchent point , tout le Plumage du Cou est blanc rousfatre tacheté longitudinalement de noir , le Dos , la Queue , les petites et grandes couvertures des Ailes font d'un gris brun , toutes les plumes de ces parties ont une large bordure de blanc rousfatre , moyennes Couvertures des Ailes rousfes , grandes pennes noires , Couvertures du desfus de la Queue blanches , Ventre , Cuisfes et Abdomen blanc rousfatre , Pieds jaunes , le Doigt du milieu qui est le plus long de tous n'a guère plus de six lignes , le Doigt intérieur n'en à que deux , l'extérieur à quatre lignes.

GENRE RALE.

(246) LE RALE D'EAU à GORGE BLANCHE.

Taille de notre *Rale d'Eau*, BUFFON *pl.* 749. , conformation totale pareille , couleurs peu dissemblantes , sur tout le haut du corps regne du brun olivacé , s'obscurfisant sur la Tête et la Nuque , Gorge blanche , le bleu de plomb , qui est la couleur dominante des parties inférieures du *Rale d'Europe* , se retrouve aussi dans cette variété Africaine , les Flancs , les Cuisfes et l'Abdomen font d'un gris brun , rajé transversalement de blanc et de roux , Bec et Pieds bruns.

LE

(772) LE RALE D'EAU DE ST. DOMINGUE,

Taille de notre *Marouette*, toutes les parties supérieures de l'Oiseau font d'un brun olivacé, ligné de traits noirs sur la Tête et le milieu du Cou, et marqué de grandes taches noires sur le milieu des plumes du Manteau et des couvertures Ailaires, la Gorge est d'un blanc sale, tout le reste du dessous du Corps d'un gris fauve, le bas Ventre sur les côtés noir rayé transversalement de blanc.

GENRE JACANA,

(403) LE GRAND JACANA VERD à CRÊTE,
OU LE JACANA BRILLANT.

Un Plumage éclatant revêt cet Oiseau dont la longueur depuis le bout du Bec à l'extrémité de la Queue, qui est fort courte, est de 12 Pouces, et mesuré du Bec à l'extrémité des Ongles 19 Pouces, Ailes longues de $6\frac{1}{2}$ Pouces, Doigt postérieur 4. Pouces, l'Ongle seule à 2 Pouces 6 lignes, Bec $1\frac{1}{2}$ Pouce, de couleur jaune, sur la base de la Mandibule supérieure, s'élève perpendiculairement en forme de plastron une espèce de Crête lisse et charnue, d'un rouge cramoisi vif, toute la Tête, le Cou, le haut du Dos, la Poitrine et le Ventre jusques et y compris les Cuisse, sont d'un beau verd de bouteille foncé et resplen-

disant , les Yeux sont surmontés d'une raie blanche , qui se prolonge jusques à l'Occiput , le Manteau et toutes Couvertures Ailaires sont de couleur de cuivre bronzé à reflets verts , grandes pennes Ailaires ainsi que l'Aile batarde d'un noir à reflets de verd foncé , Croupion , Queue, Flancs et Abdomen d'un roux rougeatre , changeant en pourpre sur les Plumes du Croupion ; Pieds et Doigts verts , Ongles brunes.

(768) LA POULE D'EAU NOIRETTE.

Le Corps de cet Oiseau n'est pas plus gros que celui d'un *Merle* , sa longueur totale est de 8 Pouces , le Bec 1 Pouce 1 ligne , d'un jaune verdâtre , tout le Plumage est d'un gris bleu noirâtre tant soit peu verdoijant sur le Manteau , Pieds et Doigts d'un rouge éclatant , Ongles brunes.

(248) LE MAROINETTE PIQUETÉ (*Male et Femelle*) (*).

Taille à peu près semblable à l'*Alouette Couchévis d'Europe* , longueur totale 6½ Pouces , Bec menu , mais du reste conformé comme celui de notre *Marouette* , Ailes courtes aboutissant à l'origine de la Queue , celle-ci à toutes les Baguettes très foibles garnies de Barbes
pres-

(*) Trouvé en Afrique par Mr. F. LE VAILLANT.

presque déliées ; *Le Male* à la Tête , le Cou jusque sur la Poitrine , et derrière jusque au haut du Dos , recouvert , d'une espèce de Camail , ou Capuchon , d'un roux foncé , plus clair sous la Gorge , le reste du Plumage supérieur est brun noirâtre ; chaque Plume à vers son extrémité , une courte raie longitudinale , et une tache ronde d'un blanc pur sur chaque une de ses Barbes , pennes Ailaires brunes , parties inférieures d'un brun noirâtre , toutes les Plumes sont longitudinalement striées de blanc pur ; Pieds , Doigts et Ongles d'un brun clair.

La Femelle n'a point de roux sur le Cou , la Gorge est blanche ainsi que le devant de la Poitrine et le milieu du Ventre , ces dernières parties ont des mouchetures de couleur sombre , tout le reste du Plumage est brun noirâtre , moucheté de blanc sale , et rayé sur les Flancs de bistre clair.

GENRE GRÈBE.

(250) LE CASTAGNEUX à COU ROUX.

Taille tant soit peu plus forte que notre *Castagneux* , hauteur depuis le plan des Pieds au sommet de la Tête environ 6 Pouces , Bec noir , longueur 1 Pouce 2 lignes , extrémité des deux Mandibules blanches , une partie du Cou à
com-

commencer de dessous la Gorge , est d'un roux ardent , le haut de la Tête , la Gorge , ainsi que toute la partie postérieure du Cou est d'un brun terreux , le haut de la Poitrine et les Flancs sont fauves , le Ventre est d'un blanc pur , le Manteau et les Ailes sont d'un brun mêlé de fauve , le Croupion est d'un roux clair.

GENRE ANHINGA.

(220) L'ANHINGA à COU ISABELLE (*Male et Femelle.*)

Cette nouvelle espèce d'*Anhinga* (découvert en Afrique par Mr. LE VAILLANT ,) que LATHAM a considéré comme une simple variété de l'*Anhinga de Caienne* , ou de celui à *Collier maron* du Sénégal (*) diffère totalement de ces deux Oiseaux et forme une espèce distincte dans ce genre. — *Le Male* long de 3 Pieds $1\frac{1}{2}$ Pouce à le Bec jaunâtre , tant soit peu rembruni sur le haut de la Mandibule supérieure , une bande blanche prend son ori-
gi-

(*) L'ANHINGA ROUX *Buffon pl. 107. (la Femelle).* — *Le Male* à toutes les parties inférieures noires et la Poitrine ceinte d'un beau *Collier roux maron.*

gine à la base du Bec sous l'Oeil , et se dirige jusque sur le milieu du Cou, cette bande est surmontée par une autre fort étroite d'un brun noirâtre, les Plumes du haut de la Tête et du Cou postérieur sont d'un brun clair, tachetés de brun foncé, tout le Cou antérieur est d'un roux isabelle , la Poitrine, le Ventre et toutes les autres parties inférieures, sont d'un beau noir verdoijant, les Plumes sub-Ailaires sont très allongées, d'un blanc argenté dans toute leur longueur et frangées extérieurement de noir, toute l'Aile est noire, on observe seulement sur quelques unes des couvertures adhérentes au corps, une large bande longitudinale d'un blanc argenté, s'étendant sur chaque Barbe extérieure le long de la Baguette, petites Couvertures d'un brun noirâtre, celle-ci ont une raie blanchâtre le long des Baguettes, le Dos et le Croupion sont d'un noir verdoijant, la Queue, composée de 12 pennes est noire, ainsi que les Pieds. — *La Femelle* est plus petite, que *le Male*, elle est longue de 2 Pieds $10\frac{1}{2}$ Pouces et à comme *le Male* la bande blanche de chaque côté du Cou, mais celle-ci est moins prononcée et n'est pas surmontée de noir, toutes les parties inférieures, de puis la Gorge jusques à l'Abdomen, sont d'un roux isabelle, les Flancs et les Cuissees sont bruns, les Ailes et la Queue d'un noir mat, *la Femelle* n'a pas

pas ces longues plumes sub-Ailaires, et toutes les Couvertures, sont d'un brun sale, enfin les Plumes, qui dans *le Male* sont rayées de blanc à reflets argentés, sont d'un gris terne dans *la Femelle*.



N Ô T E
DES
O I S E A U X D O U B L E S
ET
DE QUELQUES AUTRES OBJETS
D'HISTOIRE NATURELLE OF-
FERTS EN ÉCHANGE.

La 13^me Edition de LINNÆUS par F. GMELIN étant entre les mains d'un chacun , j'ai cru devoir classifier cette *Note séparée* suivant ce Système, les Planches enluminées de BUFFON sont citées ainsi que quelques autres Auteurs.

MAMMALIA.

MAMMIFÈRES.

PIDELPHIS GIGANTEA. (Femina) *Gmelin pag.*
 109. *Sp.* II. — LE KANGARO (Femelle)
 de la nouvelle Hollande *Schreber pl.* 104 *et*
 105. — THE KANGARU *Pennant Tom.*
 2. *Nº.* 229. *pl.* 64. — *White's Journal*
pag. 272. *pl.*

THE POTO-ROO, OR
 KANGARO RAT *White's Journal pag.*
 286. *pl.* — de la nouvelle Hollande.

LE DIDELPHE à
 LONG POILS d'Amérique.

LE LÉROT SAUTEUR
 à QUEUE ARGENTÉE (Male) de Ternate
 — *non décrit.*

SCIURUS PETAURISTA. *Gmelin pag.* 155. *Sp.*
 28. — LE TAGUAN, OU GRAND ECU-
 REUIL VOLANT DE TERNATE *Buff.*
Suppl. Tab. 21. — SAILING SQUIRREL
Penn. Nº. 349. *pl.* 78. — *Schreber pl.* 224.

- SCIURUS CINEREUS.** *Gmel. pag. 147. Sp. 3. —*
 L'ECURUEIL PETIT-GRIS *Buff. Tab.*
 25. — GREY SQUIRREL *Penn. N^o,*
 209. *Tab. 26. — Schreb. Tab. 213. de*
 Virginie.
- SCIURUS JAVENSIS.** *Sparmann —* JAVAN
 SQUIRREL *Penn. pag. 142. N^o. 335. —*
Schreber Tab. 216.
- SCIURUS GETULUS.** *Gmelin pag. 150. Sp. 6.*
 — L'ECUREUIL BARBARESQUE *Buff.*
Tab. 27. — Schreber pl. 221.
- VIVERRA NARICA.** *Gmelin pag. 86. Sp. 3. —*
 LE COATI BRUN *Buff. Tab. 48. —*
Schreber pl. 119. — de l'Amérique Mé-
 ridionale.
- SIMIA MIDAS.** — LE TAMARIN *Buffon*
Tab. 13. — Aud. fam. 6. Sect. 2. pl.
 5. — *Schreber pl. 37. — de la Guijane.*
- SIMIA MOLOCH.** *Audebert. —* LE MOLOCH
Audeb. famille 1re, Sect. 2de, pl. 2. —
Schreber Saugeth. Supp. pl. 3. B. — des
 Moluques,

AVES

AVES.

OISEAUX.

FALCO.

FALCO LAGOPUS. *Gmel. p. 260.* — LA BUSE
GANTÉE (Femelle) d'Afrique *Vaill. Ois.
d'Af. v. 1. pl. 18.*

FALCO FURCATUS. *Gmel. p. 262.* — LE
MILAN à QUEUE FOURCHUE de la
Caroline *Buff. p. 158. v. 1. Edit. folio.*

FALCO MELANOPTERUS. *Latham Ind. Orn.
Supp. v. 2. p. VI.* — LE MILAN LE
BLAC d'Afrique *Vaill. Ois. d'Af. pl. 36.*

VULTUR PAPA. *Gmel. p. 246.* — LE ROI
DES VAUTOURS *Buff. pl. 428.*

LANIUS.

LE GEOFFROY d'Afrique
Vaill. Ois. d'Af. pl. 80.

PSITTACUS.

PSITTACUS ALEXANDRI. *Gmel. p. 321.* —
LA GRANDE FERRUCHE à COLLIER
des Iles Maldives *Buff. pl. 642.* — *Vaill.
pl. 30.*

PSITTACUS BANKSII. (Mas) *Lath. Ind. Orn.
v. 1. p. 107.* — LE GRAND CACA-

TOE NOIR , OU LE CACATOE DE
BANKS de la nouvelle Hollande.

- PSITTACUS ATERRIMUS. (Mas) *Gmel. p. 330.*
LE GRAND ARA NOIR à TROMPE de
Java *Vaill. pl. 12.* — *Buff. Oiseaux*
v. 2.
- PSITTACUS ACCIPITRINUS. *Gmel. p. 345.*
LE PERROQUET CACATOE MAILLÉ
de la Guijane *Buff. pl. 526.*
- PSITTACUS ARACANGA. *Gmel. p. 313.* —
L'ARA ROUGE, OU ARA CANGA d'Ame-
rique *Buff. pl. 2.* — *Vaillant perroquets*
pl. 2.
- PSITTACUS ARARAUNA. *Gmel. p. 313.* —
L'ARA BLEU, OU ARA RAUNA d'Ame-
rique *Buff. pl. 36.* — *Vaill. perroq. pl. 3.*
- PSITTACUS GUJANENSIS. *Gmel. p. 324.* —
LA PERRUCHE ARA PAVOUANE de la
Guijane *Buff. pl. 167.* — *Vaill. pl. 14.*
- PSITTACUS VERSICOLOR. *Gmel. p. 327.* —
LA PERRUCHE-ARA à GORGE VA-
RIÉE de Surinam *Buff. pl. 144.* —
Vaill. perr. pl. 16.
- PSITTACUS TORQUATUS. *Gmel. p. 321.* —
LA PERRUCHE à COLLIER ROSE des
Indes *Buff. pl. 551.* — *Vaill. pl. 22.*
- PSITTACUS MOLUCCANUS. *Gmel. p. 316.* —
LA PERRUCHE à TÊTE BLEUE des
Moluques *Buff. pl. 743.* — *Vaill. perr.*
pl. 24.

LA PERRUCHE
OMNICOLOR des Iles de la Mer de Sud
Vaill. perr. pl. 28.

PSITTACUS PERTINAX. *Gmel. p. 322.* —

LA PERRUCHE à FACE JAUNE, OU
L'APUTE JUBA d'Amérique *Buff. pl. 528.*
Vaill. perr. pl. 34.

PSITTACUS CAROLINENSIS. *Gmel. p. 320.*

— LA PERRUCHE à TÊTE JAUNE de
la Caroline *Buff. pl. 499.* — *Vaill. perr.*
pl. 33.

PSITTACUS PENNANTII. *Lath. Ind. Orn. v.*

I. p. 90. — LA PERRUCHE à LARGE
QUEUE BLEUE de la nouvelle Hollande
Vaill. perroq. pl. 78.

PSITTACUS PENNANTII. (Pullus) — LA PER-
RUCHE à LARGE QUEUE BLEUE jeune
age (Male).

LA PERRUCHE à
TACHES SOUCI de la Guiane (Male) *Vaill.*
perr. pl. 58.

PSITTACUS FORMOSUS. *Lath. Ind. Orn. v. I.*

p. 103. — LA PERRUCHE INGAMBE
du Cap de Diemen (Male) *Vaill. perr. pl. 32.*

PSITTACUS ERITHACUS. *Gmel. p. 332.* —

LE PERROQUET JACO de Guiné *Buff.*
pl. 311. — *Vaill. pl. 99.*

PSITTACUS OCHROCEPHALUS. *Gmel. p. 339.*

— LE PERROQUET AMAZONE ordi-
naire d'Amérique *Vaill. perr. pl. 84.*

PSITTACUS PULVERULENTUS. *Gmel. p. 341.*
 — LE PERROQUET MEUNIER de la
 Guijane *Buff. pl. 361.* — *Vaill. perr.*
pl. 94.

LE PER-
 ROQUET LORI RADHIA des Moluques
Vaill. perr. pl. 94.

PSITTACUS ÆSTIVIUS. *Gmel. p. 340.* —
 LE PERROQUET AOUROU-COURAOU
 de la Guijane *Buff. pl. 547.* — *Vaill.*
perr. pl. 110.

PSITTACUS MELANOCEPHALUS. *Gmel. p.*
346. — LE PERROQUET MAHIPOU-
 RI de Caienne *Vaill. pl. 119.* — *Buff.*
527.

PSITTACUS PURPURENS. *Gmel. p. 346.* —
 LE PERROQUET à CAMAIL BLEU (Fe-
 melle) *Vaill. perr. pl. 115.*

PSITTACUS NOVÆ GUINÆ. *Gmel. p. 319.* —
 LE LORY-NOIR de nouvelle Guinée *Vaill.*
perr. pl. 49.

PSITTACUS AUSTRALIS. *Lath. Ind. Orn. v.*
1. p. 104. — LA PERRUCHE à BAN-
 DEAU ROUGE de la nouvelle Galle meri-
 dionale *Vaill. perr. pl. 48.*

PSITTACUS OCHROPTERUS. *Gmel. p. 341.* —
 LE PERROQUET à FACE ET EPAU-
 LETTES JAUNES d'Amérique *Vaill. perr.*
v. 2. pl. 98. bis.

PSITTACUS LORY. *Gmel. p. 335.* — LE PER-
 RO-

ROQUET-LORY à SCAPULAIRES BLEU
des Moluques *Buff. pl.* 168. — *Vaill. perr.*
pl. 123.

PSITTACUS GALGULUS. (Mas et Femina) *Gmel.*
p. 349. — LE TUI à COURONNE SA-
PHIR des Philippines (Male et Femelle) *Buff.*
pl. 190. *f.* 2.

PSITTACUS PULLARIS. *Gmel. p.* 348. —
LA PERRUCHE TUI à TÊTE ROU-
GE de Guiné *Buff. pl.* 60.

PSITTACUS PURPURATUS. *Gmel. p.* 350. —
LA PERRUCHE TUI à QUEUE POUR-
PRÉE de la Gujane *Sonnini v.* 28. *p.* 97.

PSITTACUS GRANDIS. *Gmel. p.* 335. — LE
PERROQUET GRAND LORY des Molu-
ques *Buff. pl.* 683. — *Vaill. pl.* 126.

LE PERROQUET LORY
à FRANGES BLEUES des Moluques (Ma-
le) *Vaill. v.* 2. *pl.* 93.

PSITTACUS TABUENSIS. *Gmel. p.* 317. —
LE GRANDE PERRUCHE à COLLIER
ET CROUPION BLEUS de Tongotaboo
Vaill. perr. pl. 55.

LA PETITE PER-
RUCHE TUI à FACE ROSE d'Afrique
pays des Namaquois *Vaill. perroq v.* 3 *Supp.*

RAMPHASTOS.

RAMPHASTOS DICOLORUS. *Gmel. p.* 356. —

LE TOUCAN PIGNANCOÏN de Caienne
Buff. pl. 269.

RAMPHASTOS ERYTHORHYNCHOS. *Gmel. p. 355.* — LE TOUCAN à GORGE BLANCHE, OU LE TOCAN de Caienne *Buff. pl. 262.*

RAMPHASTOS PIPERIVORUS. (Mas et Femina)
— L'ARACARI KOULIH de la Guiane
(Male et Femelle) *Buff. pl. 729.*

RAMPHASTOS VIRIDIS. (Femina) — L'ARACARI VERD de Caienne (Femelle) *Buff. pl. 728.*

RAMPHASTOS MOMOTA. *Gmel. p. 357.* —
LE HOUHOU, OU MOMOT du Brésil *Buff. pl. 370.*

RAMPHASTOS ARACARI. *Gmel. p. 354.* —
L'ARACARI VERD à CINTURON ROUGE, OU LE GRIGRI *Buff. pl. 166.*

BUCEROS.

BUCEROS CORNICULATUS. — LE CORBICALAO des Iles de la Mer du Sud *Vaill. Calaos pl. 24.*

LE GRAND CALAO à CASQUE EN CROISSANT des Moluques (Male) *Vaill. Calaos pl. 13.* —
Sonnini v. 20. p. 140.

CRO.

CROTOPHAGA.

CROTOPHAGA MAJOR. *Gmel. p. 363.* — LE GRAND ANI DES PALETUVIERS de la Guijane *Buff. pl. 102. f. 1.*

CORVUS.

CORVUS ERYTHORHYNCHOS. *Gmel. p. 372.*
— LA PIE BLEU à LONGUE QUEUE de la Chine *Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 57.*
— *Buff. pl. 622.*

CORVUS CALVUS. *Gmel. p. 372.* — LE CHOU-CAS CHAUVÉ de Caijenne *Buff. pl. 521.*

CORVUS VARIANS. *Lath. Ind. Orn. Supp. p. XXVI.* — LE TEMIA de Ceilan *Vaill. Ois. d'Af. pl. 56.*

CORVUS NUDUS. *Gmel. p. 371.* — LE COLNUD de Caijenne (Male) *Buff. pl. 609.* — *Vaill. Ois. d'Amerique et des Indes pl. 45.*

CORACIAS.

CORACIAS SENEGALENSIS. *Gmel. p. 379.* — LE ROLLIER à LONG-BRINS d'Afrique *Vaill. Rolliers pl. 25.* — *Buff. pl. 326.*

ORIO.

ORIOIUS.

- ORIOIUS AUREUS. *Gmel. p. 483.* — L'OISEAU DE PARADIS ORANGÉ des Indes (Male) *Vaill. Ois. de paradis pl. 9.*
- ORIOIUS PICUS. *Gmel. p. 384.* — LE TALA-PIOT de Caijenne *Buff. pl. 605.*
- ORIOIUS CRISTATUS. *Gmel. p. 387.* — LE GRAND CASSIQUE HUPPÉ de Caijenne *Buff. pl. 344.*
- ORIOIUS CRISTATUS. (Varietas) — LE GRAND CASSIQUE VERD de Caijenne *Buff. pl. 328.*
- ORIOIUS PERSICUS. (Mas et Femina) *Gmel. p. 388.* — LE CASSIQUE à DOS JAUNE de Caijenne (Male et Femelle) *Buff. pl. 184.*
- ORIOIUS HÆMORRHOUS. (Mas et Femina) *Gmel. p. 387.* — LE CASSIQUE à DOS ROUGE du Bresil (Male et Femelle) *Buff. pl. 482.*
- ORIOIUS AMERICANUS. *Gmel. p. 386.* — LE TROUPIAL à POITRINE ROUGE de Caijenne *Buff. pl. 236.*
- ORIOIUS ICTEROCEPHALUS. (Male) *Gmel. p. 392.* — LE CARROUGE à COIFFE JAUNE de Caijenne (Male) *Buff. pl. 343.*
- ORIOIUS XANTHORNUS. *Gmel. p. 391.* — LE CARROUGE, OU PETIT CUL-JAUNE du Mexique *Buff. pl. 5. f. 1.*
- LE

LE TROUPIAL à
GORGE ET TÊTE MARON de Caienne
— non décrit.

GRACULA.

LE MAINATTE VERD
à GORGE ET VENTRE TACHETÉS de
la nouvelle Hollande — non décrit.

GRACULA CAYANENSIS. *Gmel. p. 399.* —

LE PICUCULE de Caienne *Buff. pl. 621.*

GRACULA RELIGIOSA. *Gmel. p. 395.* — LE
GRAND MAINATTE des Indes Orientales
Buff. pl. 268.

PARADISEA.

PARADISEA APODA. *Gmel. p. 399.* — L'OI-
SEAU DE PARADIS GRAND EMERAU-
DE des Moluques (Male) *Buff. pl. 254.* —
Vaill. Ois. parad. pl. 1.

PARADISEA REGIA. *Gmel. p. 400.* — LE
MANUCODE, OU ROI DES OISEAUX
DE PARADIS de la nouvelle Guiné *Buff.*
pl. 496. — *Vaill. pl. 7.*

PARADISEA MAGNIFICA. *Gmel. p. 401.* —
LE MANUCODE à BOUQUETS de la
nouvelle Guiné *Buff. pl. 631.* — *Vaill.*
pl. 9.

PARADISEA AUREA. *Gmel. p. 402.* — LE
MA-

PICUS NUBICUS *Gmel. p. 439.* — L'ÉPEICHE
ONDÉE ET TACHETÉE d'Afrique *Buff.*
pl. 667.

GALBULA,

GALBULA VIRIDIS. (Mas) *Gmel. p. 459.* —
LE JACAMAR de la Gujane (Male) *Buff.*
pl. 238.

GALBULA PARADISEA. *Gmel. pl. 458.* — LE
JACAMAR à LONGUE QUEUE de Suri-
nam (Male) *Buff. pl. 271.*

ALCEDO,

ALCEDO CAPENSIS, *Gmel. p. 455.* — LE
GRAND MARTIN PÊCHEUR à GROS-
BEC ROUGE d'Afrique *Buff. pl. 590.*

ALCEDO SMYRNENSIS. *Gmel. p. 456* — LE
MARTIN PÊCHEUR BLEU ET ROUX
de Madagascar *Buff. pl. 232.*

ALCEDO DEA. *Gmel. p. 458.* — LE MARTIN
PÊCHEUR à LONG-BRINS de Ternate
Buff. pl. 116.

ALCEDO BICOLOR. (Mas et Femina) *Gmel. p.*
451. — LE MARTIN PÊCHEUR VERD
ET ROUX à COLLIER de Caijenne (Male
et Femelle *Buff. pl. 592.*

ALCEDO TORQUATA. (Mas et Femina) *Gmel. p.*
452. — LE MARTIN PÊCHEUR HUP-
PÉ,

PÉ, OU L'ALATLI de Caijenne (Male et
Femelle.) *Buff. pl.* 284.

LE MARTIN-CHASSEUR
d'Afrique pays des Caffres. — *non décrit.*

ALCEDO CRISTATA. *Gmel. p.* 447. — LE PE-
TIT MARTIN PÉCHEUR HUPPÉ, OU
LE VINTSI de l'Isle Lucon. *Buff. pl.* 765.
f 1.

ALCEDO SUPERCILIOSA. *Gmel. p.* 450. — LE
MARTIN PÉCHEUR PETIT VERD à
COLLIER de Caijenne. — *Buff. pl.*
756. *f* 2.

ALCEDO MAXIMA. *Gmel. p.* 455. — LE GRAND
MARTIN PÉCHEUR HUPPÉ d'Afrique.
Buff. pl. 679.

MEROPS.

MEROPS APIASTER. *Gmel. p.* 460. — LE
GRAND GUEPIER VERD d'Europe.
Buff. pl. 938.

LE PETIT GUEPIER à
QUEUE FOURCHUE, OU LE TAWA
d'Afrique. — *Vaill. voy.* — *Sonnini. v.* 18.

UPUPA.

LE PROMEROPS à PLAS-
TRON BLEU, OU PROMÉFIL de nouvel-
le Guiné (Male.) — *non décrit.*

B

UPU-

UPUPA ERYTHORYNCHOS. (Mas.) *Lath. Ind.*
 v. 1. p. 280. — LE PROMEROPS à BEC
 ROUGE, OU LE GRIMPART d'Afrique
 (Male.) *Audebert. pl. 6.*

CERTHIA.

CERTHIA SENEGALENSIS. *Gmel. p. 477.* — LE
 SOUIMANGA VIOLET à POTRINE
 ROUGE d'Afrique. *Audebert Ois. dorés v.*
2. pl. 8.

CERTHIA CHALYBEA. *Gmel. p. 475.* — LE
 SOUIMANGA à COLLIER d'Afrique *Buff.*
pl. 246. f. 3. — *Audeb. pl. 13.*

CERTHIA FAMOSA. (Mas.) *Gmel. p. 481.* —
 LE GRAND SOUIMANGA à LONGUE
 QUEUE d'Afrique. *Buff. pl. 83.* — *Audeb.*
pl. 37.

CERTHIA VIOLACIA. (Mas.) *Gmel. p. 482.* —
 LE SOUIMANGA à CAPUCHON VIO-
 LET d'Afrique. *Buff. pl. 670. f. 2.* —
Audeb. v. 2. pl. 39.

CERTHIA CAIJANEA. (Mas.) *Gmel. p. 483.* —
 LE GUI-GUIT NOIR ET BLEU à TÊTE
 VERTE de Caijenne. *Buff. pl. 83. f. 2.* —
Audeb. pl. 44.

CERTHIA CAIJANA. *Gmel. p. 475.* — LE GUI-
 GUIT VERD TACHETÉ à GORGE
 ROUSSE de Caijenne. (Male.) *Buff. pl.*
682. f. 2.

CER-

CERTHIA SPIZA. (Mas.) *Gmel. p. 476.* — LE
 GUI-GUIT VERD à CAPUCHON NOIR
 du Brésil. (Male.) *Audeb. v. 2. pl. 47.*

LE SOUIMANGA à FLANCS
 SOUCI, OU LE NAMAQUOI d'Afrique. —
non décrit.

LE SOUIMANGA VIOLET à
 VENTRE JAUNE d'Afrique deserts du Za-
 hara. (Male.) — *non décrit.*

CERTHIA FLAVEOLA. *Gmel. p. 479.* — LE GUI-
 GUIT SUCERIER des Antilles. *Audeb.*
pl. 51.

CERTHIA CAERULEA. (Mas.) *Gmel. p. 474.* —
 LE GUI-GUIT NOIR ET BLEU, OU LE
 BICOLOR de la Guijane. *Audeb. v. 2.*
pl. 45.

CERTHIA SPERTA. (Mas.) *Gmel. p. 477.* — LE
 SOUIMANGA à CINTURE MARON des
 Philippines. (Male.) *Audeb. pl. 16.*

LE SOUIMANGA à
 CINTURE BLEUE du Sénégal. *Audeb.*
v. 2. pl. 10.

TROCHILUS.

TROCHILUS GRAMINEUS. *Gmel. p. 488.* — LE
 COLIBRI HAUSSE-COL VERD d'Ame-
 que. *Audeb. Ois. dorés. v. 1. pl. 9.*

TROCHILUS SUPERCILIOSUS. (Mas.) *Gmel. p.*
485. — LE COLIBRI à BRINS-BLANC

de la Guïjané (Male.) *Buff. pl. 600. f. 3.*
— *Audeb. pl. 17.*

TROCHILUS VIRIDUS. *Audebert.* — L'OISEAU
MOUCHE VERD DORÉ à QUEUE BLAN-
CHE ET VERTE de la Guïjane. *Audeb.*
pl. 41.

TROCHILUS CAMPYLOPTERUS. (Mas.) *Gmel. p. 499.* } LE

TROCHILUS CINEREUS. (Femina:) — — 490. }
COLIBRI à LARGE TUYAUX (Male et
Femelle.) de Caijenne. *Audeb. pl. 5.* (Femelle.)
et pl. 21. (le Male.)

TROCHILUS PELLA. (Femina.) — LE COLIBRI
TOPAZE. (Femelle.) *Audeb. pl. 3.*

TROCHILUS MANGO. (Femina.) — LE COLIBRI
PLASTRON NOIR de la Jamaïque. (Fe-
melle.) *non décrit.*

TROCHILUS MOSCHITUS. (Mas et Femina.)
Gmel. p. 494. — L'OISEAU-MOUCHE
RUBIS TOPAZE de Caijenne. (Male et Fe-
melle.) *Buff. pl. 227. f. 2.* — *Aud. pl.*
29. et 55.

TROCHILUS JUGULARIS. *Gmel. p. 489.* — LE
COLIBRI GRENAT de St. Domingue. *Au-*
deb. pl. 4.

TROCHILUS ORNATUS. (Mas.) *Gmel. p. 497.* —
L'OISEAU-MOUCHE HUPPECOL de la
Guïjane. (Male.) *Buff. pl. 640. f. 3.* —
Audeb. pl. 49.

STUR-

STURNUS.

STURNUS NABIROP. *Daudin Orn. v. 2. p. 312.*

— LE NABIROP, OU ETourneau
CUIVRÊ d'Afrique *Vaill. Ois. d'Af. pl. 89.*

STURNUS NITENS. *Daudin p. 313.* — L'E

TOURNEAU COUIGNOP d'Afrique *Vaill.*
pl. 90. — *Buff. pl. 561.*

STURNUS MORIO. *Daud. p. 307.* — L'ETOUR-

NEAU ROUPENNE d'Afrique *Vaill. pl.*
83.

STURNUS AENEUS. (Mas.) *Daud. p. 310.* —

L'ETourneau VERD-DORÉ d'Afrique
Vaill. pl. 87. — *Buff. pl. 220.*

STURNUS NABOUROUP. *Daudin p. 308.* —

L'ETourneau à AILES BLANCHES,
OU LE NABOUROUP d'Afrique *Vaill.*
Ois. d'Af. pl. 91.

STURNUS LUDOVICIANUS. *Gmel. p. 802.* —

LE STourne, OU ETourneau à
CRAVATE NOIRE de la Louifiane *Buff.*
pl. 256.

TURDUS.

TURDUS ZEYLONUS. (Mas.) *Gmel. p. 837.* —

LA PIE-GRIECHE BACBAKIRI d'Afri-
que (Male.) *Vaill. Ois. d'Af. pl. 67.*

TURDUS PAGODARUM. *Gmel. p. 816.* — LE

MARTIN BRAME des Indes Orientales
(Male.) *Vaill. Ois. d'Af. pl. 95.*

TURDUS MIGRATORIUS. *Gmel. p. 811. —*
LA LITORNE DU CANADA *Buff. pl.*
556. f. 1.

TURDUS MINDANENSIS. *Gmel. p. 823. —*
LE MERLE CADRAN d'Afrique *Vaill.*
Ois. d'Af. pl. 109. — Buff. pl. 627.

TURDUS MOLUCCENSIS. *Brisf. v. 2. p. 316:*
— LE BRÈVE à BANDEAU NOIR de
Madagascar *Buff. pl. 257.*

TURDUS CAYANURUS. (Mas.) *Gmel. p. 828. —*
L'AZURIN, OU FOURMILIER à QUEUE
BLEUE de la Guijane *Buff. pl. 355.*

TURDUS OLIVACEUS. *Gmel. p. 810. — LE*
GRIVERON du Cap de B. E. *Vaill. Ois.*
d'Af. pl. 98.

— LE MERLE à CRAVA-
TE BLANCHE de Java *Vaill. Ois. d'Af.*
pl. 115.

— LE FOURMILLIER GRI-
NOIR d'Amerique — *non décrit,*

TURDUS LEUCOCEPHALUS. *Gmel. Syst. 1.*
p. 829. — LE MERLE DOMINIQAIN
de la Chine (Male.) Sonnerat voy. Ind. v. 2.
p. 191.

AMPELIS.

- AMPELIS POMPADORA. (Mas.) *Gmel. p.* 839. —
LE COTINGA PACAPACA, OU POM-
PADOUR d'Amerique *Buff. pl.* 279.
- AMPELIS CARNIFEX. (Mas et Femina.) *Gmel. p.*
839. — LE COTINGA ROUGE, OU
OUETTE, (Male et Femelle.) *Buff. pl.* 378.
(Male) *Vaill. Cottingas pl.* 37 et 38.
- AMPELIS CAYANA. (Mas.) *Gmel. p.* 480. —
LE COTINGA QUEREÏVA (Male.) de la
Guijane *Buff. pl.* 624.
- AMPELIS CAERULEUS. (Mas.) — LE COTINGA
GA BLEU de la Guijane (Male.) *Buff. pl.*
186. — *Vaill. pl.* 34.

LOXIA.

- LOXIA MINUTA. *Gmel. p.* 865. — LE BOU-
VREUIL BEC-ROND à VENTRE ROUX
de Caienne *Buff. pl.* 319. *f.* 2.
- LOXIA CAPENSIS. *Gmel. p.* 862. — LE GROS-
BEC DE COROMANDEL *Buff. pl.* 101.
f. 1.
- LOXIA ASTRILD. *Gmel. p.* 852. — LE BEN-
GALI RAYÉ, OU L'ASTRILD d'Afrique
Buff. pl. 157. *f.* 2.
- LOXIA CARDINALIS. (Mas.) *Gmel. p.* 847. —
LE CARDINAL HUPPÉ de Virginie (Ma-
le.) *Buff. pl.* 37.

LE PETIT CARDINAL
ROUGE ET NOIR, OU LE CARDINA-
LIN du Sénégal — *non décrit.*

EMBERIZA.

EMBERIZA SERENA. *Gmel. p. 883.* — LA
VEUVE DOMINICAINE d'Afrique *Buff.*
pl. 8. f. 2.

EMBERIZA LONGICANDA. *Gmel. p. 884.* —
LA GRANDE VEUVE à EPAULETTES
d'Afrique *Buff. pl. 635.*

EMBERIZA CAYANA. *Gmel. p. 876.* — LE
MINISTRE d'Amerique (Male.) *Buff. p.*
274. Edit. folio.

EMBERIZA SIRIS. *Gmel. p. 885.* — LE PAPE
de la Caroline *Buff. pl. 159. f. 2.*

TANAGRA.

TANAGRA BRASILIANA. *Gmel. p. 888.* — LE
TANGARA ROUGE, OU CARDINAL du
Mexique *Buff. pl. 127. f. 1.*

TANAGRA RUBRA. *Gmel. p. 889.* — LE TAN-
GARA SCARLATE DU CANADA *Buff.*
pl. 156. f. 1.

TANAGRA MAGNA. *Gmel. p. 890.* — LE
GRAND TANGARA de la Guijane *Buff.*
pl. 205.

TANAGRA CRISTATA. *Gmel. p. 898.* — LA
HOU-

HOUPETTE, OU TANGARA HUPPÉ de
la Guijane *Buff. pl. 7. f. 2.*

TANAGRA JACAPA. (Mas.) *Gmel. p. 888. —*

LE TANGARA POURPRE, OU BEC D'AR-
GENT de Caijenne (Male.) *Buff. pl. 178.*
f. 1.

TANAGRA EPISCOPUS. (Mas et Femina.) *Gmel.*

p. 896. — LE TANGARA BLEUET, OU
L'ÉVÊQUE de Caijenne (Male et Femelle.)
Buff. pl. 173.

LE TANGARA BLEU,
OU L'ARCHEVÊQUE de Perou (Male.) —
non décrit.

TANAGRA VIOLACCA. (Mas et Femina.) *Gmel. p.*

890. — LE PETIT TANGARA NOIR
ET JAUNE, OU TEITE du Brésil (Male
et Femelle.) *Buff. pl. 114. f. 2.* (Je Male.)

TANAGRA MEXICANA. *Gmel. p. 893. —* LE

TANGARA DIABLE ENRHUMÉ de Caijen-
ne *Buff. pl. 290. f. 2.*

TANAGRA CAYANA. (Mas.) *Gmel. p. 892. —*

LE TANGARA PASSEVERD de Caijenne
Buff. pl. 201. f. 2.

TANAGRA TRICOLOR. (Mas.) *Gmel. p. 891. —*

LE TANGARA VARIÉ à TÊTE VERTE,
OU LE TRICOLOR de Caijenne *Buff. pl.*
33. f. 1.

TANAGRA NIGERRIMA. *Gmel. p. 899. —*

LE TANGARA NOIR à EPAULETTES
BLANCHES d'Amérique *Buff. pl. 179. f. 2.*

LE TRES PETIT
TANGARA, OU LE NEGRIN de la Gui-
jane (Femelle.) — *non décrit.*

TANAGRA SILENS. *Lath. Ind. Orn. v. 1. p.*
432. — LE TANGARA SILENTIEUX
de la Guijane *Buff. pl. 742.*

TANAGRA TATAO. (Mas et Femina.) *Gmel. p. 893.*
LE TANGARA SEPTICOLOR (Male et
Femelle) *Buff. pl. 127. f. 2. (le Male.) —*
(la Femelle non décrite.)

FRINGILLA.

FRINGILLA BENGHALUS. (Mas.) *Gmel. p. 920.*
— LE BENGALI MARIPOZA d'Afri-
que *Buff. pl. 115. f. 1.*

LE CAPI à CROU-
PION ROUGE d'Afrique Pays des Caffres
— *non décrit.*

LE SÉNÉGALI à
SOURCILS ET CROUPION ECARLATE
de la nouvelle Hollande (Male.) — Sénégal
Quinticolor *Veillot Ois. Chanteurs pl. 15.*

MUSSICAPA.

MUSSICAPA TYRANNUS. *Gmel. p. 931. —*
LE SAVANA à QUEUE FOURCHUE
Buff. pl. 572. f. 2.

MUSSICAPA FEROX. (Mas.) *Gmel. p. 934. —*

LE

LE TYRAN à HUPPE SOUCI de Caijenne
Buff. pl. 571. f. 1.

MUSSICAPA AUDAX. *Gmel. p. 934.* — LE
TYRAN TACHETÉ, OU LE CAUDEC
de Caijenne *Buff. pl. 453. f. 2.*

MUSSICAPA RUBRICOLLIS. *Gmel. p. 933.* —
LE PIAHAU de Caijenne *Buff. pl. 381.*

LE GOBE-MOU-
CHES à CAPUCHON BLANC d'Afrique
pays des Housouanna *Vaill. Ois. d'Af. pl.*
159.

LE GOBE-MOU-
CHES NOIR à SOURCILS ET VENTRE
BLANC de la nouvelle Hollande — *non*
décrit.

ALAUDA,

ALAUDA CAPENSIS. *Gmel. p. 788.* — LA
CRAVATE JAUNE, OU CALANDRE
du Cap de B. E. *Buff. pl. 504. f. 2.*

MOTACILLA.

MOTACILLA MADAGASCARIENSIS. *Gmel. p.*
981. — LE FIGUIER à PAUPIÈRES
BLANCHES, OU LE CHERIC d'Afrique
Buff. — *Vaill. Ois. d'Af. pl. 132.*

MOTACILLA TIPHIA. *Gmel. p. 963.* — LE
FIGUIER QUADRICOLOR de Ceylan
Edw. t. 79.

Mo

- MOTACILLA HOTTENTOTTA.** *Gmel. p. 963.* —
LE TRAQUET IMITATEUR d'Afrique
Vaill. Oif. d'Af. pl. 131.
- MOTACILLA CAYANA.** *Gmel. p. 990.* — LE
PIPIV. BLEU ET NOIR de Caijenne *Buff.*

PIPRA.

- PIPRA PAREOLA.** (Mas) *Gmel. p. 999.* — LE
TIJE, OU GRAND MANAQUIN de Cai-
jenne (Male) *Buff. pl. 687. f. 2.*
- PIPRA ALBIFRONS.** *Gmel. p. 1000.* — LE
PLUMET BLANC, OU LE MANICUP
de Caijenne *Buff. pl. 707. f. 1.*
- PIPRA ERYTHROCEPHALA.** *Gmel. p. 1001.* —
LE MANAKIN à TÊTE JAUNE du Bré-
fil *Buff. pl. 34. f. 1.*
- PIPRA LEUCOCEPHALA.** *Gmel. p. 1002.* —
LE MANAKIN à TÊTE BLANCHE de
la Guijane *Buff. pl. 34. f. 2.*
- PIPRA MANACUS.** *Gmel. p. 1002.* — LE
MANAKIN CASSE NOISETTE du Brésil
Buff. pl. 302. f. 1.
- PIPRA RUPICOLA.** (Mas.) *Gmel. p. 998.* —
LE COQ DE ROCHE de Caijenne (Male.)
Buff. pl. 39.

MENURA.

- MENURA NOVAE HOLLANDIAE.** (Mas et Fe-
mi-

minia.) *Lath. Sup. p. LXI.* — LE MÉ-
NURA à QUEUE EN LYRE, OU LE
PARKINSON de la nouvelle Hollande (Male
et Femelle.) *Audeb. Ois. dorés pl. 14.* (le
Male.)

COLUMBA.

COLUMBA CHALCOPTERA. *Lath. Ind. v. 2. p.*
604. — LE PIGEON RAMIER à AILES
DORÉES des Isles Norfolk. — *Sonnini. v.*
17. *p. 309.*

COLUMBA AROMATICA. *Gmel. p. 778.* — LE
PIGEON VERD à AILES JAUNES d'Am-
boine. — (Male et Femelle.) *Buff. pl. 163.*

COLUMBA SPECIOSA. *Gmel. p. 783.* — LE RA-
MIRET à COU ET POITRINE ECAIL-
LÉE de Caijenne. *Buff. pl. 213.*

COLUMBA CAIJANOCEPHALA. *Gmel. p. 781.* —
LA TOURTERELLE à CRAVATE VER-
TE de la Jamaïque *Buff. pl. 174.*

PHASIANUS.

PHASISANUS MOTMOT. *Gmel. p. 740.* — LE
KATRACA, OU FAISAN DE LA GUIJA-
NE. *Buff. pl. 146.*

PHASIANUS IGNITUS. *Lath. Sup. Ind. v. 2.* —
LE FAISAN à CROUPION COULEUR
DE FEU. — *l'Embassade à la Chine.*

PHA-

- PHASIANUS PICTUS. (Mas.) *Gmel. p. 743.* —
LE FAISAN TRICOLOR HUPPÉ de la
Chine. (Male.) *Buff. pl. 217.*
- PHASIANUS ARGUS. (Mas.) *Gmel. p. 742.* —
L'ARGUS, OU LE LUEN (Male.) de la
Chine. *Buff. v. 2. p. 361.*
- PHASIANUS CRISTATUS. *Gmel. p. 741.* —
L'HOAZIN du Mexique. *Buff. pl. 169.*
- PHASIANUS NYCTHEMERUS. (Mas) *Gmel. p. 743.* — LE FAISAN NOIR ET BLANC
de la Chine. (Male.) *Buff. pl. 123.*

CRAX.

- CRAX RUBRA. (Mas.) — LE HOCCO BRUN
du Perou (Male.) *Buff. pl. 125.*
- CRAX PAUXI. (Mas.) *Gmel. p. 737.* — LE HOC-
CO à PIERRE, OU LE PAUXI de Suri-
nam. (Male.) *Buff. pl. 78.*

PENELOPE.

- PENELOPE MARAIL. *Gmel. p. 734.* — LE FAISAN
VERDATRE, OU MARAIL de Caijenne.
Buff. pl. 338.
- PENELOPE CUMANENSIS. *Gmel. p. 734.* —
LE PENELÔPE NOIR à HUPPE BLAN-
CHE de Surinam.

TE-

TETRAO.

TETRAO MEXICANUS. *Gmel. p. 762.* — LE
COLENICUI, OU CAILLE DU MEXI-
QUE. *Buff. pl. 149.*

LA CAILLE BLAN-
CHERAI de la nouvelle Hollande. — *non
décrit.*

LE FRANCOLIN LONG-
BEC de Sumatra — *non décrit.*

TETRAO NUDICOLLIS. *Gmel. p. 759.* — LE
FRANCOLIN GORGE NUE d'Afrique.
Buff. p. 180.

PSOPHIA.

PSOPHIA CREPITANS. *Gmel. p. 720.* — L'A-
GAMI de Caienne. (Male.) *Buff. pl. 169.*

PALAMEDEA.

PALAMEDEA CORNUTA. *Gmel. p. 615.* — LE
KAMICHY CORNU d'Amerique. *Buff.
pl. 451.*

CANCROMA.

CANCROMA COCHLEARIA. (Femina.) *Gmel. p.
617.* — LE SAVACOU HUPPÉ d'Ame-
rique. *Buff. pl. 38.*

AR.

ARDEA.

- ARDEA PAVONIA. *Gmel. p. 619.* — L'OISEAU ROYAL d'Afrique. *Buff. pl. 265.*
- ARDEA EGRETTA. (Mas.) *Gmel. p. 629.* — LA GRANDE AIGRÉTTE d'Amerique (Male.) *Buff. pl. 925.*
- ARDEA GRAZETTA. (Mas.) *Gmel. p. 628.* — LA PETITE AIGRETTE d'Amerique. *Buff. pl. 901.*
- ARDEA AGAMI. (Mas.) *Gmel. p. 629.* — LE HERON AGAMI de la Guijane. (Male.) *Buff. pl. 859.*
- ARDEA CALEDONICA. *Gmel. p. 626.* — LE BIHOREAU CANELLE de la nouvelle Calédonie *Lath. v. 5. p. 55.*
- ARDEA HELIÁS. *Gmel. p. 640.* — LE CURALE, OU PETIT PAON DE ROSES de Caijenne *Buff. pl. 782.*

TANTALUS.

- TANTALUS RUBER. (Mas.) *Gmel. p. 651.* — LE COURLIS ROUGE du Brésil (Male.) *Buff. pl. 81.*

FULICA.

- FULICA CAYANENSIS. *Gmel. p. 700.* — LE GRANDE POULE D'EAU ROUSSE de Caijenne (Male.) *Buff. pl. 352.*

Fu-

FULICA PHOENICURA. *Gmel. p. 715. —*
LE POULE D'EAU à VENTRE BLANC,
OU LE KARUKA de Ceylan (Male.) *Sonnini v. 23. p. 262.*

LA PETITE POULE
D'EAU à PIEDS ROUGES, OU LA NOI-
RETTE de Malymbe — *non décrit.*

PARRA.

PARRA CAYANENSIS. *Gmel. p. 766. —* LE
GRAND VANNEAU ARMÉ de Caijenné
(Male.) *Buff. pl. 836.*

ANAS.

ANAS ATRATA. (Mas.) *Lath. Ind. Orn. v. 2.*
p. 834. — LE CYGNE NOIR de la nou-
velle Hollande *Sonnini v. 25. p. 108.*

ANAS VIRGINIANA. *Brisf. v. 4. p. 455. —*
LE SARCELLE SOUCROUETTE du
Port Jackson *Buff. pl. 403. (de Caijenné)*

PLOTUS.

PLOTUS SURINAMENSIS. *Gmel. p. 581. —*
LE GRÈBE-FOULQUE de Caijenné *Buff.*
pl. 893.

PLOTUS MELANOGASTER. *Gmel. p. 580. —*

C


L'AN-

L'ANHINGA NOIR de Caienne (la Femelle.) *Buff. pl. 959.*

PHAËTON.

PHAËTON ÆTHEREUS. *Gmel. p. 581. —*
LE GRAND PAILLE-EN-QUEUE des
Tropiques (Male.) *Buff. pl. 998.*





SUIVI D'UNE
DÉSCRIPTION
DES
OISEAUX NON DECRITS;
ET
D'UNE
N Ô T E
D'OISEAUX DOUBLES
ET AUTRES OBJETS
D'HISTOIRE NATURELLE
OFFERTS EN ÉCHANGE.

RETURN BIOSCIENCES LIBRARY
TO → 40 Giannini Hall

642-2531

LOAN PERIOD 1	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS
Renewed books are subject to immediate recall

DUE AS STAMPED BELOW

AUG 22 1991		
REC CIRC AUG 22 1991		
RECEIVED		
AUG 26 1991		
CIRCULATION DEPT.		
RECEIVED		
AUG 28 1991		

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
FORM NO. DD4, 12m, 12/80 BERKELEY, CA 94720

U.C. BERKELEY LIBRARIES



026326805



